

Etiqueta Identificativa

Posología:
Dexmedetomidina perfusión continua
0,7-1,4 mcg/Kg/hora

Justificación de la solicitud

- Paciente con sedación difícil con los sedantes habituales, por tolerancia o fracaso terapéutico a dosis máximas seguras de sedantes habituales (midazolán 0,25mg/kg/h y propofol 4,5 mg/kg/h) que impidan mantener al paciente en nivel de sedación RASS 0-3, una vez cubiertas las necesidades analgésicas.
- Paciente en el que repetidamente fracasan las pruebas de ventilación espontánea al reducir los sedantes habituales, por presentar descarga adrenérgica y agitación o pánico, impidiendo la retirada de la ventilación mecánica aun teniendo una analgesia efectiva endovenosa.
- Paciente en sedación 0 a -3 en proceso de desconexión de la ventilación mecánica, en el que otros sedantes afectan al centro respiratorio e impiden avanzar en la desconexión.
- Paciente en ventilación mecánica que desarrolla delirio.

Criterios de utilización

Debe responder **NEGATIVAMENTE A TODO** lo siguiente:

1. ¿Nivel de sedación objetivo más profundo de RASS -3?
2. ¿Hipersensibilidad a la dexmedetomidina o a alguno de sus excipientes?
3. ¿Trastornos de la conducción cardíaca del tipo de bloqueo AV de 2º o 3º grado sin marcapasos funcionante?
4. ¿Frecuencia cardíaca actual (basal o por medicación concomitante) inferior a 50 lpm?
5. ¿Hipotensión (PAS<100 ó PAM<60) que no responde a volumen ni a dosis moderadas de aminas (noradrenalina <0,5 mcg/kg/min)?
6. ¿Efecto (incluso residual) de fármacos bloqueantes neuromusculares?
7. ¿Actividad autonómica periférica alterada (como por ejemplo lesionados medulares)?
8. ¿Hipertensión craneal o alguna enfermedad cerebrovascular grave?
9. ¿Trastornos neurológicos graves, especialmente en la fase aguda

Prescriptor

Firma:

Fecha:

Nombre y apellidos:

Nº de matrícula: