



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (CURMP) SOBRE LA INCLUSIÓN EN LA GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA DEL SESPA DE
**LA TERAPIA CON MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN
TENOFОВIR ALAFENAMIDA PARA LA INFECCIÓN POR VIH**

MEDICAMENTOS CON TENOFОВIR ALAFENAMIDA (TAF) :

Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida (Genvoya®) 150mg/150mg/200mg/10mg comprimidos

Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida (Descovy®) 200mg/25mg y 200mg/10mg comprimidos

Darunavir/Cobicistat/Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida (Symtuza®) 800 mg /150 mg /200mg/10mg comprimidos

Emtricitabina/Rilpivirina/Tenofovir Alafenamida (Odefsey®) 200mg/25mg/25mg comprimidos

CLASIFICACIÓN ATC: J05AR -Combinación de antivirales para el tratamiento de infecciones por VIH

CELEBRACIÓN DE LA CURMP: Oviedo, 27 de abril y 28 de septiembre de 2018.

Se recomienda que SE INCLUYAN EN LA GFT con recomendaciones específicas (D-1):

PACIENTES PRETRATADOS

En estos pacientes cualquier medicamento que contenga **TENOFОВIR ALAFENAMIDA (TAF)** se debe utilizar en vez de **TENOFОВIR DISOPROXILO (TD)** cuando se cumpla al menos uno de los siguientes criterios”

- Enfermedad renal crónica ($FGe \leq 60$ mL/ min o $P/C > 200$ mg/g (0,2)).
- FGe entre 90-60 mL/ min con caída del filtrado glomerular (disminución del filtrado glomerular de al menos 5 mL/ min confirmada en dos determinaciones consecutivas).
- Hipofosfatemia de origen renal.
- Glucosuria en no diabéticos.
- Comorbilidades con alto riesgo de ERC (por ejemplo diabetes o hipertensión).
- Comedicación con fármacos nefrotóxicos o toxicidad previa por TDF.
- Osteoporosis/osteopenia o factores de riesgo.
- Historia de fracturas por fragilidad.
- Riesgo de fractura osteoporótica mayor por $FRAX > 10\%$.

PACIENTES NAIVE

Quedan incluidos los combos que contienen TAF como alternativa a otras combinaciones de fármacos en comprimido único para inicio de tratamiento en pacientes naive, atendiendo a criterios de eficiencia.