



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS (CURMP) SOBRE LA INCLUSIÓN EN LA GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA DEL SESPA DE
BEVACIZUMAB EN CÁNCER DE OVARIO

MEDICAMENTO: BEVACIZUMAB (Avastin® 25 mg/mL 16mL vial).

CLASIFICACIÓN ATC: L01XC07 perteneciente al grupo farmacológico: anticuerpos monoclonales (antineoplásicos).

INDICACIÓN:

- a) En combinación con carboplatino y paclitaxel para el tratamiento en primera línea del cáncer avanzado de ovario epitelial (CO), trompa de Falopio, o peritoneal primario en los estadios IIIB, IIIC y IV según la clasificación FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) en pacientes que presenten citorreducción subóptima (>1cm residual), y los estadios IV no quirúrgicos [17/11/2011].
- b) En combinación con carboplatino y gemcitabina para el tratamiento de pacientes adultos con CO epitelial, trompa de Falopio, o peritoneal primario sensible al platino tras primera recaída que no hayan recibido tratamiento previo con bevacizumab, otros inhibidores VEGF (Factor de crecimiento Endotelial Vascular) o agentes dirigidos frente a receptores VEGF [27/05/2015].
- c) En combinación con paclitaxel, topotecan, o doxorubicina liposomal pegilada (DLP) para el tratamiento de pacientes adultos con CO epitelial, de trompa de Falopio o peritoneal primario recurrente resistente a platino que no hayan recibido más de dos regímenes de quimioterapia previos y no hayan recibido tratamiento previo con bevacizumab u otros inhibidores VEGF o agentes dirigidos frente a receptores VEGF [27/05/2015].

CELEBRACIÓN DE LA CURMP: Oviedo, 17 de junio de 2016.

DECISIÓN ADOPTADA: Categoría D-1: Se incluye en la Guía Farmacoterapéutica con recomendaciones específicas:

- En combinación con carboplatino y paclitaxel en primera línea en pacientes con cáncer avanzado (estadios III y IV) de ovario epitelial, trompa de Falopio o peritoneal primario con enfermedad residual o de mal pronóstico después de cirugía.
- En combinación con carboplatino y gemcitabina para el tratamiento de pacientes adultos con CO epitelial, trompa de Falopio, o peritoneal primario sensible al platino tras primera recaída que no hayan recibido tratamiento previo con bevacizumab, otros inhibidores VEGF o agentes dirigidos frente a receptores VEGF.
- En combinación con paclitaxel, topotecan, o doxorubicina liposomal pegilada para el tratamiento de pacientes adultos con CO epitelial, de trompa de Falopio o peritoneal primario recurrente resistente a platino que no hayan recibido más de dos regímenes de quimioterapia previos y no hayan recibido tratamiento previo con bevacizumab u otros inhibidores VEGF o agentes dirigidos frente a receptores VEGF.
- Bevacizumab no se utilizará asociado a olaparib.