




Atención maternal y neonatal

I Encuesta de opinión



INFORME PARCIAL **HOSPITAL ÁLVAREZ-BUYLLA**

Septiembre 2010

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. DEFINICIÓN DEL ESTUDIO	1
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO	2
3. PLAN DE INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA	3
4. MUESTRA ENCUESTADA. ANÁLISIS DE REPRESENTATIVIDAD DEL TRABAJO	5
5. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA MUESTRA	6
6. EXPLOTACIÓN CUANTITATIVA DE LA INFORMACIÓN	11
SECCIÓN A: Resultado del parto y nacimiento	12
SECCIÓN B: La atención durante el embarazo.....	20
SECCIÓN C: El parto y el nacimiento de la criatura.....	38
SECCIÓN D: Atención en el hospital después del parto	62
SECCIÓN E: Cuidados especiales de la criatura	67
SECCIÓN F: La alimentación de la criatura.....	71
SECCIÓN G: Valoración global de la atención.....	79
7. ANEXO: CUESTIONARIO	83

Grupo de trabajo de elaboración del cuestionario y diseño del estudio:

Álvarez Iglesias, Gema. Socióloga. Área de Promoción de la Salud y Participación. DGSP
Bruno Bárcena, Julio. Médico. Área de Promoción de la Salud y Participación. DGSP
Donate Suárez, Ignacio. DUE. Servicio de Salud Poblacional. DGSP
García González, M^a Carmen. Médica. Servicio de Salud Poblacional. DGSP
Muslera Canclini, Elvira. Licenciada en Económicas. Unidad de Análisis y Programas. SESPA
Uría Urraza, M^a Angeles. Socióloga. Instituto Asturiano de la Mujer

Extracción de bases de datos hospitalarias:

Díaz Pérez, Sonia. Área de Sistemas de Información. SESPA.
Martínez Noval, José Antonio. Área de Sistemas de Información. SESPA.

Explotación y análisis estadístico:

Área de Consultoría y Estudios de COTESA (Grupo Tecopy)

Análisis de resultados, elaboración y redacción del Informe final

Bruno Bárcena, Julio. Médico. Área de Promoción de la Salud y Participación. DGSP
García González, M^a Carmen. Médica. Servicio de Salud Poblacional. DGSP
Uría Urraza, M^a Angeles. Socióloga. Instituto Asturiano de la Mujer

Apoyo administrativo

Casal Iglesias, María Ángeles. Secretaria General Técnica
Carretero de Lama, Rosa María. Área de promoción de la Salud DGSP

Coordinación y dirección del proyecto:

Julio Bruno Bárcena. Área de Promoción de la Salud y Participación

Promueve: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias

Edita: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias. Web : <http://www.astursalud.es>

Para citar este estudio:

Bruno Bárcena, J; Uría Urraza, M A; García González, MC; Donate Suárez, I; Muslera Canclini, E; Álvarez Iglesias, G. Atención maternal y neonatal. I Encuesta de opinión. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Principado de Asturias. 2010. www.astursalud.es

FINANCIACIÓN:

Este trabajo ha sido realizado en el marco de las subvenciones reguladas por el RD 924 de 29 de mayo del 2009 del Ministerio de Sanidad y Política Social para la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud.

1. DEFINICIÓN DEL ESTUDIO

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias a través de la Dirección General de Salud Pública y Participación desarrolla un proyecto de investigación con el objetivo de conocer la situación actual de las prácticas clínicas, el nivel de información, participación y satisfacción de las mujeres asturianas respecto a los procesos de parto y nacimiento en el periodo de referencia acotado entre la segunda mitad de 2008 y el primer semestre de 2009.

Este documento representa el Informe Final relativo a la *Encuesta de opinión sobre Atención maternal y neonatal en el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias*, circunscrito al **Hospital Álvarez-Buylla**.

La información que se investiga comprende ocho grandes grupos de información que pretenden abarcar el mayor número posible de ópticas en relación al fenómeno estudiado con el fin de obtener una visión completa sobre el mismo.

La opinión vertida en los cuestionarios por las usuarias actuará como variable definitiva de la evaluación de la calidad del servicio materno-infantil en la sanidad pública, siendo base para fundamentar futuras actuaciones en esta materia encaminadas a la mejora de la atención en el proceso de embarazo, parto y puerperio y el consiguiente incremento de la satisfacción de las madres asistidas.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo básico perseguido es el conocimiento de la percepción que tienen las mujeres usuarias de los servicios de obstetricia y neonatología del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias en el Hospital Álvarez-Buylla en relación a un conjunto de aspectos relacionados con su proceso de embarazo, parto y nacimiento.

La información que se solicita en el cuestionario se encuentra estructurada en los siguientes bloques temáticos, permitiendo alcanzar los fines para los que se lleva a cabo esta investigación.

- Sección A: Resultado del parto y nacimiento
- Sección B: La atención durante el embarazo
- Sección C: El parto y el nacimiento de la criatura
- Sección D: Atención en el Hospital después del parto
- Sección E: Cuidados especiales de la criatura
- Sección F: La alimentación de la criatura
- Sección G: Valoración global de la atención
- Sección H: Usted y su familia

3. PLAN DE INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA

Los aspectos técnicos definitorios del estudio desarrollado son los siguientes:

- El **ámbito geográfico** de este estudio se encuentra constituido por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
- Las **unidades de información** son las mujeres que han parido en el Hospital Álvarez-Buylla tomando como referencia la fecha límite de 30 de junio de 2009 y añadiendo usuarias hasta completar la muestra deseada; abarcando en este caso hasta el segundo semestre de 2008.
- El **ámbito temporal** que ha comprendido el proceso de recogida de información se fecha de 9 a 22 de diciembre de 2009.
- El **método de recogida de información** empleado es el denominado CATI (corresponde a las siglas Computer Asiste Telephone Interviewing); es decir; se trata de encuestas telefónicas asistidas por ordenador.

Además, se habilitaron un conjunto de medios alternativos para la realización y recepción de las encuestas:

- ⇒ **Fax gratuito:** 900 878 736
 - ⇒ **Correo electrónico:** encuestasatisfaccinatencionalparto@grupotecopy.es
 - ⇒ **Página Web:** http://www.grupotecopy.es/encuesta_asturias/index.html
 - ⇒ **Encuesta por correo ordinario**
- El **diseño muestral de** la investigación es de tipo estratificado semiprobabilístico. Consta de 2 etapas de estratificación. La primera de ella emplea como variable de segmentación los ocho Hospitales Públicos escogidos para formar parte de la investigación. La muestra total se encuentra distribuida entre estos hospitales de un modo proporcional al número de partos que hubo en cada uno de ellos durante el periodo considerado como de referencia. Al mismo tiempo se busca la representatividad de la muestra respecto a la variable edad, cumpliendo también criterios de proporcionalidad respecto a la población de referencia.

■ Distribución de la muestra para el Hospital:

HOSPITAL	TOTAL PARTOS 01/07/2008 a 30/06/2009	MUESTRA	% MUESTRA SOBRE PARTOS	REPARTO MUESTRA %
HOSPITAL ÁLVAREZ-BUYLLA	391	226	57,80 %	6,95 %
TOTAL	7.488	3253	43,44 %	100 %

- El **tamaño muestral** para el Hospital Álvarez-Buylla es de 226 encuestas; cifra que supone para un nivel de confianza del 95 % (en el supuesto de las condiciones más desfavorables $p=q=0,5$) un error de muestreo inferior al 5 %.

4. MUESTRA ENCUESTADA. ANÁLISIS DE REPRESENTATIVIDAD DEL TRABAJO

La muestra global definitiva del estudio se encuentra formada por 3.253 registros. Dentro de este informe se tendrán en cuenta además de los datos generales, los resultados individuales para el Hospital Álvarez-Buylla.

El estudio estructural de la muestra finalmente obtenida en función de las dos variables de muestreo (grupo de edad y Hospital de referencia), lleva a la aplicación de un factor ponderador respecto de esta segunda para los datos globales, como medida que corrija los efectos metodológicos empleados para la obtención de las muestras. Los datos origen para el cálculo del factor de ponderación han sido aportados por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) en relación a los partos en cada uno de los Hospitales del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias entre el 1/07/2008 y el 30/06/2009 .

En concreto, el factor de ponderación aplicado es el siguiente:

$$\left(\frac{\left(\frac{N_i}{N_t} \right)}{\left(\frac{n_i}{n_t} \right)} \right)$$

Ni= número de mujeres que hay en cada área sanitaria
Nt= número de mujeres que hay en la población de referencia
ni= número de mujeres que hay en cada estrato de la muestra de cada área
nt=número total de mujeres que componen la muestra

De esta forma, los resultados particulares para el Hospital Álvarez-Buylla serán presentados sin la aplicación del factor ponderador. Sin embargo, los resultados comparativos referentes al conjunto de la muestra, sí estarán calculados con dicho estadístico, eliminando de este modo sesgos en el estudio de los datos.

La utilización de un factor de ponderación en la obtención de los resultados definitivos de la encuesta supone la aplicación de elementos decimales a los pesos de las distintas opciones de respuesta de cada una de las preguntas. El programa estadístico empleado para la explotación estadística de la encuesta (SPSS 15); emplea estos factores decimales en su proceso de trabajo. Así, por un lado toma el factor ponderador para realizar el cálculo de los resultados; si bien, muestra estos resultados en términos de números enteros (en la columna de frecuencias).

Como consecuencia de estas dos operativas, pueden darse casos en que el resultado total que se visualiza no coincide con el correspondiente a la suma de las frecuencias parciales, creándose pequeñas diferencias (± 1 elemento); no significando en ningún caso que se hayan añadido o quitado elementos muestrales a esa cuestión; sino siendo consecuencia de la operación estadística realizada por el programa.

5. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA MUESTRA

La definición del perfil sociodemográfico de las usuarias de Asturias correspondientes al Hospital Álvarez-Buylla viene marcada por el conjunto de variables que se muestran a continuación:

■ EDAD

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	De 15 a 19 años	9	4,0	4,0	4,0
	De 20 a 24 años	33	14,6	14,6	18,6
	De 25 a 29 años	51	22,6	22,6	41,2
	De 30 a 34 años	77	34,1	34,1	75,2
	35 y más años	56	24,8	24,8	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 1: Distribución de las usuarias según su edad

La distribución de las mujeres que parieron en el Hospital Álvarez-Buylla en función de su edad es ligeramente más joven que la obtenida para el conjunto de la muestra, ya que, las mujeres totales de 35 años o más representan el 30 %, mientras que en el caso de Álvarez-Buylla forman el 24,8%.

■ NIVEL DE ESTUDIOS

Estratos definidos para el estudio de la variable:

1. Hasta primarios:

- Sin estudios o estudios primarios incompletos: menos de 6 años o cursos de primaria aprobados.
- Estudios primarios completos: 6º EGB aprobado, Certificado escolaridad, 6 años o cursos de primaria aprobados.

2. Medios:

- Estudios secundarios 1ª etapa: 8º EGB aprobado, Graduado Escolar, Bachillerato Elemental, Formación Profesional de 1º Grado o Ciclos Formativos de Grado medio Aprobados, ESO aprobada, 4 años o cursos de secundaria aprobados.

- Estudios secundarios 2ª etapa: BUP, Bachillerato Superior, Bachillerato LOGSE, COU, Preu, Formación Profesional 2º Grado o Ciclos Formativos de Grado Superior, 5 o más cursos de secundaria aprobados.

3. Universitarios:

- Estudios universitarios medios: Diplomatura, Magisterio, Arquitectura o Ingeniería Técnica.
- Estudios universitarios superiores: Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería Superior, Doctorado.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Hasta primarios	15	6,6	6,6	6,6
	Medios	143	63,3	63,3	69,9
	Universitarios	68	30,1	30,1	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 2: Distribución de las usuarias según su nivel de estudios

La mayor diferencia en el nivel de estudios entre el Hospital Álvarez-Buylla y los datos globales radica en las universitarias que forman el 39,7 % de las mujeres que dieron a luz en los hospitales de Asturias, frente al 30,1 % de las mujeres que fueron atendidas en el Hospital Álvarez-Buylla.

■ ESTADO CIVIL

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Soltera	31	13,7	13,7	13,7
	Casada	136	60,2	60,2	73,9
	Vive en pareja	53	23,5	23,5	97,3
	Viuda	1	,4	,4	97,8
	Separada	1	,4	,4	98,2
	Divorciada	4	1,8	1,8	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 3: Distribución de las usuarias según su estado civil

El porcentaje de mujeres casadas que han dado a luz en el Hospital Álvarez-Buylla es del 60,2 %, suponiendo casi 12 puntos porcentuales por debajo del correspondiente a las mujeres casadas de los datos globales de este estudio, (71,5%).

■ PAÍS ORIGEN

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	España	218	96,5	96,5	96,5
	Otro	8	3,5	3,5	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 4: Distribución de las usuarias según su nacionalidad

La distribución de las madres del Hospital Álvarez-Buylla respecto a su nacionalidad es superior a la presentada por el conjunto de los hospitales (90,9 %), representando en este caso el 96,5 % de mujeres que dieron a luz en el Hospital Álvarez-Buylla y que tienen nacionalidad española.

Entre las mujeres que pertenecen a otro país destacan aquellas procedentes de la República Dominicana, siendo en su mayoría entre 5 y 10 años el tiempo que han transcurrido viviendo en España.

■ MUNICIPIO DE EMPADRONAMIENTO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Municipio del Área Sanitaria	202	89,4	89,4	89,4
	Municipio fuera del Área Sanitaria	24	10,6	10,6	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 5: Distribución de las usuarias según su municipio de empadronamiento

La distribución de la variable relativa a la pertenencia del municipio de empadronamiento al Área Sanitaria es del 89,4 % para el Hospital Álvarez-Buylla, frente al 92,3 % del total de Asturias.

■ TAMAÑO DEL MUNICIPIO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Menos de 3.000 hab.	1	,4	,4
	Entre 3.000 y 24.999 hab.	69	30,5	31,0
	Entre 25.000 y 79.999 hab.	140	61,9	92,9
	80.000 hab. o más	16	7,1	100,0
	Total	226	100,0	100,0

Tabla 6: Distribución de las usuarias según el tamaño de su municipio de empadronamiento

En base a los datos mostrados en la tabla, las mujeres atendidas por este servicio en el Hospital Álvarez-Buylla pertenecen a municipios entre 25.000 y 79.999 habitantes en su mayoría (61,9 %), marcando una clara diferencia respecto a los datos globales (12,2 %). Esta información da idea de la importancia de estos núcleos para el Área de referencia.

No todas las usuarias tienen fijada su residencia en el Principado de Asturias, ya que un porcentaje inferior al 2 % pertenece a otras regiones.

■ SITUACIÓN DE EMPLEO

En activo: Trabajando, Trabajando con baja de tres meses o más, en desempleo.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	En activo	197	87,2	87,2
	Trabajo doméstico no remunerado	27	11,9	99,1
	Trabajos sociales no remunerados	1	,4	99,6
	Otras	1	,4	100,0
	Total	226	100,0	100,0

Tabla 7: Distribución de las usuarias según su situación laboral

La situación en el mercado de empleo se caracteriza por un considerable porcentaje de personas que dan a luz y que desempeñan un trabajo profesional. Los datos muestran que el 87,2 % de mujeres en el Hospital Álvarez-Buylla se encuentran en activo, mientras que en los datos globales esta cifra alcanza el 84,6 %.

■ OCUPACIÓN/SITUACIÓN LABORAL

Todos aquellos casos en que la encuestada era estudiante, la ocupación se refería a la persona principal del hogar. Si se estaba buscando empleo, la cuestión era referente a la última ocupación. Las mujeres con trabajos no remunerados (domésticos o sociales) no respondieron a esta pregunta.

La asignación para esta variable ha sido:

1. Trabajador por cuenta propia:

- Trabajador por cuenta propia sin asalariados/as; con menos de 10 asalariados/as; con más de 10 asalariados/as.

2. Gerente de empresa:

- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados/as; con más de 10 asalariados/as

3. Capataz, supervisora o encargada:

- Capataz, supervisora o encargada

4. Otro tipo de asalariado

- Otro tipo de asalariado

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Trabajador por cuenta propia	28	12,4	15,0	15,0
	Capataz, supervisor/a, encargado/a	6	2,7	3,2	18,2
	Otro tipo de asalariado	153	67,7	81,8	100,0
	Total	187	82,7	100,0	
	Ns/Nc	39	17,3		
Total		226	100,0		

Tabla 8: Distribución de las usuarias según su ocupación

En este caso, el 81,8 % de las mujeres de Álvarez-Buylla indicaban que su ocupación actual se basa en trabajar como asalariado de forma distinta a los autónomos, capataces y gerentes de empresa. Este dato supone una diferencia con respecto al 86,3 % correspondiente al total de las mujeres en el Principado de Asturias que respondieron de la misma forma a esta cuestión.

6. EXPLOTACIÓN CUANTITATIVA DE LA INFORMACIÓN

El presente epígrafe contiene los resultados relativos a la explotación estadística de la información recopilada en el trabajo de campo, datos relativos a las valoraciones emitidas en la *Encuesta de opinión de atención maternal y neonatal en el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias*.

De este modo se muestran los resultados y conclusiones más significativas y relevantes que se desprenden de la encuesta telefónica realizada a las mujeres que dieron a luz en el **Hospital Álvarez-Buylla** durante el periodo de referencia **en comparativa con los resultados obtenidos del conjunto de la investigación** (total del Principado de Asturias).

Los resultados para el Hospital Álvarez-Buylla son de tipo muestral mientras que los globales se encuentran transformados tras la aplicación del factor de ponderación.

En ambos casos estos datos han sido plasmados en tablas y gráficos de frecuencias, tablas de contingencia; y todas aquellas otras pruebas o formas de representar la información que se consideran necesarias para la adecuada presentación y análisis de los datos.

SECCIÓN A: RESULTADO DEL PARTO Y NACIMIENTO
p_00. Tipo de parto
 Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Parto vaginal	188	83,2	83,2	83,2
	Parto por cesárea	38	16,8	16,8	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 9: Tipo de parto, Hospital Álvarez-Buylla

 Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Parto vaginal	2622	80,6	80,6	80,6
	Parto por cesárea	631	19,4	19,4	100,0
	Total	3253	100,0	100,0	

Tabla 10: Tipo de parto

Si se tiene en cuenta exclusivamente las respuestas de las mujeres del Hospital Álvarez-Buylla, el 83,2 % tuvieron un parto vaginal, cuando en el total de los hospitales públicos del Principado de Asturias el 80,6 % fueron partos vaginales. Los restantes 16,8 %, del Hospital Álvarez-Buylla, y 19,4 % son los partos producidos por cesárea en cada área.

Es posible realizar un análisis más exhaustivo de los partos vaginales, para lo que se ha empleado la siguiente categorización: parto vaginal natural, utilizando fórceps o utilizando ventosa o paleta cuyos resultados son éstos.

 Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Natural	167	88,8	88,8	88,8
	Utilizando fórceps	1	,5	,5	89,4
	Utilizando una ventosa o paleta sobre la cabeza del bebé	20	10,6	10,6	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

Tabla 11: Distribución de los partos vaginales, Hospital Álvarez-Buylla

❑ Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Natural	1941	74,0	74,0
	Utilizando fórceps	96	3,7	77,7
	Utilizando una ventosa o paleta sobre la cabeza del bebé	585	22,3	100,0
	Total	2622	100,0	100,0

Tabla 12: Distribución de los partos vaginales

En este caso, de las mujeres que tuvieron un parto vaginal en el Hospital Álvarez-Buylla, el 88,8 % dieron a luz de forma natural (parto eutócico), mientras que para la totalidad de las mujeres fue el 74 %.

En cuanto a los partos que fueron mediante cesárea, también es posible obtener una distribución más específica:

❑ Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Programada	16	42,1	42,1
	No programada, se decidió después de llegar al Hospital	22	57,9	100,0
	Total	38	100,0	100,0

Tabla 13: Distribución de los partos por cesárea, Hospital Álvarez-Buylla

❑ Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Programada	249	39,4	39,4
	No programada, se decidió después de llegar al Hospital	382	60,6	100,0
	Total	631	100,0	100,0

Tabla 14: Distribución de los partos por cesárea

En el Hospital Álvarez-Buylla la programación se acerca más al 50 % que en los resultados globales, formando el 42,1 % las cesáreas realizadas que estaban programadas,

mientras el restante 57,9 % no estaban previstas. Por tanto, la incidencia en la programación de la cesárea es más significativa para las mujeres que dieron a luz en el Hospital Álvarez-Buylla que para los datos totales.

Como complemento a esta información se expone el tipo de anestesia con la que fueron realizadas las cesáreas.

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Con anestesia general	6	15,8	16,7	16,7
	Con anestesia epidural	30	78,9	83,3	100,0
	Total	36	94,7	100,0	
	Ns/Nc	2	5,3		
Total		38	100,0		

Tabla 15: Tipo de anestesia empleada en las cesáreas, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Con anestesia general	91	14,5	15,2	15,2
	Con anestesia epidural	510	80,8	84,8	100,0
	Total	601	95,3	100,0	
	Ns/Nc	29	4,7		
Total		631	100,0		

Tabla 16: Tipo de anestesia empleada en las cesáreas

En la gran mayoría de las ocasiones las mujeres responden que la anestesia empleada para las cesáreas fue de tipo epidural, en el Hospital Álvarez-Buylla se utilizó en un 83,3 % de las ocasiones, mientras en los hospitales de Asturias se empleó en el 84,8 % de las cesáreas. Este tipo de respuesta precisa de un contrato en el propio centro para discriminar la anestesia empleada en la cesárea de la posible analgesia iniciada en la dilatación. El hecho de que las cesáreas se realicen con anestesia raquídea es un dato de calidad pero debe contrastarse.

p_01. Con respecto a este último parto:

 Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Fue a su tiempo	160	70,8	71,7	71,7
	Fue prematuro espontáneo	34	15,0	15,2	87,0
	Se adelantó y me lo provocaron	10	4,4	4,5	91,5
	Fue un retraso espontáneo	16	7,1	7,2	98,7
	Se retrasó y me lo provocaron	3	1,3	1,3	100,0
	Total	223	98,7	100,0	
Ns/Nc		3	1,3		
Total		226	100,0		

Tabla 17: Tiempo en el que se produjo el parto, Hospital Álvarez-Buylla

 Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Fue a su tiempo	1929	59,3	61,1	61,1
	Fue prematuro espontáneo	503	15,5	15,9	77,0
	Se adelantó y me lo provocaron	239	7,3	7,6	84,6
	Fue un retraso espontáneo	312	9,6	9,9	94,5
	Se retrasó y me lo provocaron	175	5,4	5,5	100,0
	Total	3158	97,1	100,0	
Ns/Nc		95	2,9		
Total		3253	100,0		

Tabla 18: Tiempo en el que se produjo el parto

Como queda patente en los resultados obtenidos; la consecución del parto en las fechas en que éste estaba previsto es más habitual en el Hospital Álvarez-Buylla con el 71,7 % que en los datos totales con 61,1 % de las veces.

Esta variable puede recodificarse de acuerdo a las tres opciones de respuesta principales, quedando la distribución en este caso de la siguiente manera:

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	A término	160	70,8	71,7	71,7
	Pretérmino	44	19,5	19,7	91,5
	Postérmino	19	8,4	8,5	100,0
	Total	223	98,7	100,0	
Ns/Nc		3	1,3		
Total		226	100,0		

Tabla 19: Tiempo en el que se produjo el parto, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	A término	1929	59,3	61,1	61,1
	Pretérmino	742	22,8	23,5	84,6
	Postérmino	487	15,0	15,4	100,0
	Total	3158	97,1	100,0	
Ns/Nc		95	2,9		
Total		3253	100,0		

Tabla 20: Tiempo en el que se produjo el parto

En la tabla de frecuencias del Hospital Álvarez-Buylla se aprecian diferencias entre la proporción de los partos que fueron antes y los que fueron después de tiempo, formando respectivamente el 19,7 % y el 8,5 %. Sin embargo, en los datos de la totalidad de las mujeres, el 23,5 % dieron a luz antes de tiempo y el 15,4 % se atrasó de la fecha prevista del parto, resultando unos porcentajes superiores en ambos casos a los de Álvarez-Buylla.

p_02. ¿Ha tenido algún otro parto anterior?

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	81	35,8	35,8	35,8
	No	145	64,2	64,2	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 21: Madres que han tenido algún parto anterior, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1213	37,3	37,4	37,4
	No	2026	62,3	62,6	100,0
	Total	3239	99,6	100,0	
Ns/Nc		14	,4		
Total		3253	100,0		

Tabla 22: Madres que han tenido algún parto anterior

En los dos ámbitos del estudio, la comparativa es similar mostrando que el 35,8 % de las mujeres del Hospital Álvarez-Buylla tuvieron un parto anterior, mientras que el 64,2 % restante fueron primerizas.

A continuación, en relación a las mujeres que han indicado que éste no era su primer parto, se analiza el número de partos anteriores para las mismas:

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1 parto	71	87,7	88,8	88,8
	2 - 3 partos	9	11,1	11,3	100,0
	Total	80	98,8	100,0	
Ns/Nc		1	1,2		
Total		81	100,0		

Tabla 23: Número de partos anteriores de las madres múltiparas, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1 parto	1012	82,4	84,6	84,6
	2 - 3 partos	172	14,0	14,4	99,0
	>=4 partos	12	1,0	1,0	100,0
	Total	1196	97,4	100,0	
Ns/Nc		32	2,6		
Total		1228	100,0		

Tabla 24: Número de partos anteriores de las madres múltiparas

Las tablas de resultados muestran que, si se compara el Hospital Álvarez-Buylla con el total de los hospitales, las mujeres múltiparas del Hospital Álvarez-Buylla han tenido menos

partos anteriores, dado que el 11,3 % había tenido más de un parto, mientras que el 15,4 % de la totalidad de las mujeres ya había tenido al menos dos partos con anterioridad.

Es posible realizar un estudio cuantitativo para esta variable. En dicho estudio se detecta la existencia de casos en los que el número de partos resultan valores atípicos o extremos y que, por tanto, son eliminados del análisis para que éste sea lo más ajustado posible al comportamiento medio real de la variable.

❑ Resultado Hospital

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Número de partos incluido el actual	225	1	3	1,40	,566

Tabla 25: Número de partos incluido el actual, Hospital Álvarez-Buylla

❑ Resultado Global

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Número de partos incluido el actual	3153	1	3	1,40	,571

Tabla 26: Número de partos incluido el actual

Tras el análisis de esta pregunta se concluye que, en término medio, las usuarias que han dado a luz en el Hospital Álvarez-Buylla tienen la misma media que el total de mujeres del Principado de Asturias: 1,4 hijos.

p_03. ¿Cuánto pesó su criatura al nacer?

Esta cuestión no fue contestada por aquellos casos en los que el resultado del parto fue “feto muerto al nacimiento” o “nacido vivo que murió después del nacimiento”.

Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1.500 - 2.399 gr.	6	2,7	2,7
	2.400 - 3.499 gr.	150	67,0	70,0
	>=3.500 gr.	67	29,9	100,0
	Total	223	99,6	100,0
Ns/Nc	1	,4		
Total	224	100,0		

Tabla 27: Peso de la criatura en el nacimiento, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1.000 - 1.499 gr	14	,4	,4
	1.500 - 2.399 gr.	152	4,7	5,2
	2.400 - 3.499 gr.	2063	63,6	70,2
	>=3.500 gr.	948	29,2	100,0
	Total	3177	98,0	100,0
Ns/Nc	65	2,0		
Total	3242	100,0		

Tabla 28: Peso de la criatura en el nacimiento

Sin tener en cuenta a las personas que no han contestado a esta pregunta, el porcentaje de niños o niñas nacidas en el Hospital Álvarez-Buylla con un peso que oscila entre los 2.400 y los 3.499 gramos es de 67,3 %, mientras que el de los que superan o igualan los 3.500 gramos forman el 30 %.

Es posible realizar un estudio cuantitativo para esta variable. En dicho estudio se detecta la existencia de casos en los pesos de las criaturas que resultan valores atípicos o extremos y que, por tanto, son eliminados del análisis para que éste sea lo más ajustado posible al comportamiento medio real de la variable.

Resultado Hospital

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
¿Cuánto peso su criatura al nacer?	217	2280	4250	3278,95	388,020

Tabla 29: Peso de la criatura en el nacimiento, Hospital Álvarez-Buylla

❑ Resultado Global

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
¿Cuánto peso su criatura al nacer?	3116	1965	4425	3227,70	457,377

Tabla 30: Peso de la criatura en el nacimiento

El estudio cuantitativo de esta variable indica que el peso medio de las criaturas que nacieron en el Hospital Álvarez-Buylla es de 3.278,95 gramos; encontrando niños/as que llegaron a un peso de 4.250 gramos. Comparativamente con los datos globales, éstos son un poco inferiores siendo el peso medio de 3.227,70 gramos

SECCIÓN B: LA ATENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO

➤ EL INICIO DEL EMBARAZO

p_04. ¿Qué profesional la atendió por primera vez en su embarazo?

❑ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Médica/o de familia	66	29,2	29,2	29,2
	Ginecólogo/a	43	19,0	19,0	48,2
	Matrona/on	117	51,8	51,8	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 31: Profesional que atendió a la mujer por primera vez en su embarazo, Hospital Álvarez-Buylla

❑ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Médica/o de familia	1392	42,8	42,9	42,9
	Ginecólogo/a	759	23,3	23,4	66,3
	Matrona/on	1072	33,0	33,0	99,3
	Otro	24	,7	,7	100,0
	Total	3247	99,8	100,0	
Ns/Nc		6	,2		
Total		3253	100,0		

Tabla 32: Profesional que atendió a la mujer por primera vez en su embarazo

En el 29,2 % de las ocasiones fue el médico de familia quien atendió por primera vez a las usuarias de Álvarez-Buylla en su embarazo, mientras que es mayor en los resultados globales con el 42,9% de las veces. Sin embargo, fue el matrn/a para el 51,8 % de las mujeres de este hospital quien atendió por primera vez a la paciente y el 33 % del total de mujeres en Asturias. En sntesis, la mujer de este hospital fue ms atendida por el matrn/a que por el mdico o gineclogo/a, comparativamente con los datos globales.

p_05. Aproximadamente, ¿de cuantas semanas de gestación estaba cuando acudió por primera vez a esta consulta?

Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	<9 semanas	191	84,5	86,4
	9 semanas	16	7,1	93,7
	10 semanas	1	,4	94,1
	11 semanas	4	1,8	95,9
	12 semanas	4	1,8	97,7
	13 semanas	1	,4	98,2
	14 - 20 semanas	4	1,8	100,0
	Total	221	97,8	100,0
Ns/Nc	5	2,2		
Total	226	100,0		

Tabla 33: Semanas de gestación en la primera asistencia a consulta, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	<9 semanas	2857	87,8	89,2
	9 semanas	106	3,3	92,5
	10 semanas	72	2,2	94,7
	11 semanas	18	,6	95,3
	12 semanas	110	3,4	98,8
	13 semanas	3	,1	98,8
	14 - 20 semanas	37	1,1	100,0
	Total	3203	98,5	100,0
Ns/Nc	50	1,5		
Total	3253	100,0		

Tabla 34: Semanas de gestación en la primera asistencia a consulta

El número de semanas de gestación transcurridas hasta que la paciente acude por primera vez a la consulta son primordiales para la detección de anomalías cromosómicas. Así, el 89,2 % de las usuarias asistieron a la primera consulta médica a las 8 primeras semanas de gestación, mientras que, con la misma prontitud el 86,4% de las mujeres de Álvarez-Buylla acuden a la consulta.

El 95,3 % de las mujeres fueron captadas en las semanas preferentes de entrada en cribado (hasta la semana 11), mientras en el Hospital Álvarez-Buylla este dato alcanza el 95,9%.

Es posible realizar un estudio cuantitativo para esta variable. En dicho estudio se detecta la existencia de casos en los que las semanas de gestación para la asistencia a la consulta resultan valores atípicos o extremos y que, por tanto, son eliminados del análisis para que éste sea lo más ajustado posible al comportamiento medio real de la variable.

❑ Resultado Hospital

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
¿De cuántas semanas de gestación estaba cuanto acudió por primera vez a esta consulta?	217	1	13	5,96	2,365

Tabla 35: Semanas de gestación en la primera asistencia a consulta, Hospital Álvarez-Buylla

❑ Resultado Global

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
¿De cuántas semanas de gestación estaba cuanto acudió por primera vez a esta consulta?	3177	1	14	5,81	2,316

Tabla 36: Semanas de gestación en la primera asistencia a consulta

El tiempo medio de la primera consulta médica para las usuarias de Álvarez-Buylla es de 5,96 semanas, resultando ser superior a la media global que se sitúa más lejos de la sexta semana (5,81).

➤ LOS CONTROLES EN EL EMBARAZO

p_06. El seguimiento de su embarazo fue llevado a cabo:

☐ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	En la sanidad pública	176	77,9	77,9	77,9
	En la asistencia privada	2	,9	,9	78,8
	En ambas	48	21,2	21,2	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 37: Seguimiento del embarazo, Hospital Álvarez-Buylla

☐ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	En la sanidad pública	2289	70,4	70,6	70,6
	En la asistencia privada	45	1,4	1,4	72,0
	En ambas	905	27,8	27,9	99,9
	No acudí a ningún programa de seguimiento	2	,1	,1	100,0
	Total	3241	99,6	100,0	
Ns/Nc		12	,4		
Total		3253	100,0		

Tabla 38: Seguimiento del embarazo

Los resultados reflejan que el 70,6 % de las usuarias que conocían donde fue seguido el progreso de su embarazo, ha indicado que este tuvo lugar en la sanidad pública y si se considera únicamente a las usuarias de Álvarez-Buylla este resultado es del 77,9 %.

p_07. ¿Cuál fue la principal razón por la que eligió ir a la asistencia privada?

Esta pregunta se encontraba dirigida a aquellas mujeres que fueron atendidas durante su embarazo en la sanidad privada, bien exclusivamente o bien de forma conjunta con la sanidad pública.

Los distintos motivos y observaciones aportados por estas mujeres para la elección de la asistencia privada durante su embarazo han sido analizados y homogeneizados para un tratamiento más igualitario de la información; siendo los más relevantes los siguientes:

1. Deseo de realización de un mayor número de controles de los que se llevan a cabo en la sanidad pública; así como deseo de tener una segunda opinión sobre el embarazo que les proporcione mayor seguridad.
2. Deseo de realización de un mayor número de ecografías durante el embarazo; así como ecografías 3D, que poder llevarse a casa.
3. Habitualmente tienen seguimiento ginecológico privado (es el ginecólogo/a de toda la vida), continuando con el mismo durante el embarazo. Esto les proporciona mayor tranquilidad.
4. Se trataba de un embarazo en circunstancias especiales (riesgo de aborto o abortos en embarazos anteriores, etc.), por lo que la asistencia privada les daba mayor seguridad.
5. Disposición de un seguro médico privado de empresa.

p_08. ¿Qué profesionales le atendieron durante su embarazo y cuántos controles tuvo de cada uno de ellos?

Se trata de una pregunta de respuesta múltiple, lo que implica que cada encuestada podía señalar el número de opciones de respuesta que considerase necesario. Esto supone que la suma de los distintos porcentajes no tiene que ser 100.

Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje
Matrón/a	219	96,9%
Médico de familia	86	38,1%
Ginecólogo/a	226	100,0%
Otro profesional	0	,0%

Tabla 39: Profesionales que atendieron a las usuarias durante su embarazo, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje
Matrón/a	2728	83,9%
Médico de familia	617	19,0%
Ginecólogo/a	3151	96,9%
Otro profesional	122	3,7%

Tabla 40: Profesionales que atendieron a las usuarias durante su embarazo

En la atención durante el embarazo destacan, por las diferencias entre las tablas, el 96,9 % de las embarazadas en el Hospital Álvarez-Buylla que fueron atendidas por su matrón/a,

frente al 83,9 % del total de mujeres; y el 38,1 % de las mujeres de Álvarez-Buylla frente al 19 % de mujeres de los datos globales, que fueron atendidas por su médico de familia.

A continuación se analiza el número medio de controles que cada uno de los profesionales presentados realizaron a las usuarias durante su embarazo. En este cálculo han sido eliminados los casos considerados como extremos por poder distorsionar el comportamiento normal de la variable.

Profesional	Nº Medio de Controles en los Hospitales Públicos	Nº Medio de Controles en el Hospital Álvarez-Buylla
Matrón/a	4,68	4,78
Médico de familia	1,81	1,41
Ginecólogo/a	5,30	5,92
Otros	4,71	-

Tabla 40.1: Controles realizados por los profesionales sanitarios las usuarias durante su embarazo

En la tabla queda patente que, en el caso del Hospital Álvarez-Buylla, también es el ginecólogo/a el profesional que mayor número de controles realiza sobre las embarazadas con una media de 5,92 controles en cada embarazo.

p_09. Durante el embarazo, ¿la atendió siempre la misma persona?

a. Matrón/a

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	190	86,8	86,8	86,8
	No	29	13,2	13,2	100,0
	Total	219	100,0	100,0	

Tabla 41: Seguimiento del embarazo por parte del mismo matrón/a, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2010	73,7	73,7	73,7
	No	718	26,3	26,3	100,0
	Total	2728	100,0	100,0	

Tabla 42: Seguimiento del embarazo por parte del mismo matrn/a

En esta ocasión se solicitó a las mujeres que anteriormente indicaron haber sido atendidas por el matrn /a durante su embarazo, que señalaran si fueron siempre tratadas por el mismo profesional matrn o matrona. A este respecto se observa mayor fidelidad en los resultados de las respuestas de las mujeres de Álvarez-Buylla, ya que el 86,8 % ha respondido que sí, mientras el 13,2 % ha negado que les atendiera la misma persona.

b. Ginecólogo/a

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	30	13,3	13,3	13,3
	No	196	86,7	86,7	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 43: Seguimiento del embarazo por parte del mismo ginecólogo/a, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1147	36,4	36,4	36,4
	No	2002	63,5	63,6	100,0
	Total	3149	99,9	100,0	
Ns/Nc		2	,1		
Total		3151	100,0		

Tabla 44: Seguimiento del embarazo por parte del mismo ginecólogo/a

En esta ocasión también se analiza exclusivamente la opinión de las mujeres atendidas durante su embarazo por personal de ginecología.

La atención ginecológica durante el embarazo correspondió a los mismos profesionales en el 13,3 % de los casos en el Hospital Álvarez-Buylla; siendo un peso inferior al correspondiente con el ginecólogo/a de todas las áreas sanitarias estudiadas, llegando al 36,4 %.

p_10. A su juicio, la información que le dieron los profesionales sanitarios durante su embarazo fue:

☐ **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy adecuada	112	49,6	49,8	49,8
	Adecuada	103	45,6	45,8	95,6
	Poco adecuada	8	3,5	3,6	99,1
	Nada adecuada	2	,9	,9	100,0
	Total	225	99,6	100,0	
	Ns/Nc	1	,4		
Total		226	100,0		

Tabla 45: Valoración de la información proporcionada por los profesionales sanitarios durante el embarazo, Hospital Álvarez-Buylla

☐ **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy adecuada	1205	37,0	37,4	37,4
	Adecuada	1692	52,0	52,5	89,8
	Poco adecuada	247	7,6	7,7	97,5
	Nada adecuada	81	2,5	2,5	100,0
	Total	3225	99,1	100,0	
	Ns/Nc	28	,9		
Total		3253	100,0		

Tabla 46: Valoración de la información proporcionada por los profesionales sanitarios durante el embarazo

La información proporcionada durante el embarazo por los profesionales sanitarios del Hospital Álvarez-Buylla (sin especificar ninguna tipología) ha sido valorada de un modo positivo por el 95,6 % de las mujeres; calificándola el 45,8 % como “adecuada” y el 49,8 % como “muy adecuada”. Estos datos reflejan unos porcentajes que superan el nivel de satisfacción con respecto a los datos globales.

➤ PRUEBAS PRENATALES

p_11. Durante el embarazo, ¿le hicieron alguna de las siguientes pruebas para saber si el feto padecía defectos o malformaciones congénitas?

Se trata de una pregunta de respuesta múltiple, lo que implica que cada encuestada podía señalar el número de opciones de respuesta que considerase necesario. Esto supone que la suma de los distintos porcentajes no tiene que ser 100.

❑ Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje
Ecografías de alta resolución en la semana 12	170	75,2%
Amniocentesis (pinchazo en el vientre)	34	15,0%
Cribado combinado. Análisis de sangre en la semana 9-10	205	90,7%
No le hicieron ninguna prueba	7	3,1%
No sabe o no se acuerda	2	,9%

Tabla 47: Realización de pruebas para conocer si el feto padecía de algún tipo de malformaciones congénitas, Hospital Álvarez-Buylla

❑ Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje
Ecografías de alta resolución en la semana 12	2045	62,9%
Amniocentesis (pinchazo en el vientre)	474	14,6%
Cribado combinado. Análisis de sangre en la semana 9-10	2515	77,3%
No le hicieron ninguna prueba	259	8,0%
No sabe o no se acuerda	88	2,7%

Tabla 48: Realización de pruebas para conocer si el feto padecía de algún tipo de malformaciones congénitas

La analítica del primer trimestre es la prueba más habitual entre las embarazadas para conocer si el feto padecía defectos o malformaciones congénitas, tanto en el Hospital Álvarez-Buylla (90,7 %) como en el resultado completo de hospitales (77,3 %).

Se detecta que el porcentaje de los que ha señalado que no se llevó a cabo ningún tipo de prueba para conocer si el feto padecía algún tipo de malformación congénita es mayor en el conjunto de la población asturiana (8 %) que en el Hospital Álvarez-Buylla (3,1 %).

p_12. ¿Le pidieron consentimiento para hacerlas?

Esta pregunta se encontraba dirigida a las mujeres sometidas a algún tipo de prueba médica para conocer si el feto padecía defectos o malformaciones congénitas.

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	196	90,3	93,8	93,8
	No	13	6,0	6,2	100,0
	Total	209	96,3	100,0	
Ns/No recuerda		8	3,7		
Total		217	100,0		

Tabla 49: Solicitud de consentimiento para la realización de las pruebas médicas, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2391	82,3	89,8	89,8
	No	273	9,4	10,2	100,0
	Total	2664	91,7	100,0	
Ns/No recuerda		242	8,3		
Total		2906	100,0		

Tabla 50: Solicitud de consentimiento para la realización de las pruebas médicas

De entre aquellas mujeres que en la anterior de las cuestiones afirmaron haberse sometido a algún tipo de prueba médica para conocer si el feto padecía algún tipo de defecto o malformación congénita, destaca que el porcentaje de mujeres a las que les fue solicitado su consentimiento para realizar dicha prueba es menor en los datos totales que en los datos parciales del Hospital Álvarez-Buylla (el 89,8 % frente al 93,8 % respectivamente).

p_13. ¿Le dieron información suficiente y tuvo tiempo para tomar la decisión de hacerlas o no?

Esta pregunta se encontraba dirigida a las mujeres sometidas a algún tipo de prueba médica para conocer si el feto padecía defectos o malformaciones congénitas.

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	204	94,0	96,7	96,7
	No	7	3,2	3,3	100,0
	Total	211	97,2	100,0	
Ns/No recuerda		6	2,8		
Total		217	100,0		

Tabla 51: Valoración de la información y tiempo sobre las pruebas médicas, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2425	83,5	89,8	89,8
	No	275	9,5	10,2	100,0
	Total	2700	92,9	100,0	
Ns/No recuerda		206	7,1		
Total		2906	100,0		

Tabla 52: Valoración de la información y tiempo sobre las pruebas médicas

Se observa en la tabla de resultados que existe una percepción general positiva en relación a la información proporcionada sobre las pruebas a realizar y el tiempo proporcionado para tomar la decisión de llevarlas a cabo en el Hospital Álvarez-Buylla, puesto que el 96,7 % de las mujeres que sí han contestado a esta pregunta, han respondido positivamente. El resultado global de Asturias positivo alcanza el 89,8 %.

p_14. ¿Por qué razón no le hicieron pruebas para saber si el feto padecía alguna alteración?

Esta cuestión solamente fue contestada por aquellas mujeres a las que no les fueron realizadas ningún tipo de pruebas médicas para conocer si el feto padecía algún tipo de alteración.

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No me las propusieron	5	71,4	71,4	71,4
	No quiso hacerlas	2	28,6	28,6	100,0
	Total	7	100,0	100,0	

Tabla 53: Motivos por los que no fueron realizadas las pruebas médicas para conocer si el feto padecía malformaciones, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No me las propusieron	140	53,8	67,2	67,2
	No quiso hacerlas	26	10,0	12,4	79,6
	Estaba fuera de plazo para hacerlas	23	8,9	11,1	90,7
	Otras	19	7,4	9,3	100,0
	Total	208	80,2	100,0	
Ns/No lo recuerda		51	19,8		
Total		259	100,0		

Tabla 54: Motivos por los que no fueron realizadas las pruebas médicas para conocer si el feto padecía malformaciones

Tal y como se muestra en la tabla, el 71,4 % de las usuarias del Hospital Álvarez-Buylla y el 67,2 % de los datos globales no se hicieron las pruebas médicas porque no se las propusieron.

p_15. Aproximadamente, ¿cuántas ecografías le hicieron en total durante su embarazo?

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	< 3 ecografías	4	1,8	1,8	1,8
	3 ecografías	22	9,7	10,0	11,8
	4 ecografías	44	19,5	19,9	31,7
	5 - 6 ecografías	108	47,8	48,9	80,5
	> 6 ecografías	43	19,0	19,5	100,0
Total		221	97,8	100,0	
Ns/No lo recuerda		5	2,2		
Total		226	100,0		

Tabla 55: Ecografías realizadas durante el embarazo, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	< 3 ecografías	99	3,0	3,1
	3 ecografías	1017	31,3	34,7
	4 ecografías	853	26,2	61,3
	5 - 6 ecografías	737	22,6	84,2
	> 6 ecografías	507	15,6	100,0
	Total	3211	98,7	100,0
Ns/No lo recuerda	42	1,3		
Total	3253	100,0		

Tabla 56: Ecografías realizadas durante el embarazo

El número de ecografías que las usuarias han indicado que les realizaron durante su embarazo ha sido categorizado tal y como se observa en las tablas. De las mismas se diferencia el 31,7 % de las mujeres totales, las cuales señalan que en su caso se llevaron a cabo 3 ecografías; mientras, el porcentaje de las que realizaron 3 ecografías en el Hospital Álvarez-Buylla es el 10 %.

Es posible realizar un estudio cuantitativo para esta variable. En dicho estudio se detecta la existencia de casos en los que el número de ecografías resultan valores atípicos o extremos y que, por tanto, son eliminados del análisis para que éste sea lo más ajustado posible al comportamiento medio real de la variable.

Resultado Hospital

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
¿Cuántas ecografías le hicieron en total, durante su embarazo?	215	2	9	5,16	1,465

Tabla 57: Ecografías realizadas durante el embarazo, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
¿Cuántas ecografías le hicieron en total, durante su embarazo?	3152	1	10	4,54	1,844

Tabla 58: Ecografías realizadas durante el embarazo

En la representación gráfica de la variables se observa como el número medio de los datos globales es de 4,54 ecografías; inferior por tanto a los resultados recogidos de las embarazadas en el Hospital Álvarez-Buylla que superan las 5 ecografías por término medio (5,16).

p_16. Durante su embarazo, ¿acudió a clases de preparación al parto en la sanidad pública?

❑ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	142	62,8	62,8	62,8
	No	84	37,2	37,2	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 59: Asistencia a clases de preparación al parto, Hospital Álvarez-Buylla

❑ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2094	64,4	64,6	64,6
	No	1150	35,3	35,4	100,0
	Total	3244	99,7	100,0	
	Ns/Nc	9	,3		
Total		3253	100,0		

Tabla 60: Asistencia a clases de preparación al parto

El 64,6 % de las mujeres han señalado que durante su embarazo sí acudieron a clases de preparación al parto en la sanidad pública, mientras que, un porcentaje inferior, el 62,8 % de las usuarias de Álvarez-Buylla afirma lo mismo.

El 35,4 % de todas y el 37,2 % de las restantes de este hospital indica que en su caso, no se acudió a estas clases, siendo los motivos principales de no asistencia los que se exponen a continuación.

Motivo por el que no se acudió a las clases de preparación al parto.

Cuestión respondida solamente por las usuarias que no asistieron a clases de preparación al parto.

Los resultados de esta pregunta son los siguientes.

□ **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No lo consideré necesario	44	52,4	52,4	52,4
	No me informaron de esas clases	4	4,8	4,8	57,1
	No he asistido por problemas de horarios	36	42,9	42,9	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

Tabla 61: Motivos de no asistencia a clases de preparación al parto, Hospital Álvarez-Buylla

□ **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No lo consideré necesario	567	49,3	49,8	49,8
	No me informaron de esas clases	120	10,4	10,5	60,3
	No había plazas libres	9	,8	,8	61,1
	No, porque asistí a clases prenatales privadas	45	3,9	3,9	65,0
	No he asistido por problemas de horarios	399	34,7	35,0	100,0
	Total	1139	99,1	100,0	
Ns/Nc		10	,9		
Total		1150	100,0		

Tabla 62: Motivos de no asistencia a clases de preparación al parto

Destaca que exista un porcentaje inferior de mujeres de Asturias (49,8 % frente al 52,4 %) que no fueron a clases pre -parto porque no consideró que esta asistencia fuera necesaria, respecto a las mujeres consideradas en el Hospital Álvarez-Buylla.

Los problemas con los horarios de las clases se convierten en otro de los motivos más argumentados por las mujeres que no asistieron a clases de preparación al parto en la sanidad pública, también esta vez en mayor medida que los datos globales puesto que alcanzan el 42,9 % de las mujeres pertenecientes a Álvarez-Buylla.

p_17. Si asistió a las clases...

Todas aquellas mujeres que no asistieron a clases de preparación al parto no respondieron a estas preguntas.

a. Valore la utilidad que le proporcionaron para el parto y el postparto

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy útiles	71	50,0	50,0	50,0
	Útiles	42	29,6	29,6	79,6
	Relativamente útiles	14	9,9	9,9	89,4
	Poco útiles	12	8,5	8,5	97,9
	Nada útiles	3	2,1	2,1	100,0
	Total	142	100,0	100,0	

Tabla 63: Valoración de la utilidad de las clases de preparación al parto, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy útiles	851	40,6	40,8	40,8
	Útiles	801	38,2	38,4	79,2
	Relativamente útiles	115	5,5	5,5	84,8
	Poco útiles	182	8,7	8,7	93,5
	Nada útiles	136	6,5	6,5	100,0
	Total	2085	99,6	100,0	
Ns/Nc		9	,4		
Total		2094	100,0		

Tabla 64: Valoración de la utilidad de las clases de preparación al parto

Se observa en la primera tabla, en comparación con los resultados globales, que para el 79,6 % de las mujeres que asistieron a clases de preparación al parto éstas fueron “útiles” (29,6 %) o “muy útiles” (50 %), es decir, el porcentaje de satisfacción alcanza en ambas áreas proporciones elevadas. Sin embargo, resultaron “poco” o “nada útiles” para el 10,6 % de las mujeres embarazadas en el Hospital Álvarez-Buylla.

b. ¿Tuvo la oportunidad de elegir el horario de asistencia a las clases?

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	10	7,0	7,1	7,1
	No	131	92,3	92,9	100,0
	Total	141	99,3	100,0	
Ns/Nc		1	,7		
Total		142	100,0		

Tabla 65: Posibilidad de elección del horario de asistencia a las clases, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	730	34,9	35,1	35,1
	No	1352	64,6	64,9	100,0
	Total	2082	99,4	100,0	
Ns/Nc		12	,6		
Total		2094	100,0		

Tabla 66: Posibilidad de elección del horario de asistencia a las clases

El 64,9 % de las madres que asistió a clases de preparación para el parto en la sanidad pública ha indicado que no tuvo la oportunidad de elegir el horario, mientras que para la misma pregunta, el porcentaje de mujeres en el Hospital Álvarez-Buylla es del 92,9 %.

c. Valore la adecuación del horario

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy adecuado	11	7,7	7,7	7,7
	Adecuado	86	60,6	60,6	68,3
	Relativamente adecuado	20	14,1	14,1	82,4
	Poco adecuado	20	14,1	14,1	96,5
	Nada adecuado	5	3,5	3,5	100,0
	Total	142	100,0	100,0	

Tabla 67: Valoración del horario de asistencia a las clases, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy adecuado	340	16,2	16,3	16,3
	Adecuado	1158	55,3	55,6	72,0
	Relativamente adecuado	138	6,6	6,6	78,6
	Poco adecuado	298	14,2	14,3	92,9
	Nada adecuado	147	7,0	7,1	100,0
	Total	2081	99,4	100,0	
Ns/Nc		12	,6		
Total		2094	100,0		

Tabla 68: Valoración del horario de asistencia a las clases

En relación al horario de las clases de preparación al parto del Hospital Álvarez-Buylla, la comparativa con los datos globales, vuelve a tener un nivel de satisfacción considerable con un 68,3 % que valora su adecuación de un modo positivo (60,6 % como adecuado y 7,7 % como muy adecuado). Manifiesta su postura contraria a dicho horario el 17,6 % de las mujeres; ya que lo califican en su caso como poco o nada adecuado (14,1 % y 3,5 % respectivamente).

d. ¿Estaba permitida la asistencia de su pareja o alguien de su elección?

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	89	62,7	73,6	73,6
	No	32	22,5	26,4	100,0
	Total	121	85,2	100,0	
Ns/Nc		21	14,8		
Total		142	100,0		

Tabla 69: Posibilidad de llevar un acompañante a las clases de preparación al parto, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1234	58,9	67,3	67,3
	No	601	28,7	32,7	100,0
	Total	1834	87,6	100,0	
Ns/Nc		260	12,4		
Total		2094	100,0		

Tabla 70: Posibilidad de llevar un acompañante a las clases de preparación al parto

Es destacable que, en el caso del Hospital Álvarez-Buylla, exista un 14,8 % de mujeres que desconocieran si estaba o no permitida la asistencia de un acompañante a sus clases de preparación al parto. Por otro lado, el 73,6 % confirma la posibilidad de acudir en compañía de otra persona siendo el 67,3 % el peso correspondiente a la totalidad de mujeres que han respondido de la misma forma.

SECCIÓN C: EL PARTO Y NACIMIENTO DE LA CRIATURA

Las preguntas contempladas en este epígrafe se encuentran dirigidas a todas las mujeres excepto a aquellas que parieron por cesárea programada.

p_18. ¿Cómo empezó el proceso del parto?

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	De manera natural	173	82,4	82,8	82,8
	Fue inducido o provocado	36	17,1	17,2	100,0
	Total	209	99,5	100,0	
	Ns/Nc	1	,5		
Total		210	100,0		

Tabla 71: Inicio del proceso de parto, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	De manera natural	2171	72,3	75,9	75,9
	Fue inducido o provocado	689	22,9	24,1	100,0
	Total	2861	95,2	100,0	
	Ns/Nc	144	4,8		
Total		3004	100,0		

Tabla 72: Inicio del proceso de parto

El proceso de parto comenzó de forma natural en el 75,9 % de las ocasiones; mientras que entre las mujeres del Hospital Álvarez-Buylla comenzó en el 82,8 % de los casos. En consecuencia, los partos inducidos o provocados son mayores, en términos porcentuales, en Asturias que en el Hospital Álvarez-Buylla.

p_19. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo duró su último proceso de parto?

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	3 - 6 h.	27	12,9	13,0	13,0
	7 - 12 h.	151	71,9	72,6	85,6
	> 12 h	30	14,3	14,4	100,0
	Total	208	99,0	100,0	
Ns/Nc		2	1,0		
Total		210	100,0		

Tabla 73: Duración del último proceso de parto, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	3 - 6 h.	313	10,4	10,5	10,5
	7 - 12 h.	1967	65,5	65,8	76,2
	> 12 h	710	23,6	23,8	100,0
	Total	2991	99,6	100,0	
Ns/Nc		13	,4		
Total		3004	100,0		

Tabla 74: Duración del último proceso de parto

El tiempo de duración del proceso de parto (que pudo ser expresado tanto en horas como en minutos) ha sido codificado de acuerdo a los tramos de frecuencias que se muestran en la tabla. En dicha tabla se observa que en el 72,6 % de las ocasiones en el Hospital Álvarez-Buylla, la duración de este proceso fue de 7 a 12 horas; siendo ligeramente inferior que el total de los casos.

Es posible realizar un estudio cuantitativo para esta variable. En dicho estudio se detecta la existencia de casos en los que los tiempos de duración del parto resultan valores atípicos o extremos y que, por tanto, son eliminados del análisis para que éste sea lo más ajustado posible al comportamiento medio real de la variable.

□ Resultado Hospital

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Horas que duró su último proceso de parto	195	3	17	9,51	2,794

Tabla 75: Duración del último proceso de parto, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Horas que duró su último proceso de parto	2793	3	18	10,21	3,164

Tabla 76: Duración del último proceso de parto

En los distintos hospitales de Asturias el tiempo medio para el proceso de parto es de 10,21 horas, mientras que en el Hospital Álvarez-Buylla el tiempo medio es de 9,51 horas.

p_20. ¿Sabe Vd. si se le aplicó alguna de las siguientes técnicas?

Se trata de una pregunta de respuesta múltiple, lo que implica que cada encuestada podía señalar el número de opciones de respuesta que considerase necesario. Esto supone que la suma de los distintos porcentajes no tiene que ser 100.

□ Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje
Le dieron un gel vaginal	17	8,1%
Le rompieron la bolsa de las aguas	97	46,2%
Le pusieron un gotero con oxitocina	121	57,6%
No se le aplicaron ninguna de las anteriores	42	20,0%
No sabe o no contesta	7	3,3%

Tabla 77: Aplicación de distintas técnicas durante el proceso de parto, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

	Frecuencias	Porcentaje
Le dieron un gel vaginal	371	12,3%
Le rompieron la bolsa de las aguas	1396	46,5%
Le pusieron un gotero con oxitocina	1717	57,2%
No se le aplicaron ninguna de las anteriores	508	16,9%
No sabe o no contesta	59	2,0%

Tabla 78: Aplicación de distintas técnicas durante el proceso de parto

El porcentaje de mujeres, a las cuales, no les aplicaron ninguna de las técnicas planteadas es mayor en el Hospital Álvarez-Buylla que en los datos globales, siendo del 20 % y del 16,9 % respectivamente.

Entre las distintas técnicas planteadas a las usuarias, destaca por ser la que con mayor diferencia se presenta, la práctica de la ruptura de la bolsa de aguas, llevada a cabo para el 46,5 % de las mujeres totales y el 46,2 % de las mujeres de Álvarez-Buylla.

p_21. Durante el proceso de dilatación anterior al parto, ¿pudo moverse y elegir la posición que le resultaba más cómoda?

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, la mayor parte del tiempo	150	71,4	72,1	72,1
	Sí, durante algún tiempo	16	7,6	7,7	79,8
	No, tuve que estar en reposo	42	20,0	20,2	100,0
	Total	208	99,0	100,0	
Ns/Nc		2	1,0		
Total		210	100,0		

Tabla 79: Posibilidad de movimiento y elección de la posición más cómoda, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, la mayor parte del tiempo	1983	66,0	70,3	70,3
	Sí, durante algún tiempo	248	8,3	8,8	79,0
	No, tuve que estar en reposo	592	19,7	21,0	100,0
	Total	2822	93,9	100,0	
Ns/Nc		182	6,1		
Total		3004	100,0		

Tabla 80: Posibilidad de movimiento y elección de la posición más cómoda

Como queda reflejado en las tablas, el porcentaje de las mujeres que no han contestado a esta cuestión es del 6,1 %. De entre las que sí lo han hecho, existe una mayor proporción de mujeres en el Hospital Álvarez-Buylla que durante el proceso de dilatación anterior al parto sí pudo moverse y elegir aquella posición que le resultaba más cómoda. Los porcentajes son del 72,1 % en el Hospital Álvarez-Buylla y el 70,3 % en los distintos hospitales públicos de Asturias.

p_22. ¿Le permitieron beber o comer durante el proceso de dilatación anterior al parto?

□ **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, beber y comer	23	11,0	11,6	11,6
	Sólo beber pero no comer	20	9,5	10,1	21,7
	Ni beber ni comer	155	73,8	78,3	100,0
	Total	198	94,3	100,0	
Ns/Nc		12	5,7		
Total		210	100,0		

Tabla 81: Posibilidad de comer y beber durante el proceso de dilatación anterior al parto, Hospital Álvarez-Buylla

□ **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, beber y comer	216	7,2	7,9	7,9
	Sólo beber pero no comer	202	6,7	7,4	15,3
	Ni beber ni comer	2305	76,7	84,7	100,0
	Total	2723	90,6	100,0	
Ns/Nc		281	9,4		
Total		3004	100,0		

Tabla 82: Posibilidad de comer y beber durante el proceso de dilatación anterior al parto

En estrecha relación con la pregunta anterior, en esta ocasión se demandó a las mujeres que indicasen si en este proceso de dilatación tuvieron permiso para beber y/o comer. En este caso se observa una clara diferencia de entre las que sí lo hicieron, dependiendo del lugar donde se encontraran. Así, el 21,7 % de las mujeres de Álvarez-Buylla tuvieron la posibilidad de tomar alguna bebida (de éstos, el 11,6 % pudo beber y comer, y el 10,1 % sólo beber), mientras que para el total de mujeres embarazadas el resultado se reduce hasta el 15,3 %.

p_23. Durante el proceso del parto, incluido el expulsivo, ¿cree que le proporcionaron el alivio del dolor adecuado?

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, totalmente	127	60,5	62,6	62,6
	Solo en determinados momentos	18	8,6	8,9	71,4
	No, porque no fue posible	58	27,6	28,6	100,0
	Total	203	96,7	100,0	
Ns/No lo recuerda		7	3,3		
Total		210	100,0		

Tabla 83: Valoración del alivio del dolor proporcionado durante el proceso de parto, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, totalmente	1898	63,2	68,2	68,2
	Solo en determinados momentos	398	13,2	14,3	82,5
	No, porque no fue posible	488	16,3	17,5	100,0
	Total	2783	92,7	100,0	
Ns/No lo recuerda		221	7,3		
Total		3004	100,0		

Tabla 84: Valoración del alivio del dolor proporcionado durante el proceso de parto

En la tabla de resultados queda patente que el 68,2 % de las madres que dieron a luz en la sanidad pública considera que durante el proceso de parto les fue proporcionado de forma completa el alivio del dolor adecuado; siendo el 62,6 % las mujeres exclusivamente del Hospital Álvarez-Buylla que respondieron de la misma forma.

p_24. Durante el proceso del parto, incluido el expulsivo, ¿utilizó o le aplicaron alguna de las siguientes técnicas para aliviar el dolor?

Esta cuestión se contempla exclusivamente para las madres que han dado a luz a su bebé mediante parto vaginal.

Se trata de una pregunta de respuesta múltiple, cada encuestada podía señalar el número de opciones de respuesta que considerase necesario. Esto implica que la suma de los distintos porcentajes no tiene que ser 100.

□ Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje
Métodos naturales (p.e. respiración, masajes)	88	46,8%
Duchas o baño de agua caliente	17	9,0%
Gas y aire a través de una mascarilla	8	4,3%
Analgésicos o calmantes del dolor	24	12,8%
Analgesia epidural o similar	121	64,4%
Otras técnicas	2	1,1%
No utilizó ni le aplicaron nada para aliviar el dolor	18	9,6%

Tabla 85: Aplicación de técnicas para aliviar el dolor durante el proceso de parto, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

	Frecuencias	Porcentaje
Métodos naturales (p.e. respiración, masajes)	886	33,8%
Duchas o baño de agua caliente	123	4,7%
Gas y aire a través de una mascarilla	96	3,7%
Analgésicos o calmantes del dolor	179	6,8%
Analgesia epidural o similar	2026	77,3%
Otras técnicas	69	2,6%
No utilizó ni le aplicaron nada para aliviar el dolor	251	9,6%

Tabla 86: Aplicación de técnicas para aliviar el dolor durante el proceso de parto

De entre el conjunto de técnicas presentadas para aliviar el dolor durante el proceso de parto, aquella que se utilizó en más ocasiones en el Hospital Álvarez-Buylla es la analgesia epidural o similar (64,4 %), que también es la más empleada en los hospitales públicos alcanzando el 77,3 % de los embarazos.

El 9,6 % de las mujeres de Álvarez-Buylla ha indicado que en su caso no se utilizó ninguna técnica para aliviar el dolor del parto.

p_25. ¿Le ofrecieron analgesia epidural?

Únicamente se formula esta pregunta a las mujeres que han dado a luz mediante parto vaginal.

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	163	86,7	87,2	87,2
	No	24	12,8	12,8	100,0
	Total	187	99,5	100,0	
	Ns/Nc	1	,5		
Total		188	100,0		

Tabla 87: Oferta de analgesia epidural, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2218	84,6	86,1	86,1
	No	357	13,6	13,9	100,0
	Total	2575	98,2	100,0	
	Ns/Nc	47	1,8		
Total		2622	100,0		

Tabla 88: Oferta de analgesia epidural

La analgesia epidural es una de las técnicas médicas de alivio del dolor del proceso de parto más conocidas. En el Hospital Álvarez-Buylla, el 87,2 % de las embarazadas ha indicado que en su proceso de parto sí se les ofreció dicha analgesia; siendo ligeramente superior a las 86,1 % de las mujeres de las distintas clínicas públicas donde dieron a luz.

Como complemento a la oferta de la analgesia epidural es de interés conocer si a aquellas mujeres a las que les fue ofrecida, la aceptaron o no.

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	119	73,0	73,0	73,0
	No	44	27,0	27,0	100,0
	Total	163	100,0	100,0	

Tabla 89: Aceptación de analgesia epidural, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1964	88,5	88,5	88,5
	No	254	11,5	11,5	100,0
	Total	2218	100,0	100,0	

Tabla 90: Aceptación de analgesia epidural

El 88,5 % de la totalidad de las mujeres aceptaron la analgesia epidural que les fue ofrecida como método de alivio del dolor durante su proceso de parto, mientras en el Hospital Álvarez-Buylla, la aceptación de esta propuesta fue del 73 %.

➤ EL NACIMIENTO DEL BEBÉ

Las preguntas contempladas en este bloque (p_26 a p_29) se encuentran dirigidas a todas las mujeres con parto vaginal.

p_26. ¿En qué posición dio a luz a su bebé?

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Tumbada con las piernas apoyadas en los estribos	81	43,1	43,1	43,1
	Sentada/ sentada apoyada en almohadas	105	55,9	55,9	98,9
	De pie, en cuclillas o de rodillas	1	,5	,5	99,5
	Otro	1	,5	,5	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

Tabla 91: Posición en la que se dio a luz a la criatura, Hospital Álvarez-Buylla

❑ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Tumbada con las piernas apoyadas en los estribos	2188	83,4	83,9	83,9
	Sentada/ sentada apoyada en almohadas	307	11,7	11,8	95,6
	De costado	13	,5	,5	96,1
	De pie, en cuclillas o de rodillas	28	1,1	1,1	97,2
	Otro	73	2,8	2,8	100,0
	Total	2609	99,5	100,0	
	Ns/Nc	14	,5		
Total		2622	100,0		

Tabla 92: Posición en la que se dio a luz a la criatura

En este caso, en el Hospital Álvarez-Buylla, la posición más habitual en la que se dio a luz al niño o niña fue sentada o sentada y apoyada en almohadas, 55,9 %. Con mucha diferencia de lo indicado por el resto de embarazadas en Asturias, debido a que en el Hospital Álvarez-Buylla el parto en una posición tumbada tuvo lugar solamente en el 43,1 % de las embarazadas.

p_27. ¿Le afeitaron o rasuraron el periné?

❑ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	35	18,6	19,1	19,1
	No	148	78,7	80,9	100,0
	Total	183	97,3	100,0	
	Ns/No lo recuerda	5	2,7		
Total		188	100,0		

Tabla 93: Mujeres a las que afeitaron o rasuraron el periné, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	963	36,7	37,5	37,5
	No	1602	61,1	62,5	100,0
	Total	2566	97,8	100,0	
Ns/No lo recuerda		57	2,2		
Total		2622	100,0		

Tabla 94: Mujeres a las que afeitaron o rasuraron el periné

Durante el proceso de parto vaginal en el Hospital Álvarez-Buylla, el 19,1 % de las mujeres indicó que les fue rasurado o afeitado el periné; por debajo del 37,5 % del total de mujeres en los hospitales públicos.

p_28. ¿Le aplicaron un enema o lavativa?

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	17	9,0	9,3	9,3
	No	166	88,3	90,7	100,0
	Total	183	97,3	100,0	
Ns/No lo recuerda		5	2,7		
Total		188	100,0		

Tabla 95: Mujeres a las que aplicaron un enema o lavativa, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	952	36,3	37,9	37,9
	No	1558	59,4	62,1	100,0
	Total	2511	95,7	100,0	
Ns/No lo recuerda		112	4,3		
Total		2622	100,0		

Tabla 96: Mujeres a las que aplicaron un enema o lavativa

El enema o lavativa es otra de las técnicas o procedimientos más habituales durante el proceso de parto. El 4,3 % de las mujeres ha manifestado que no recuerda si durante su proceso

de parto les fue aplicado un enema o lavativa, mientras que este porcentaje desciende al 2,7 % si se considera únicamente la respuesta de las mujeres de Álvarez-Buylla.

Siguiendo con este estudio parcial, de entre las mujeres que sí han contestado, sólo al 9,3 % le aplicaron un enema o lavativa; frente al 37,9 % del peso de las mujeres que recibieron esta técnica en los hospitales estatales.

p_29. En el expulsivo, ¿se le practicó una episiotomía?

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	109	58,0	59,6	59,6
	No	74	39,4	40,4	100,0
	Total	183	97,3	100,0	
Ns/No lo recuerda		5	2,7		
Total		188	100,0		

Tabla 97: Mujeres a las que les fue aplicada una episiotomía, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1769	67,5	69,4	69,4
	No	781	29,8	30,6	100,0
	Total	2550	97,2	100,0	
Ns/No lo recuerda		72	2,8		
Total		2622	100,0		

Tabla 98: Mujeres a las que les fue aplicada una episiotomía

En esta última cuestión del apartado, se solicitó a las mujeres cuyo parto fue vaginal que señalaran si se les practicó una episiotomía o corte en la entrada de la vulva para facilitar la expulsión.

Se observa en la tabla de resultados para el Hospital Álvarez-Buylla que el 59,6 % de las mujeres ha confirmado la realización de la misma, siendo inferior al 69,4 % del total de mujeres embarazadas en los distintos hospitales del Principado de Asturias.

➤ EL PERSONAL QUE LA ATENDIÓ

p_30. ¿La atendió la misma matrona o matrn durante el proceso de parto y nacimiento?

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	166	73,5	73,5	73,5
	No, hubo más	60	26,5	26,5	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 99: Atención por parte de la misma matrona/matrn durante todo el proceso de parto, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1673	51,4	51,7	51,7
	No, hubo más	1561	48,0	48,3	100,0
	Total	3234	99,4	100,0	
Ns/Nc		19	,6		
Total		3253	100,0		

Tabla 100: Atención por parte de la misma matrona/matrn durante todo el proceso de parto

La primera de las cuestiones relativas al personal que atendió a las embarazadas durante el proceso de parto y nacimiento analiza si en este tiempo se recibió atención del mismo matrn o matrona o si, por el contrario, fueron varios los profesionales que la atendieron. Así, queda patente que en el Hospital Álvarez-Buylla es más frecuente que le atienda el mismo matrn o matrona reafirmado por el 73,5 % de los casos, mientras el 51,7 % del total de mujeres ha indicado que en su caso la atención también fue proporcionada por el mismo matrn/a.

p_31. ¿Conocía al personal sanitario que la atendió en el proceso de parto y nacimiento antes de iniciarse éste?

□ **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Solo al ginecólogo/a	47	20,8	20,8	20,8
	Solo a la matrona/on	37	16,4	16,4	37,2
	A ambos	47	20,8	20,8	58,0
	A ninguno/a	95	42,0	42,0	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 101: Conocimiento del personal sanitario de la atención en el parto, Hospital Álvarez-Buylla

□ **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Solo al ginecólogo/a	395	12,1	12,2	12,2
	Solo a la matrona/on	275	8,5	8,5	20,7
	A ambos	335	10,3	10,3	31,0
	A ninguno/a	2232	68,6	69,0	100,0
	Total	3237	99,5	100,0	
Ns/Nc		16	,5		
Total		3253	100,0		

Tabla 102: Conocimiento del personal sanitario de la atención en el parto

En cuanto al conocimiento previo del personal sanitario, tanto médico como matrona/a, que atendió a las usuarias durante su proceso de parto y nacimiento, las respuestas indican que, las usuarias de Álvarez-Buylla, conocían en mayor medida a los profesionales que la atendieron que las usuarias del total de hospitales estudiados, dado que el 42 % de las primeras y el 69 % de las segundas no conocían a ninguno de los profesionales con anterioridad.

Además, existe un mayor número de personas en el Hospital Álvarez-Buylla que conocen al ginecólogo/a (20,8 %) que a su matrona/ón (16,4 %).

p_32. Señale el grado de confianza que le inspiró el personal que le atendió durante el proceso de parto y nacimiento

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mucha	155	68,6	68,9	68,9
	Bastante	51	22,6	22,7	91,6
	Alguna	12	5,3	5,3	96,9
	Poca	5	2,2	2,2	99,1
	Ninguna	2	,9	,9	100,0
	Total	225	99,6	100,0	
Ns/Nc		1	,4		
Total		226	100,0		

Tabla 103: Grado de confianza inspirado por el personal que le atendió durante el parto y nacimiento, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mucha	1878	57,7	58,3	58,3
	Bastante	945	29,0	29,3	87,6
	Alguna	172	5,3	5,3	93,0
	Poca	147	4,5	4,6	97,5
	Ninguna	80	2,5	2,5	100,0
	Total	3222	99,1	100,0	
Ns/Nc		31	,9		
Total		3253	100,0		

Tabla 104: Grado de confianza inspirado por el personal que le atendió durante el parto y nacimiento

La confianza inspirada por el personal del que se recibió atención durante el proceso de parto y nacimiento ha sido valorada de un modo más positivo en el Hospital Álvarez-Buylla por el 91,6 % (22,7 % ha señalado “bastante” y 68,9 % ha indicado “mucha”) que en los resultados globales, donde esta cifra se queda en el 87,6 %. Estos datos dan una idea de la satisfacción generalizada que tienen las usuarias en relación a este aspecto.

p_33. ¿Estaba presente el/la ginecóloga/obstetra en el momento del nacimiento?

Esta pregunta va a ser analizada solamente para los partos vaginales.

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	107	56,9	58,5	58,5
	No	76	40,4	41,5	100,0
	Total	183	97,3	100,0	
No se acuerda		5	2,7		
Total		188	100,0		

Tabla 105: Presencia del ginecólogo/obstetra en el momento del nacimiento, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1433	54,6	58,5	58,5
	No	1018	38,8	41,5	100,0
	Total	2451	93,5	100,0	
No se acuerda		172	6,5		
Total		2622	100,0		

Tabla 106: Presencia del ginecólogo/obstetra en el momento del nacimiento

A este respecto, del total de partos vaginales, destaca que el 6,5 % y el 2,7 % de las usuarias en el conjunto de hospitales y en el Hospital Álvarez-Buylla respectivamente, no se acuerda de si su ginecólogo/a estuvo presente en el momento del nacimiento de su criatura. De entre aquellas que sí lo recuerdan, en el Hospital Álvarez-Buylla el 58,5 % señala que sí se encontraba presente el ginecólogo/a u obstetra en el momento del nacimiento, siendo idéntico al porcentaje de ocasiones del resultado global (58,5%).

p_34. ¿Estaba permitido que una persona de su confianza, estuviera con usted durante el proceso del parto y en el momento del nacimiento de la criatura?

❑ **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, sólo durante la dilatación	19	8,4	8,4	8,4
	Sí, durante la dilatación y el parto	176	77,9	77,9	86,3
	No se permitía	31	13,7	13,7	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 107: Posibilidad de contar con la presencia de compañía durante el proceso de parto y nacimiento, Hospital Álvarez-Buylla

❑ **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, sólo durante la dilatación	772	23,7	23,7	23,7
	Sí, durante la dilatación y el parto	2009	61,7	61,7	85,5
	No se permitía	472	14,5	14,5	100,0
	Total	3253	100,0	100,0	

Tabla 108: Posibilidad de contar con la presencia de compañía durante el proceso de parto y nacimiento

Queda reflejado en los resultados que, en el Hospital Álvarez-Buylla, es mayor la proporción de embarazadas que contaba con la posibilidad de la presencia de compañía durante el parto y la dilatación (77,9 %) con respecto al resultado de la misma cuestión para el conjunto de la población estudiada (61,7 %).

Se analizará el comportamiento de esta variable para el caso de **parto vaginal**, siendo los resultados los que se presentan en la siguiente tabla.

❑ **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, sólo durante la dilatación	6	3,2	3,2	3,2
	Sí, durante la dilatación y el parto	170	90,4	90,4	93,6
	No se permitía	12	6,4	6,4	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

Tabla 109: Posibilidad de contar con la presencia de compañía durante el proceso de parto vaginal, Hospital Álvarez-Buylla

❑ **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, sólo durante la dilatación	511	19,5	19,5	19,5
	Sí, durante la dilatación y el parto	1942	74,1	74,1	93,6
	No se permitía	169	6,4	6,4	100,0
	Total	2622	100,0	100,0	

Tabla 110: Posibilidad de contar con la presencia de compañía durante el proceso de parto vaginal

De entre las mujeres totales que parieron mediante parto vaginal, el 74,1 % ha indicado que sí contó con la opción de tener la presencia de compañía (una persona de su confianza) durante todo el proceso de parto y nacimiento, mientras en el Hospital Álvarez-Buylla este porcentaje es del 90,4 %.

p_35. ¿Su acompañante estuvo con Vd. en este proceso del nacimiento?

Esta pregunta solamente fue cuestionada a las mujeres con parto vaginal creando una nueva variable que aporte información más completa a partir de la información de las dos anteriores cuestiones. Las opciones de respuesta que se han confeccionado son las siguientes:

- Partos vaginales que sí estuvo el acompañante
- Partos vaginales que no estuvo
- Partos vaginales que no se permitía estar
- Ns/Nc

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí estuvo el acompañante	165	87,8	87,8	87,8
	No estuvo el acompañante	11	5,9	5,9	93,6
	No se le permitía	12	6,4	6,4	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

Tabla 111: Presencia de compañía durante el proceso de parto y nacimiento, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si estuvo el acompañante	2085	79,5	80,7	80,7
	No estuvo el acompañante	331	12,6	12,8	93,5
	No se le permitía	169	6,4	6,5	100,0
	Total	2585	98,6	100,0	
No se acuerda		37	1,4		
Total		2622	100,0		

Tabla 112: Presencia de compañía durante el proceso de parto y nacimiento

De entre aquellas mujeres de Álvarez-Buylla correspondientes a parto vaginal, el 87,8 % ha confirmado la presencia de un acompañante durante el proceso de parto, siendo más elevado que el peso de las usuarias totales con parto vaginal (80,7 %) que contaron con esa compañía.

De este modo, se confirma la mayor permisión en el Hospital Álvarez-Buylla para poder disfrutar de compañía tanto en las clases de preparación al parto como en el proceso de parto analizado en las preguntas 17 y 34 respectivamente.

p_36. Inmediatamente después del nacimiento ¿mantuvo el contacto piel con piel con su bebé?

Esta cuestión no fue contestada por aquellos casos en los que el resultado del parto tuvo alteraciones graves del feto.

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	192	85,7	85,7	85,7
	No	32	14,3	14,3	100,0
	Total	224	100,0	100,0	

Tabla 113: Contacto piel con piel inmediatamente tras el nacimiento de la criatura, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2447	75,5	76,0	76,0
	No	771	23,8	24,0	100,0
	Total	3217	99,2	100,0	
	Ns/No lo recuerda	25	,8		
Total		3242	100,0		

Tabla 114: Contacto piel con piel inmediatamente tras el nacimiento de la criatura

Al menos tres de cada cuatro madres confirman que inmediatamente después del nacimiento de su criatura pudieron tener contacto piel con piel, siendo todavía mayor, 85,7 %, las mujeres del Hospital Álvarez-Buylla.

p_37. ¿Durante cuánto tiempo mantuvo contacto piel con piel con su criatura inmediatamente después del nacimiento?

Esta pregunta debía ser contestada exclusivamente por las mujeres que inmediatamente después del nacimiento, tuvieron contacto piel con piel con su hijo o hija.

Además, esta cuestión no fue contestada por aquellos casos en los que el resultado del parto fue “feto muerto al nacimiento” o “nacido vivo que murió después del nacimiento”.

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Menos de 30 minutos	165	85,9	88,2	88,2
	De 30 a 60 minutos	16	8,3	8,6	96,8
	Más de 60 minutos	6	3,1	3,2	100,0
	Total	187	97,4	100,0	
	Ns/Nc	5	2,6		
Total		192	100,0		

Tabla 115: Tiempo de contacto piel con piel tras el nacimiento de la criatura, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Menos de 30 minutos	1764	72,1	74,6
	De 30 a 60 minutos	301	12,3	87,3
	Más de 60 minutos	300	12,3	100,0
	Total	2365	96,7	100,0
	Ns/Nc	81	3,3	
Total	2447	100,0		

Tabla 116: Tiempo de contacto piel con piel tras el nacimiento de la criatura

Todas las madres que en la anterior pregunta señalaron que sí tuvieron contacto con su criatura inmediatamente después del nacimiento indicaron en esta ocasión el tiempo que duró dicho contacto piel con piel.

El periodo de tiempo más frecuente, analizado para el Hospital Álvarez-Buylla, es el que abarca hasta 30 minutos (88,2 %). A su vez, se observa que en este hospital tuvieron menos tiempo de contacto piel con piel la madre y el bebé, dado que el porcentaje que supera los 30 minutos es del 11,8 % frente al 25,4 % del total de hospitales.

p_38. En general, pensando en la atención durante el proceso de embarazo y el parto...

a. ¿Sintió que se respetó su intimidad?

Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	206	91,2	91,2
	Casi siempre	12	5,3	96,5
	Pocas veces	6	2,7	99,1
	Nunca	2	,9	100,0
	Total	226	100,0	100,0

Tabla 117: Valoración del respeto por su intimidad, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	2645	81,3	82,0	82,0
	Casi siempre	355	10,9	11,0	93,0
	Pocas veces	142	4,4	4,4	97,4
	Nunca	83	2,5	2,6	100,0
	Total	3224	99,1	100,0	
Ns/Nc		29	,9		
Total		3253	100,0		

Tabla 118: Valoración del respeto por su intimidad

La atención recibida durante el proceso de embarazo y parto ha sido valorada en primer lugar, en relación al respeto por la intimidad mostrado. Se observa que el 91,2 % de las mujeres de Álvarez-Buylla consideran que su intimidad siempre fue respetada, mientras, un tanto por ciento menor, el 3,6 % de las mujeres de este hospital consideran que su intimidad se respetó “pocas veces” o “nunca”.

Estos resultados se muestran en sintonía con los datos globales de la tabla superior.

b. ¿Fue tratada con amabilidad y comprensión?

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	186	82,3	82,3	82,3
	Casi siempre	32	14,2	14,2	96,5
	Pocas veces	5	2,2	2,2	98,7
	Nunca	3	1,3	1,3	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 119: Valoración de la amabilidad y comprensión con la que fue tratada, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	2433	74,8	75,2	75,2
	Casi siempre	508	15,6	15,7	90,9
	Pocas veces	202	6,2	6,3	97,1
	Nunca	93	2,9	2,9	100,0
	Total	3237	99,5	100,0	
Ns/Nc		16	,5		
Total		3253	100,0		

Tabla 120: Valoración de la amabilidad y comprensión con la que fue tratada

En relación a la valoración vertida en el cuestionario sobre la amabilidad y comprensión en el trato, se detecta un alto peso correspondiente a la valoración positiva de esta cuestión, siendo un poco superior en el Hospital Álvarez-Buylla, ya que el 96,5 %, de las mujeres de este hospital han indicado que el trato fue amable y comprensivo “casi siempre” o “siempre” durante el proceso de parto y nacimiento, mientras que los datos globales muestran que el 90,9 % de las mujeres opinan de la misma forma.

c. ¿Cree que se le dio toda la información o las explicaciones que usted necesitó en un lenguaje comprensible?

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	189	83,6	84,8	84,8
	Casi siempre	20	8,8	9,0	93,7
	Pocas veces	7	3,1	3,1	96,9
	Nunca	7	3,1	3,1	100,0
	Total	223	98,7	100,0	
	Ns/Nc	3	1,3		
Total		226	100,0		

Tabla 121: Valoración de la información proporcionada, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	2421	74,4	75,1	75,1
	Casi siempre	392	12,1	12,2	87,3
	Pocas veces	255	7,8	7,9	95,2
	Nunca	156	4,8	4,8	100,0
	Total	3224	99,1	100,0	
	Ns/Nc	29	,9		
Total		3253	100,0		

Tabla 122: Valoración de la información proporcionada

En esta pregunta también se observa una valoración positiva muy elevada en ambos casos respecto a la información y explicaciones proporcionadas durante la atención en el proceso de embarazo y parto (84,8 % siempre y 9 % casi siempre). También, en este caso, existe una mayor satisfacción con la información proporcionada en el Hospital Álvarez-Buylla que en los datos conjuntos de los hospitales públicos.

d. ¿Se sintió Ud. participe en las decisiones acerca de su propio cuidado y el de su criatura?

Esta cuestión no fue contestada por aquellos casos en los que el resultado del parto fue “feto muerto al nacimiento” o “nacido vivo que murió después del nacimiento”.

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	190	84,8	86,0	86,0
	Casi siempre	11	4,9	5,0	91,0
	Pocas veces	12	5,4	5,4	96,4
	Nunca	8	3,6	3,6	100,0
	Total	221	98,7	100,0	
	Ns/Nc	3	1,3		
Total		224	100,0		

Tabla 123: Valoración de la participación en las decisiones sobre su cuidado y el de su criatura, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	2263	69,8	72,1	72,1
	Casi siempre	427	13,2	13,6	85,7
	Pocas veces	241	7,4	7,7	93,4
	Nunca	207	6,4	6,6	100,0
	Total	3139	96,8	100,0	
	Ns/Nc	104	3,2		
Total		3242	100,0		

Tabla 124: Valoración de la participación en las decisiones sobre su cuidado y el de su criatura

En último lugar, se solicitó a las usuarias que indicasen su opinión en relación a la posibilidad de participar de las decisiones sobre su cuidado y el de su criatura; señalando en el 91 % de los casos de Álvarez-Buylla, que “siempre” o “casi siempre” se han sentido partícipes en las decisiones tomadas.

Como sucedía en las preguntas anteriores, el nivel de satisfacción vuelve a ser mayor en el Hospital Álvarez-Buylla, ya que en la otra tabla se observa que el 85,7 % de las usuarias de los hospitales públicos del Principado de Asturias “siempre” o “casi siempre” se sintieron partícipes en las decisiones tomadas.

SECCIÓN D: ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DESPUÉS DEL PARTO
p_39. ¿Cuánto tiempo duró la estancia en el hospital después de que su bebé naciera?

Esta pregunta se analiza en función del tipo de parto ya que la estancia en el Hospital tras el parto se encuentra relacionada con esta variable. El número de mujeres que faltan hasta completar la totalidad de las usuarias son aquellas que en la encuesta no señalaron el tiempo de permanencia en el Hospital.

Resultado Hospital

			Tipo de parto		Total
			Parto vaginal	Parto por cesárea	
Días de estancia en el hospital tras el nacimiento	<2 días	n	1	0	1
		%	,5%	,0%	,4%
	2 - 3 días	n	157	6	163
		%	83,5%	15,8%	72,1%
	4 - 5 días	n	21	16	37
		%	11,2%	42,1%	16,4%
	6 - 8 días	n	9	15	24
		%	4,8%	39,5%	10,6%
	>=8 días	n	0	1	1
		%	,0%	2,6%	,4%
Total	n	188	38	226	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tabla 125: Tiempo de duración de la estancia en el Hospital Álvarez-Buylla después del nacimiento en función del tipo de parto

Resultado Global

			Tipo de parto		Total
			Parto vaginal	Parto por cesárea	
Días de estancia en el hospital tras el nacimiento	<2 días	n	56	0	56
		%	2,1%	,0%	1,7%
	2 - 3 días	n	2256	90	2346
		%	86,5%	14,4%	72,6%
	4 - 5 días	n	247	257	504
		%	9,5%	41,2%	15,6%
	6 - 8 días	n	49	261	310
		%	1,9%	41,8%	9,6%
	>=8 días	n	0	16	16
		%	,0%	2,6%	,5%
Total	n	2608	624	3232	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tabla 126: Tiempo de duración de la estancia en el hospital después del nacimiento en función del tipo de parto

El tiempo indicado por las madres que duró su estancia en el hospital tras el nacimiento del niño o niña ha sido categorizado en los tramos que se presentan en las tablas de resultados.

En la tabla para el Hospital Álvarez-Buylla se observa que la estancia más frecuente está entre los 2 y 3 días para los partos vaginales (83,5 %), siendo similar a los datos globales (86,5 %), mientras que la estancia media en el caso de las cesáreas es superior -el 42,1 % permaneció entre 4 y 5 días- al de los datos globales para la misma duración (41,2 %).

Por tanto se observa que tal y como es lógico, la estancia media de las mujeres que han dado a luz mediante cesárea es superior a la señalada por aquellas madres que tuvieron un parto vaginal, sin que se puedan apreciar diferencias significativas entre las distintas áreas.

Para esta variable se ha considerado interesante el estudio cuantitativo de la misma. Para ello se han detectado aquellos casos considerados como atípicos o extremos y se han eliminado del estudio ya que distorsionarían la tendencia normal de los valores.

□ Resultado Hospital

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Días que duró su estancia en el hospital después de que su bebé naciera	221	1	7	3,00	1,414

Tabla 127: Días que duró su estancia en el Hospital Álvarez-Buylla después de que su criatura naciera

□ Resultado Global

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Días que duró su estancia en el hospital después de que su bebé naciera	3142	1	7	2,88	1,324

Tabla 128: Días que duró su estancia en el hospital después de que su criatura naciera

El número medio de días de estancia en el Hospital Álvarez-Buylla después de que el niño o niña naciera es de 3 días, mientras que el de los datos globales, teniendo en cuenta todos los centros médicos estudiados, es de 2,88 días.

p_40. Piensa que la duración de su estancia en el hospital fue...

Esta pregunta se analiza en función del tipo de parto ya que un juicio sobre la estancia en el hospital tras el parto puede depender de si ha habido o no intervención quirúrgica. Solamente se tienen en cuenta los casos en que se han emitido un juicio de valor sobre la cuestión, motivo por el que el total de usuarias que aparece en la tabla no corresponde con el de la muestra.

Resultado Hospital

		Tipo de parto		Total	
		Parto vaginal	Parto por cesárea		
Valoración de la duración de su estancia en el hospital	Demasiado larga	n	25	4	29
		%	13,3%	10,5%	12,8%
	La adecuada	n	160	28	188
		%	85,1%	73,7%	83,2%
	Demasiado corta	n	3	6	9
		%	1,6%	15,8%	4,0%
Total	n	188	38	226	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tabla 129: Valoración del tiempo de estancia en el Hospital Álvarez-Buylla en función del tipo de parto

Resultado Global

		Tipo de parto		Total	
		Parto vaginal	Parto por cesárea		
Valoración de la duración de su estancia en el hospital	Demasiado larga	n	272	87	359
		%	10,5%	14,1%	11,2%
	La adecuada	n	2166	462	2628
		%	83,7%	74,9%	82,0%
	Demasiado corta	n	149	68	217
		%	5,8%	11,0%	6,8%
Total	n	2587	617	3204	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tabla 130: Valoración del tiempo de estancia en el hospital en función del tipo de parto

En la tabla de resultados del Hospital Álvarez-Buylla queda reflejado que para el 83,2 % de las mujeres su estancia en el hospital tras el parto resultó la adecuada; siendo similar el porcentaje de mujeres que han emitido esta valoración cuyo parto fue vaginal frente al parto por cesárea.

El 26,3 % de las madres que parieron en el Hospital Álvarez-Buylla mediante cesárea han valorado su estancia hospitalaria como inadecuada, siendo este porcentaje superior que el 25,1 % de las madres totales con un parto por cesárea y que se muestran insatisfechas con el tiempo de estancia, bien porque fue demasiado corto o demasiado largo.

p_41. La información que recibió sobre su recuperación después del parto fue:

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Totalmente adecuada	68	30,1	30,2	30,2
	Adecuada	139	61,5	61,8	92,0
	Poco adecuada	15	6,6	6,7	98,7
	Totalmente inadecuada	3	1,3	1,3	100,0
	Total	225	99,6	100,0	
Ns/No lo recuerda		1	,4		
Total		226	100,0		

Tabla 131: Valoración de la información recibida sobre la recuperación después del parto, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Totalmente adecuada	587	18,0	18,4	18,4
	Adecuada	1938	59,6	60,9	79,4
	Poco adecuada	445	13,7	14,0	93,4
	Totalmente inadecuada	212	6,5	6,6	100,0
	Total	3182	97,8	100,0	
Ns/No lo recuerda		71	2,2		
Total		3253	100,0		

Tabla 132: Valoración de la información recibida sobre la recuperación después del parto

Se observa que el 2,2 % de las mujeres totales y el 0,4 % de las de Álvarez-Buylla no han contestado a esta pregunta. De entre las que sí lo han hecho, la adecuación de la información proporcionada en relación a la recuperación tras el parto ha sido calificada como adecuada/muy adecuada por el 79,4 % de los datos globales y el 92 % de las mujeres de Álvarez-Buylla.

p_42. ¿Ha realizado Vd. alguna visita de control de su propia salud entre la 4 y la 6 semana después del parto en los servicios sanitarios públicos?

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	211	93,4	93,4	93,4
	No	15	6,6	6,6	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 133: Asistencia a controles entre la 4ª y 6ª semana después del parto, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2523	77,6	78,0	78,0
	No	712	21,9	22,0	100,0
	Total	3235	99,4	100,0	
Ns/No lo recuerda		18	,6		
Total		3253	100,0		

Tabla 134: Asistencia a controles entre la 4ª y 6ª semana después del parto

Tal y como queda patente en la tabla de resultados, el 78 % de las madres, entre la semana 4ª y 6ª después del parto realizó un control de su propia salud, siendo este peso superior si se tiene en cuenta exclusivamente a las mujeres de Álvarez-Buylla, de las cuales, el 93,4 % realizaron tal revisión.

p_43. ¿Los y las profesionales le ofrecieron o le dieron consejo sobre contracepción después del parto?

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	167	73,9	74,6	74,6
	No	57	25,2	25,4	100,0
	Total	224	99,1	100,0	
Ns/No lo recuerda		2	,9		
Total		226	100,0		

Tabla 135: Recepción de consejo sobre contracepción después del parto, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2232	68,6	70,3	70,3
	No	941	28,9	29,7	100,0
	Total	3173	97,5	100,0	
Ns/No lo recuerda		80	2,5		
Total		3253	100,0		

Tabla 136: Recepción de consejo sobre contracepción después del parto

En esta ocasión, el 70,3 % de las mujeres ha señalado que sí recibió información sobre temas de contracepción para después del parto por parte de los y las profesionales que le atendieron, mientras que en el resultado parcial de Álvarez-Buylla, el 74,6 % recibió esta información.

SECCIÓN E: CUIDADOS ESPECIALES DE LA CRIATURA

Esta sección no fue contestada por aquellos casos en los que el resultado del parto fue “feto muerto al nacimiento” o “nacido vivo que murió después del nacimiento”.

p_44. ¿Fue su hija/ hijo atendido en una unidad neonatal en el hospital después del nacimiento?

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	20	8,9	9,0	9,0
	No	203	90,6	91,0	100,0
	Total	223	99,6	100,0	
Ns/Nc		1	,4		
Total		224	100,0		

Tabla 137: Atención de la criatura en la unidad de neonatología después del nacimiento, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	624	19,2	19,6	19,6
	No	2553	78,7	80,4	100,0
	Total	3177	98,0	100,0	
Ns/Nc		65	2,0		
Total		3242	100,0		

Tabla 138: Atención de la criatura en la unidad de neonatología después del nacimiento

Del total de nacimientos analizados, el 19,6 % requirió que la criatura fuera atendida en la unidad de neonatología inmediatamente después del nacimiento, por debajo, el 9 % de las mujeres que dieron a luz en el Hospital Álvarez-Buylla requirieron que su bebé fuera atendido en esa unidad.

Todas las mujeres cuyo hijo o hija no tuvo que ser atendido en la unidad neonatal no debían contestar el resto de las preguntas de la sección; pasando directamente a las Sección F.

p_45. ¿Cuánto tiempo estuvo su niño/niña en la atención neonatal?

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1 día a menos	9	45,0	45,0	45,0
	De 2-7 días	8	40,0	40,0	85,0
	Más de 7 días	3	15,0	15,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

Tabla 139: Tiempo de permanencia de la criatura en la unidad de neonatología después del nacimiento, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1 día ó menos	269	43,2	43,3	43,3
	De 2-7 días	217	34,8	34,8	78,1
	Más de 7 días	136	21,9	21,9	100,0
	Total	623	99,8	100,0	
Ns/Nc		1	,2		
Total		624	100,0		

Tabla 140: Tiempo de permanencia de la criatura en la unidad de neonatología después del nacimiento

Tal y como se observa en la tabla de resultados globales el tiempo más habitual de permanencia en la unidad de neonatología es de un día o inferior, tiempo que estuvo el 43,3 % de las criaturas atendidas. En la otra tabla de los casos de Álvarez-Buylla, se observa que este dato es superior alcanzando el 45 % de los nacidos.

p_46. Mientras su criatura estuvo ingresada en la Unidad Neonatal, ¿pudo Vd. acompañarle?

❑ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, estuve ingresada para acompañarla	9	45,0	45,0	45,0
	Pude estar con ella, aunque no ingresada	2	10,0	10,0	55,0
	No estaba permitido visitarla	9	45,0	45,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

Tabla 141: Posibilidad de acompañar a la criatura en la unidad de neonatología, Hospital Álvarez-Buylla

❑ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, estuve ingresada para acompañarla	265	42,4	42,6	42,6
	Pude estar con ella, aunque no ingresada	224	35,9	36,0	78,6
	No estaba permitido visitarla	133	21,3	21,4	100,0
	Total	622	99,7	100,0	
Ns/Nc		2	,3		
Total		624	100,0		

Tabla 142: Posibilidad de acompañar a la criatura en la unidad de neonatología

La posibilidad de acompañar al niño o niña durante el tiempo que éste/a estuvo en la unidad neonatal permaneciendo ingresada con él o con ella, se dio en el 42,6 % de los casos globales, sin embargo, esta cifra es superior si se tienen en cuenta solamente los partos en el Hospital Álvarez-Buylla donde el porcentaje alcanza el 45 %.

No obstante, conviene señalar que para los casos de Álvarez-Buylla, la posibilidad de estar con su bebé en la unidad de neonatología sin ingresar en el centro es inferior al porcentaje de los resultados globales (10 % frente al 36 % respectivamente).

p_47. Mientras su hija o hijo estuvo en la Unidad de Neonatología, ¿le permitieron alimentarlo/a al pecho o con leche materna?

□ **Resultado Hospital**

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, le di el pecho	8	40,0	40,0
	Sí, me saqué la leche con un sacaleches	4	20,0	60,0
	No, no opté por lactancia materna	4	20,0	80,0
	No, no se permitía en la unidad	3	15,0	95,0
	No pudo porque ella o su criatura estaban muy enfermas	1	5,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0

Tabla 143: Posibilidad de alimentar al pecho al niño/a en la unidad de neonatología, Hospital Álvarez-Buylla

□ **Resultado Global**

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, le di el pecho	283	45,3	45,3
	Sí, me saqué la leche con un sacaleches	89	14,2	59,5
	No, no opté por lactancia materna	82	13,1	72,7
	No, no se permitía en la unidad	119	19,0	91,7
	No pudo porque ella o su criatura estaban muy enfermas	52	8,3	100,0
	Total	624	100,0	100,0

Tabla 144: Posibilidad de alimentar al pecho al niño/a en la unidad de neonatología

El contacto con la criatura durante su estancia en la unidad de neonatología también queda plasmado a través de la alimentación; más en concreto se centra el interés en la lactancia materna. En este caso se observa que el 60 % de las madres de Álvarez-Buylla optaron por la misma (el 40 % dio el pecho mientras que el 20 % se sacó la leche con un sacaleches, ambos superiores a los datos globales del estudio).

Finalmente se muestra que el 15 % de las mujeres de este hospital no pudo optar por esta alimentación ya que no estaba permitido y el 19 % de las mujeres totales no tuvo la posibilidad de dar el pecho por la misma razón.

p_48. ¿Cómo valora la información que Usted y su pareja recibieron sobre el motivo de ingreso de su criatura en la Unidad Neonatal?

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Totalmente adecuada/suficiente	6	30,0	30,0	30,0
	Adecuada/suficiente	7	35,0	35,0	65,0
	Poco adecuada/suficiente	2	10,0	10,0	75,0
	Totalmente inadecuada/insuficiente	5	25,0	25,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

Tabla 145: Valoración de la información recibida sobre el ingreso del niño/a en la unidad de neonatología, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Totalmente adecuada/suficiente	255	40,8	40,8	40,8
	Adecuada/suficiente	258	41,4	41,4	82,2
	Poco adecuada/suficiente	48	7,7	7,7	89,9
	Totalmente inadecuada/insuficiente	63	10,1	10,1	100,0
	Total	624	100,0	100,0	

Tabla 146: Valoración de la información recibida sobre el ingreso del niño/a en la unidad de neonatología

La información proporcionada en el Hospital Álvarez-Buylla sobre el motivo de ingreso en la unidad neonatal es valorada positivamente por el 65 % de las usuarias, ya que la consideran como adecuada y suficiente, por debajo esta cifra de su homóloga (82,2 %) de los datos globales del estudio. Manifiesta, en mayor o menor medida, una opinión contraria al respecto el 35 % de las mujeres para las que la información no resultó todo lo adecuada y suficiente que hubieran deseado.

SECCIÓN F: LA ALIMENTACIÓN DE LA CRIATURA

Esta sección no fue contestada por aquellos casos en los que el resultado del parto fue “feto muerto al nacimiento” o “nacido vivo que murió después del nacimiento”.

p_49. Durante el embarazo, ¿habló con su matró/a sobre la alimentación de la criatura?

□ **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	167	74,6	75,6	75,6
	No	54	24,1	24,4	100,0
	Total	221	98,7	100,0	
Ns/No lo recuerda		3	1,3		
Total		224	100,0		

Tabla 147: Mujeres que hablaron con su matrona sobre la alimentación de la criatura, Hospital Álvarez-Buylla

□ **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2133	65,8	68,2	68,2
	No	996	30,7	31,8	100,0
	Total	3128	96,5	100,0	
Ns/No lo recuerda		114	3,5		
Total		3242	100,0		

Tabla 148: Mujeres que hablaron con su matrona sobre la alimentación de la criatura

En la tabla de resultados de Álvarez-Buylla y en la tabla de totales queda reflejado que un 1,3 % y un 3,5 % de las madres no han señalado si durante su embarazo tuvo alguna conversación con su matró/a sobre la alimentación de su criatura. De entre aquellas madres que sí aportaron una respuesta, el 75,6 % y el 68,2 % en cada área confirma que a lo largo de su embarazo habló con su matró/a sobre la alimentación de la criatura. Como se puede apreciar, los resultados se diferencian por 7 puntos porcentuales.

p_50. ¿Le entregaron a Vd. una guía sobre la lactancia materna?

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	179	79,9	81,4	81,4
	No	41	18,3	18,6	100,0
	Total	220	98,2	100,0	
Ns/No lo recuerda		4	1,8		
Total		224	100,0		

Tabla 149: Entrega de una guía sobre lactancia materna, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2682	82,7	86,2	86,2
	No	431	13,3	13,8	100,0
	Total	3113	96,0	100,0	
Ns/No lo recuerda		130	4,0		
Total		3242	100,0		

Tabla 150: Entrega de una guía sobre alimentación materna

La entrega a las madres de una guía sobre lactancia materna es una práctica totalmente habitual en los hospitales públicos del Principado de Asturias ya que el 86,2 % de las mujeres totales y el 81,4 % de las madres de Álvarez-Buylla ha confirmado la recepción de la misma.

p_51. Pensando en la alimentación de la criatura recién nacida en el hospital, valore los siguientes aspectos:

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje
¿Recibió asesoramiento sobre la lactancia materna?	Sí	141	83,9%
	No	26	15,6%
	Ns/Nc	1	,4%
¿Le recomendaron leche artificial?	Sí	21	12,5%
	No	147	87,1%
	Ns/Nc	1	,4%
¿Le dieron un biberón (como regalo)?	Sí	29	17,4%
	No	136	80,8%
	Ns/Nc	3	1,8%
¿Le enseñaron a sacarse la leche?	Sí	80	47,3%
	No	86	51,3%
	Ns/Nc	2	1,3%
¿Le enseñaron la postura mejor para amamantar?	Sí	122	72,3%
	No	46	27,2%
	Ns/Nc	1	,4%
¿Le dieron materiales sobre leche artificial?	Sí	59	35,3%
	No	104	62,1%
	Ns/Nc	5	2,7%
¿Le ayudaron a amamantar?	Sí	96	57,1%
	No	71	42,4%
	Ns/Nc	1	,4%
¿Le pusieron en contacto con otras madres?	Sí	29	17,0%
	No	138	81,7%
	Ns/Nc	2	1,3%

Tabla 151: Valoración de un conjunto de aspectos relacionados con la alimentación de la criatura recién nacida en el Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje
¿Recibió asesoramiento sobre la lactancia materna?	Sí	2323	71,6%
	No	797	24,6%
	Ns/Nc	123	3,8%
¿Le recomendaron leche artificial?	Sí	657	20,3%
	No	2463	76,0%
	Ns/Nc	123	3,8%
¿Le dieron un biberón (como regalo)?	Sí	1077	33,2%
	No	2049	63,2%
	Ns/Nc	116	3,6%
¿Le enseñaron a sacarse la leche?	Sí	1193	36,8%
	No	1908	58,9%
	Ns/Nc	141	4,3%
¿Le enseñaron la postura mejor para amamantar?	Sí	1851	57,1%
	No	1231	38,0%
	Ns/Nc	160	4,9%
¿Le dieron materiales sobre leche artificial?	Sí	1021	31,5%
	No	2073	63,9%
	Ns/Nc	148	4,6%
¿Le ayudaron a amamantar?	Sí	1620	50,0%
	No	1471	45,4%
	Ns/Nc	151	4,7%
¿Le pusieron en contacto con otras madres?	Sí	451	13,9%
	No	2623	80,9%
	Ns/Nc	168	5,2%

Tabla 152: Valoración de un conjunto de aspectos relacionados con la alimentación en el hospital de la criatura recién nacida

De la totalidad de aspectos propuestos relacionados con la alimentación de la criatura recién nacida en el Hospital Álvarez-Buylla, aquel que se produjo con mayor frecuencia es la recepción de asesoramiento sobre lactancia materna; confirmado por el 83,9 % de las madres. También es notable el peso relativo en cuanto a la mejor postura para amamantar (72,3 %) y la ayuda prestada para dar el pecho a su bebé (57,1 %).

En estos tres aspectos indicados, la valoración de las madres de Álvarez-Buylla es siempre superior a la opinión que realizan la totalidad de las mujeres del Principado de Asturias.

p_52. Durante su estancia en el Hospital, ¿cómo alimentó a su bebé?

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Con leche materna solamente	157	70,1	70,4	70,4
	Leche materna y biberón	38	17,0	17,0	87,4
	Biberón solamente	28	12,5	12,6	100,0
	Total	223	99,6	100,0	
No está segura		1	,4		
Total		224	100,0		

Tabla 153: Alimentación de la criatura durante su estancia en el Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Con leche materna solamente	1264	39,0	40,0	40,0
	Leche materna y biberón	1331	41,1	42,1	82,0
	Biberón solamente	569	17,5	18,0	100,0
	Total	3164	97,6	100,0	
No está segura		78	2,4		
Total		3242	100,0		

Tabla 154: Alimentación de la criatura durante su estancia en el hospital

Esta pregunta analiza el tipo de alimentación de los niños y niñas durante el tiempo que se permaneció en el hospital después del parto.

A la vista de los resultados, el 0,4 % de las madres de Álvarez-Buylla no estaba segura del tipo de alimentación que siguió su hijo o hija durante el tiempo de estancia en el hospital.

Los resultados obtenidos para las madres que sí han contestado muestran que optó en exclusiva por la lactancia materna el 70,4 % de las mujeres que dieron a luz en el Hospital Álvarez-Buylla, por encima de los datos globales donde el 40 % alimentaron a su bebé solamente con leche materna.

Finalmente, la otra diferencia de los datos globales con los de Álvarez-Buylla es que el 17 % de las mujeres de este Hospital combinaron la alimentación de leche materna con el biberón,

sin embargo, teniendo en cuenta todos los hospitales de Asturias, el 42,1 % utilizaron esta forma de alimentación para sus bebés.

p_53. ¿Alguna vez ha dado de mamar a su hija o hijo?

Las mujeres que anteriormente indicaron que bien de forma exclusiva o bien de forma conjunta con el biberón dieron de mamar a su hijo o hija, no respondieron a esta pregunta.

□ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	5	17,2	17,9	17,9
	No	23	79,3	82,1	100,0
	Total	28	96,6	100,0	
	Ns/Nc	1	3,4		
Total		29	100,0		

Tabla 155: Mujeres que han dado de mamar alguna vez a su criatura, Hospital Álvarez-Buylla

□ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	112	17,4	20,0	20,0
	No	449	69,4	80,0	100,0
	Total	561	86,8	100,0	
	Ns/Nc	86	13,2		
Total		647	100,0		

Tabla 156: Mujeres que han dado de mamar alguna vez a su criatura

En las tablas de resultados se observa que el 13,2 % de las madres y el 3,4 % de las mujeres de Álvarez-Buylla no han contestado a esta pregunta, en parte como consecuencia de la no-respuesta proporcionada en la anterior. De entre las madres de este hospital que sí han contestado, el 17,9 % ha manifestado que en alguna ocasión (al menos una vez) han dado de mamar a su hijo o hija, mientras que el 82,1 % restante corresponde a las madres que nunca han optado por este tipo de alimentación.

Estos datos se muestran parejos a los resultados globales, ya que el 20 % ha indicado que al menos una vez ha dado de mamar a su bebé y el 80 % de las mujeres totales nunca amamantó a su niño o niña.

p_54. A la edad de tres meses, ¿qué tipo de alimentación tenía su criatura?

Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Leche materna solamente	151	67,4	67,7	67,7
	Biberón solamente	53	23,7	23,8	91,5
	Leche materna y biberón	19	8,5	8,5	100,0
	Total	223	99,6	100,0	
Ns/No lo recuerda		1	,4		
Total		224	100,0		

Tabla 157: Tipo de alimentación de la criatura a la edad de 3 meses, Hospital Álvarez-Buylla

Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Leche materna solamente	1655	51,0	52,7	52,7
	Biberón solamente	1141	35,2	36,3	89,0
	Leche materna y biberón	346	10,7	11,0	100,0
	Total	3142	96,9	100,0	
Ns/No lo recuerda		101	3,1		
Total		3242	100,0		

Tabla 158: Tipo de alimentación de la criatura a la edad de 3 meses

Es de interés conocer el tipo de alimentación de la criatura trascurridos tres meses desde su nacimiento en el Hospital Álvarez-Buylla y compararlo con los resultados totales. A este respecto, como también se observa en la tabla global de resultados, más de la mitad de los niños y niñas nacidas en el Hospital Álvarez-Buylla (67,7 %) se alimentaban de leche materna exclusivamente; mientras que en el 23,8 % de los casos, la alimentación era únicamente de biberón.

Dado que el 76,2 % de los bebés de Álvarez-Buylla se alimenta con leche materna frente al 63,7 % de los datos globales, se concluye que a los tres meses el uso de la leche materna para la alimentación es mayor en aquellos bebés que nacieron en el Hospital Álvarez-Buylla que en aquellos que nacieron en los hospitales públicos del Principado de Asturias.

SECCIÓN G: VALORACIÓN GLOBAL DE LA ATENCIÓN

p_55. En general, ¿cómo calificaría usted la atención recibida durante ...

a. el embarazo?

☐ **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Excelente	110	48,7	48,7	48,7
	Buena	109	48,2	48,2	96,9
	Regular	6	2,7	2,7	99,6
	Muy mala	1	,4	,4	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 159: Valoración global de la atención recibida durante el embarazo, Hospital Álvarez-Buylla

☐ **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Excelente	982	30,2	30,3	30,3
	Buena	1991	61,2	61,4	91,6
	Regular	163	5,0	5,0	96,6
	Mala	80	2,5	2,5	99,1
	Muy mala	29	,9	,9	100,0
	Total	3245	99,8	100,0	
	Ns/Nc	8	,2		
Total		3253	100,0		

Tabla 160: Valoración global de la atención recibida durante el embarazo

La valoración de la información recibida durante el embarazo es positiva en ambas áreas, ya que, el 96,9 % y 91,6 % de los casos la han valorado como buena o excelente. Sin embargo, si se distingue entre las dos categorías; el 48,7 % en Álvarez-Buylla la valoran como excelente mientras un porcentaje inferior en las embarazadas totales, el 30,3 %, creen que la atención recibida fue magnífica.

b. el parto?

 Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Excelente	135	59,7	59,7	59,7
	Buena	71	31,4	31,4	91,2
	Regular	12	5,3	5,3	96,5
	Mala	4	1,8	1,8	98,2
	Muy mala	4	1,8	1,8	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 161: Valoración global de la atención recibida durante el parto, Hospital Álvarez-Buylla

 Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Excelente	1533	47,1	47,3	47,3
	Buena	1329	40,9	41,0	88,2
	Regular	173	5,3	5,3	93,6
	Mala	115	3,5	3,5	97,1
	Muy mala	94	2,9	2,9	100,0
	Total	3244	99,7	100,0	
Ns/Nc		9	,3		
Total		3253	100,0		

Tabla 162: Valoración global de la atención recibida durante el parto

Para esta pregunta, las calificaciones siguen mostrando una alta satisfacción de las usuarias respecto a la información que se les proporcionó durante el parto, pero con menores diferencias a favor de la excelencia en el Hospital Álvarez-Buylla; el 59,7 % de las madres en este hospital ha contestado que el trato fue exquisito, frente al 47,3 % del conjunto de hospitales.

En esta ocasión, se ha manifestado como insatisfecho el 3,6 % de las usuarias de Álvarez-Buylla; valorando el cuidado durante el parto como malo o muy malo.

c. después del parto?

 Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Excelente	102	45,1	45,1	45,1
	Buena	95	42,0	42,0	87,2
	Regular	15	6,6	6,6	93,8
	Mala	9	4,0	4,0	97,8
	Muy mala	5	2,2	2,2	100,0
	Total	226	100,0	100,0	

Tabla 163: Valoración global de la atención recibida después del parto, Hospital Álvarez-Buylla

 Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Excelente	849	26,1	26,2	26,2
	Buena	1520	46,7	46,9	73,2
	Regular	424	13,0	13,1	86,3
	Mala	231	7,1	7,1	93,4
	Muy mala	214	6,6	6,6	100,0
	Total	3238	99,5	100,0	
	Ns/Nc	15	,5		
Total		3253	100,0		

Tabla 164: Valoración global de la atención recibida después del parto

En relación a la atención y servicio prestado tras el parto, queda patente que las diferencias siguen siendo favorables, por la mayor satisfacción, en el caso de aquellas mujeres que dieron a luz en Álvarez-Buylla. El 87,2 % de estas usuarias emitieron una opinión positiva al respecto, mientras que para el conjunto de las embarazadas esta proporción se reduce hasta el 73,2 %.

En el otro extremo se observa que para el 6,2 % de las usuarias la atención fue “mala” o “muy mala”, correspondiendo el 13,7 % de la totalidad de las mujeres con la misma valoración del servicio.

p_56. ¿Hay alguna cosa más que le gustaría añadir acerca de la atención recibida en el proceso de atención a su embarazo, parto y nacimiento?

En esta pregunta las mujeres tuvieron la posibilidad de anotar todas aquellas observaciones y sugerencias que considerasen oportunas en relación a su proceso de embarazo, parto y nacimiento. Las principales observaciones señaladas, son las que se presentan a continuación:

1. Satisfacción con la atención recibida a lo largo de todo el proceso de embarazo, parto y nacimiento (amabilidad de los distintos profesionales sanitarios, información recibida en todo momento, etc.).
2. Durante el proceso de embarazo y parto, hubo falta de información por parte del personal médico y de enfermería, en relación a aspectos como los cuidados posteriores necesarios para el bebé y las decisiones tomadas.
3. Disconformidad con la amabilidad y el trato recibido durante su estancia en el hospital por parte de las matrona/os; ya que señalan que en ocasiones hubo poco tacto y falta de comprensión y ayuda para amamantar a la criatura.
4. También se han detectado en menor medida “Otras” observaciones y sugerencias apuntadas por las madres, destacando:
 - Insatisfacción con las clases de preparación del parto por la escasa información acerca de la lactancia.
 - Deseo de mejora del sistema de visitas: demasiada gente en algunas habitaciones, falta de intimidad para amamantar al bebé.
 - Carencia de atención en algunos momentos del día por la falta de personal.
 - Falta de unidad en los consejos de las matronas acerca de la alimentación de la leche materna.
 - Demasiada tardanza en las citas médicas.

7. ANEXO: CUESTIONARIO

Buenos días Sra _____

En primer lugar permítame que me presente. Mi nombre es.....y la llamo en nombre de la Dirección General de Salud Pública y Participación.

Estamos realizando un estudio sobre la asistencia al embarazo, parto y nacimiento en los Hospitales de Asturias con objeto de mejorar los servicios asistenciales.

Hace unos días la Directora General le habrá enviado una carta personal anunciándole esta llamada y pidiéndole su colaboración para responder unas preguntas sobre su embarazo y parto más reciente.

Seremos lo más breves que sea posible con su ayuda. Gracias de antemano por su atención

Sección A. Resultado del parto y nacimiento

PARA LA ENTREVISTADORA: *Esta información viene clasificada en los registros. Rellenar antes de la entrevista. Puede necesitar que complete algún dato*

a) Tipo de parto: *(Si tuvo más de un bebé en esta ocasión, responda acerca del que nació primero.)*

- | | | |
|---------------|---|--|
| Parto vaginal | { | Natural <input type="checkbox"/> |
| | | Utilizando fórceps <input type="checkbox"/> |
| | | Utilizando una ventosa o paleta sobre la cabeza del bebé <input type="checkbox"/> |

- | | | |
|-------------|---|---|
| Por cesárea | { | Programada <input type="checkbox"/> |
| | | No programada, se decidió después de llegar al Hospital <input type="checkbox"/> |

→ **Tipo de anestesia con que le realizaron la cesárea**

- Con anestesia general
- Con anestesia epidural
- NS/NC

b) Señale las encuestas en que el resultado haya sido:

- | | | | |
|--|--------------------------|---|----------------------------|
| Feto muerto al nacimiento | <input type="checkbox"/> | } | Ver observaciones * |
| Nacido vivo que murió después del nacimiento | <input type="checkbox"/> | | |
| Nacido vivo con graves defectos | <input type="checkbox"/> | | |

* En estos supuestos inicie la entrevista señalando lo penoso que puede resultar recordar esta circunstancia y trasmita lo importante que resulta para la DGSPyP la respuesta a estas preguntas. Por ejemplo:

Queremos transmitirle nuestras condolencias... y al mismo tiempo quisiera señalarle lo importante que resulta que Vd. responda a esta encuesta sobre su experiencia, aún entendiendo que esos momentos que pasó hayan sido especialmente duros para Vd. Precisamente por ello, para la DGSP y P resulta de un gran interés recoger sus respuesta al cuestionario y agradeceríamos especialmente su esfuerzo y su colaboración para dedicarnos unos minutos y responder a estas preguntas.

Además, en estos casos no deberán efectuarse las preguntas 3, 36, 37, 38.d ni las Secciones E y F.

1. Con respecto a este último parto:

Se contempla adelantarse o retrasarse el plazo de 15 días antes o 15 días después de la fecha prevista para el parto, fecha prevista por el/la ginecóloga y que se le ha señalado a la mujer

- Fue a su tiempo. (Parto a término entre la semana 37 y 42)
- No fue a su tiempo
- a. Se adelantó Espontáneamente. Fue prematuro espontáneo
 Me lo provocaron
- b. Se retrasó Espontáneamente. Fue un retraso espontáneo
 Me lo provocaron
- NS/NC

2. ¿Ha tenido algún otro parto anterior?

- No Sí Anotar nº partos anteriores _____

3. ¿Cuánto pesó su criatura al nacer?

Si tuvo un parto múltiple, conteste esta pregunta en relación al/la que nació primero

_____ Gramos Tratar de saber la cifra lo más exacta posible.

- NS/NC

Sección B. La atención durante el embarazo

✓ El inicio del embarazo

4. ¿Qué profesional la atendió por primera vez en su embarazo? (Marcar solo una opción)

- Médica/o de familia Matrona/on
 Ginecólogo/a Otro _____

5. Aproximadamente, ¿de cuántas semanas de gestación estaba cuando acudió por primera vez a esta consulta?

Nº semanas _____

- NS/NC

✓ Los controles en el embarazo

Una revisión, control o seguimiento de embarazo es cualquier contacto con un médico/a o matron/a para comprobar el progreso del embarazo.

6. El seguimiento de su embarazo fue llevado a cabo:

- En la sanidad pública (pasar a P. 8)
- En la asistencia privada
- En ambas
- No acudí a ningún programa de seguimiento (pasar a P. 8)

7. ¿Cuál fue la principal razón por la que eligió ir a la asistencia privada? *Anotar literal*

8. ¿Qué profesionales le atendieron durante su embarazo y cuántos controles tuvo de cada uno de ellos? *(Sin incluir análisis de sangre o ecografías)*

- Matrona N° Controles _____
- Médica/o de familia N° Controles _____
- Ginecólogo/a u Obstetra N° Controles _____
- Otros/as _____ N° Controles _____

9. Durante el embarazo ¿la atendió siempre la misma persona?

- | | | | | | |
|-------------|----|--------------------------|-----------------|----|--------------------------|
| a. Matron/a | Sí | <input type="checkbox"/> | b. Ginecólogo/a | Sí | <input type="checkbox"/> |
| | No | <input type="checkbox"/> | | No | <input type="checkbox"/> |

10. A su juicio, la información que le dieron los profesionales sanitarios durante su embarazo fue:

Muy adecuada Adecuada Poco adecuada Nada adecuada Ns/Nc

✓ Pruebas prenatales

11. Durante el embarazo, le hicieron alguna de las siguientes pruebas para saber si el feto padecía defectos o malformaciones congénitas? *Posibilidad de señalar más de una opción.*

- Ecografías de alta resolución en la semana 12
- Amniocentesis (pinchazo en el vientre)
- Cribado combinado. Análisis de sangre en la semana 9- 10
- No me hicieron ninguna prueba para detectar defectos congénitos *(Pasar a P.14)*
- NO SABE/ NO SE ACUERDA *(Pasar a P. 15)*

12. ¿Le pidieron consentimiento para hacerlas?

Sí No NS/No lo recuerda

13. ¿Le dieron información suficiente y tuvo tiempo para tomar la decisión de hacerlas o no?

Sí No NS/No lo recuerda

(Pasar a P. 15)

14. ¿Por qué razón no le hicieron pruebas para saber si el feto padecía alguna alteración?

- No me las propusieron
- No quiso hacerlas
- Estaba fuera de plazo para hacerlas
- Otras _____
- No sabe / No lo recuerda

15. Aproximadamente, ¿cuántas ecografías le hicieron en total, durante su embarazo?

Número de ecografías _____ No sabe / No lo recuerda

16. Durante su embarazo, ¿acudió a clases de preparación al parto en la sanidad pública?

Sí *Pasar a P. 17*

No

16.b. Motivo por el que no acudió a las clases de preparación al parto

No lo consideré necesario *Pasar a P. 18*

No me informaron de esas clases *Pasar a P. 18*

No había plazas libres *Pasar a P. 18*

No, porque asistí a clases prenatales privadas *Pasar a P. 18*

No he asistido por problemas de horarios *Pasar a P. 18*

17. Si asistió a las clases ...

a. Valore la utilidad que le proporcionaron para el parto y el postparto

Muy útiles Útiles Relativamente útiles Poco útiles Nada útiles Ns/Nc

b. ¿Tuvo la oportunidad de elegir horario de asistencia a las clases?

Sí No Ns/Nc

c. Valore la adecuación del horario

Muy adecuado Adecuado Relativamente Adecuado Poco adecuado Nada Adecuado Ns/Nc

d. ¿Estaba permitida la asistencia de su pareja o alguien de su elección?

Sí No Ns/Nc

Sección C. El parto y el nacimiento del bebé

PARA TODAS, SALVO CESÁREA PROGRAMADA

18. ¿Cómo empezó el proceso del parto?

De manera natural Fue inducido o provocado

19. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo duró su último proceso de parto?

Horas _____ Minutos _____

20. ¿Sabe Vd. si se le aplicó alguna de las siguientes técnicas? *Posibilidad de marcar más de una opción*

Le dieron un gel vaginal

Le rompieron la bolsa de las aguas

Le pusieron un gotero con oxitocina

Ninguna de las anteriores

Ns/Nc

21. Durante el proceso de dilatación anterior al parto, ¿pudo moverse y elegir la posición que le resultaba más cómoda?

- Sí, la mayor parte del tiempo
- Sí, durante algún tiempo
- No, tuve que estar en reposo
- Ns/Nc

22. ¿Le permitieron beber o comer durante el proceso de dilatación anterior al parto?

- Sí, beber y comer
- Sólo beber pero no comer
- Ni beber ni comer
- Ns/Nc

23. Durante el proceso del parto, incluido el expulsivo ¿cree que le proporcionaron el alivio del dolor adecuado?

- Sí, totalmente
- Solo en determinados momentos
- No, porque no fue posible (*falta de tiempo*)
- No sabe / No lo recuerda

24. Durante el proceso del parto, incluyendo el expulsivo ¿utilizó o le aplicaron alguna de las siguientes técnicas para aliviar el dolor? *Posibilidad de señalar más de una opción*

- Métodos naturales (p.e. respiración, masajes)
- Ducha o baño de agua caliente
- Gas y aire a través de una mascarilla
- Analgésicos o calmantes del dolor
- Analgesia Epidural o similar
- Otro Especificar _____
- No utilizó ni le aplicaron nada para aliviar el dolor

25. ¿Le ofrecieron analgesia epidural?

- No Sí → La acepté { Sí No

SOLO PARA PARTO VAGINAL, CESÁREAS PASAR A P.30

✓ **El nacimiento del bebé**

26. ¿En qué posición dio a luz a su bebé? *Marcar solo una casilla*

- Tumbada con las piernas apoyadas en estribos
- Sentada / sentada apoyada en almohadas
- De costado
- De pie, en cuclillas o de rodillas
- Otro Anotar _____

27. ¿Le afeitaron o rasuraron el periné?

Sí No No sabe / No lo recuerda

28. ¿Le aplicaron un enema o lavativa?

Sí No No sabe / No lo recuerda

29. En el expulsivo, ¿se le practicó una episiotomía (corte a la entrada de la vulva)?

Sí No No sabe / No lo recuerda

✓ **El personal que la atendió**

PARA TODO TIPO DE PARTOS

30. La atendió la misma matrona o matron durante el proceso de parto y nacimiento?

Sí No, hubo más

31. ¿Conocía al personal sanitario que la atendió en el proceso de parto y nacimiento antes de iniciarse éste?

Solo al ginecólogo/a Solo a la matrona/on
A ambos A ninguno/a

32. Señale el grado de confianza que le inspiró el personal que le atendió durante el proceso de parto y nacimiento

Mucha Bastante Alguna Poca Ninguna Ns/Nc

33. ¿Estaba presente el/la ginecóloga/obstetra en el momento del nacimiento?

Si No No se acuerda

34. ¿Estaba permitido que una persona de su confianza, estuviera con usted durante el proceso del parto y en el momento del nacimiento de la criatura?

Sí, sólo durante la dilatación
Sí, durante la dilatación y el parto
No se permitía Pasar a P.36

35. ¿Su acompañante estuvo con Vd en este proceso del nacimiento? *No realizar para las cesáreas*

Si No No se acuerda

36. Inmediatamente después del nacimiento ¿mantuvo el contacto piel con piel con su bebé?

Si
No Pasar a P.38
No sabe/ No lo recuerda Pasar a P.38

37. ¿Durante cuánto tiempo mantuvo contacto piel con piel con su criatura inmediatamente después del nacimiento?

Menos de 30 minutos De 30 a 60 minutos Más de 60 minutos Ns/Nc

38. En general, pensando en la atención durante el proceso de embarazo y el parto ...

a. ¿Sintió que se respetó su intimidad?

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca Ns/No lo recuerda

b. ¿Fue tratada con amabilidad y comprensión?

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca Ns/No lo recuerda

c. ¿Cree que se le dio toda la información o las explicaciones que usted necesitó en un lenguaje comprensible?

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca Ns/No lo recuerda

d. ¿Se sintió Ud. participe en las decisiones acerca de su propio cuidado y el de su criatura?

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca Ns/No lo recuerda

Sección D. Atención en el hospital después del parto

39. ¿Cuánto tiempo duró la estancia en el hospital después de que su bebé naciera?

Número de días _____ Horas _____

40. Piensa que la duración de su estancia en el hospital fue ...

Demasiado larga

La adecuada

Demasiado corta

No está segura / No sabe

41. La información que recibió sobre su recuperación después del parto fue:

Totalmente adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

Totalmente Inadecuada

No sabe / No lo recuerda

42. ¿Ha realizado Ud. alguna visita de control de su propia salud entre la 4 y la 6 semana después del parto en los servicios sanitarios públicos?

Sí No No sabe / No lo recuerda

43. ¿Los y las profesionales le ofrecieron o le dieron consejo sobre contracepción después del parto?

Sí No No sabe / No lo recuerda

Sección E. Cuidados especiales de la criatura

44. ¿Fue su hija/ hijo atendido en una unidad neonatal en el hospital después del nacimiento?

Sí No *Pasar a Sección F*

45. ¿Cuánto tiempo estuvo su niño/niña en la atención neonatal?

1 día ó menos De 2-7 días Más de 8 días

46. Mientras su criatura estuvo ingresada en la Unidad Neonatal, ¿pudo Ud acompañarle?

Sí, estuve ingresada para acompañarla

Pude estar con ella, aunque no ingresada

No estaba permitido visitarla

47. Mientras su hija o hijo estuvo en la Unidad de Neonatología, ¿le permitieron alimentarlo/a al pecho o con leche materna?

Sí, le di el pecho

Si, me saqué la leche con un sacaleches

No, no opté por lactancia materna

No, no se permitía en la Unidad

No pudo porque ella o su criatura estaban muy enfermas

48. ¿Cómo valora la información que Usted y su pareja recibieron sobre el motivo de ingreso de su criatura en la Unidad Neonatal?

Totalmente adecuada/suficiente

Adecuada/Suficiente

Poco Adecuada/Suficiente

Totalmente Inadecuada/Insuficiente

No sabe / No lo recuerda

Sección F. La alimentación del bebé (criatura)

49. Durante el embarazo, ¿habló con su matron/a sobre la alimentación de la criatura?

Sí No No sabe / No lo recuerda

50. ¿Le entregaron a Vd. una guía sobre la lactancia materna?

Sí No No sabe / No lo recuerda

51. Pensando en la alimentación de la criatura recién nacida en el hospital, valore los siguientes aspectos:

	SI	NO	Ns/Nc
¿Recibió asesoramiento sobre lactancia materna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Le recomendaron leche artificial?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Le dieron un biberón (como regalo)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Le enseñaron a sacarse la leche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Le enseñaron la postura mejor para amamantar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Le dieron materiales sobre leche artificial?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Le ayudaron a amamantar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿La pusieron en contacto con otras madres?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

52. Durante su estancia en el Hospital, ¿cómo alimentó a su bebé? *Una sola opción*

Con leche materna solamente *Pasar a P.54*
 Leche materna y biberón *Pasar a P.54*
 Biberón solamente
 No está segura

53. ¿Alguna vez ha dado de mamar a su hija o hijo? (Incluso si fue sólo una vez)

Sí No No sabe / No lo recuerda

54. A la edad de tres meses, ¿qué tipo de alimentación tenía su criatura?

Leche materna solamente Biberón solamente Leche materna y biberón

Sección G. Valoración global de la atención

55. En general, ¿cómo calificaría usted la atención recibida durante ...

a. el embarazo?

Excelente Buena Regular Mala Muy mala

b. el parto?

Excelente Buena Regular Mala Muy mala

c. después del parto?

Excelente Buena Regular Mala Muy mala

56. ¿Hay alguna cosa más que le gustaría añadir acerca de la atención recibida en el proceso de atención a su embarazo, parto y nacimiento?

Sección H. Usted y su familia

57. ¿En qué país nació Vd.?

España

Otro Anotar país _____

↳ ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en España? _____ Años

58. Municipio en el que está empadronada. _____ Provincia _____

59. ¿Cuál es su estado civil?

Soltera Casada Vive en pareja Viuda Separada Divorciada

60. ¿Cuáles son los estudios más altos que ha terminado?

Debe elegir una única respuesta. La pregunta hace referencia a estudios terminados en el momento actual.

1. Sin estudios o estudios primarios incompletos: Menos de 6 años o cursos de primaria aprobados	
2. Estudios primarios completos: 6º EGB aprobado, Certificado de Escolaridad, 6 años o cursos de primaria aprobados	
3. Estudios secundarios 1ª etapa: 8º EGB aprobado, Graduado Escolar, Bachillerato Elemental, Formación Profesional de 1º Grado o Ciclos Formativos de Grado Medio aprobados, ESO aprobada, 4 años o cursos de secundaria aprobados.	
4. Estudios secundarios 2ª etapa: BUP, Bachillerato Superior, Bachillerato LOGSE, COU, Preu, Formación Profesional 2º Grado o Ciclos Formativos de Grado Superior, 5 o más años o cursos de secundaria aprobados.	
5. Estudios universitarios medios Diplomatura, magisterio, arquitectura o ingeniería técnica	
6. Estudios universitarios superiores Licenciatura, arquitectura o ingeniería superior, doctorado)	
7. Ns/Nc	

61. ¿Cuál es su situación laboral a día de hoy?

Marcar una respuesta. Preguntar sobre su situación laboral y luego categorizarlo. Se refiere a su situación actual

Trabajando	
Trabajando con baja de tres meses o más	
En desempleo	
Jubilada o pensionista	
Estudiante	
Trabajo doméstico no remunerado	
Realizando sin remuneración trabajos sociales	
Otras situaciones	
Ns/Nc	

Pasar a P.63

Pasar a P.63

62. A continuación nos gustaría que nos diera algunos datos sobre su trabajo actual:

En caso de ser estudiante preguntar por la persona principal del hogar. En caso de estar buscando empleo, preguntar por la última ocupación. CNO (Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO-94) y CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE-93) se rellenan con los códigos de las tarjetas. Marque la ocupación de mayor duración.

Ocupación	Categoría profesional	CNO	Actividad de la empresa	CNAE	Años trabajados	Ocupación de mayor duración

62_b ¿Cuál es su situación de empleo laboral o profesional en su actual o última ocupación?

La pregunta hace referencia únicamente a la situación del empleo actual; si está en paro preguntar por su última ocupación, o por la que él entrevistado/a considere su principal ocupación

Trabajadora por cuenta propia sin asalariados/as	
Trabajadora por cuenta propia con menos de 10 asalariados/as	
Trabajadora por cuenta propia con más de 10 asalariados/as	
Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados/as	
Gerente de una empresa con más de 10 asalariados/as	
Capataz, supervisor/a o encargado/a	
Otro tipo de asalariado	
NS/NC	

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

63. ¿Desea Vd realizar algún tipo de comentario sobre la realización de esta encuesta?

Entrevistadora: por favor, compruebe que ha respondido a todas las preguntas que corresponden a su caso.