



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (CURMP) SOBRE EL POSICIONAMIENTO EN EL ABORDAJE TERAPÉUTICO CON FÁRMACOS ANTIANGIOGÉNICOS DEL EDEMA MACULAR DIABÉTICO (EMD)

ABORDAJE TERAPÉUTICO CON FÁRMACOS ANTIANGIOGÉNICOS DEL EDEMA MACULAR DIABÉTICO (EMD)

CELEBRACIÓN DE LA CURMP: Oviedo, 22 de diciembre de 2023.

El abordaje terapéutico del edema macular diabético (EMD) queda establecido del siguiente modo:

1ª LÍNEA DE TRATAMIENTO: AFLIBERCEPT o RANIBIZUMAB BIOSIMILAR

Se podrá priorizar el uso de **faricimab** en 1ª línea:

- Pacientes **naive** con criterios clínicos de gravedad: **quistes de gran tamaño, biomarcadores en OCT de inflamación** (puntos hiperreflectivos, membrana epirretiniana, desprendimiento neurosensorial).
- Pacientes **naive** en los que está **contraindicado el uso de corticoides**.

2ª LÍNEA DE TRATAMIENTO: FARICIMAB

Serán candidatos a tratamiento con faricimab:

- Pacientes **sin respuesta** o **con respuesta parcial** (persistencia de FSR y/o FIR) tras la fase de carga con otros antiangiogénicos.
- Pacientes que responden a otros antiangiogénicos pero con **intervalos de tratamiento iguales o inferiores a 8 semanas** ($\leq Q8$).
- Pacientes que **no toleran tratamiento corticoideo** (hipertensión ocular, glaucoma) **y/o** que **no consiguen alcanzar ausencia de fluido tras 3 meses** de la inyección o **precisen > 3 inyecciones al año** (riesgo elevado de desarrollo de catarata).

3ª LÍNEA DE TRATAMIENTO: BROLUCIZUMAB

Debe plantearse la **suspensión del tratamiento** en aquellos casos en los que, agotadas las posibilidades terapéuticas, los pacientes no alcancen una **agudeza visual igual o superior a 0.1** (excepto en casos de ojo único funcional) no atribuible a otras patologías oculares asociadas, y que tengan una alteración macular evidente en OCT, con daño estructural/anatómico que justifique esa baja visión, y que sea irreversible.

Abreviaturas:

DEP: Desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina

FIR: Fluido intrarretiniano

FSR: Fluido subretiniano

OCT: Tomografía de coherencia óptica

Este dictamen podrá ser revisado en el momento en el que las condiciones de indicación y de financiación de estos medicamentos varíen.