inforsan breves

Mortalidad en el Área Sanitaria VIII, año 2006

FICHA TÉCNICA

Promueve y edita

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias

Distribuye

Sección de Información Sanitaria Servicio de Salud Poblacional Dirección General de Salud Pública

Realización del trabajo

Marisa Redondo Cornejo Félix Álvarez Carrascal Ignacio Donate Suárez Laudina Rodriguez Suárez Rafael Cofiño Fernández

Diseño gráfico

Forma

Agradecer a todos los profesionales que a través del trabajo de certificar causa de muerte hacen posibles los informes de mortalidad e informarles que existe un programa llamado "CERTIFICA" al que se puede acceder a través de la página web que viene a continuación y donde encontrará información y casos prácticos que le ayudarán en la mejora de la calidad de la certificación.

Copias adicionales de este informe en versión electrónica pueden obtenerse gratuitamente a través de:

INFOSAN@princast.es

http://tematico.asturias.es/salud/plan/portada.php

Tfno: 985 106322

Depósito legal: AS-3923-08

Oviedo, marzo de 2008


Mortalidad en el Área Sanitaria VIII, año 2006:

En el año 2006 se produjeron en Asturias 12325 defunciones (6371 varones y 5954 mujeres), 356 fallecidos menos que en el año 2005. La tasa bruta de mortalidad se situó en 11,4 fallecidos por cada 1000 habitantes, lo que supone una disminución del 3,4% respecto al anterior año .

En el Área VIII **fallecieron 1044 personas** (557 varones y 487 mujeres), 37 fallecidos menos que en el año 2005. La tasa bruta de mortalidad se situó en 12,6 muertes por cada 1000 habitantes, lo que supone una disminución del 4% en relación al año 2005.

En 2006 se aprecia un **exceso de mortalidad** del 8% respecto a la registrada en Asturias como aparece reflejado en la figura 1. Por sexos, el incremento es mayor en el caso de los varones (14%) que en las mujeres (3%).

FIGURA 1. Índice de mortalidad estandarizado (IME) en el Área Sanitaria VIII en el periodo 2002-2006.



En relación con la **esperanza de vida**, el número medio de años que se espera que viva una mujer del Área VIII se situó en 85,3 años (Asturias 84,5) y para los hombres en 74,6 años (Asturias 76,5).

Al igual que puede pasar con otros indicadores hay que ser cautos a la hora de hacer comparaciones de esperanza de vida con otras Áreas y con Asturias porque su cálculo es muy sensible a cambios en las tasas de mortalidad por edad especialmente en edades tempranas. Al ser bajo el número de defunciones y baja la población, pequeñas fluctuaciones en el número de fallecidos se amplifican artificiosamente sin que esto pueda interpretarse como un cambio de tendencia. Por ello es mejor usar medias de varios años para valorar cambios o calcularla utilizando datos agregados de varios años.

Los nacidos muertos fueron dos y uno los fallecidos menores de un año. Esto hace que la tasa de **mortalidad perinatal** (tres casos en 2006, un caso en 2005) aumente un 67% respecto a la registrada en 2005 situándose en 6,1 fallecidos por cada mil nacidos. Conviene tener en cuenta a la hora de hacer comparaciones que el número de defunciones es muy bajo y provoca diferencias no significativas desde el punto de vista estadístico y que no tienen relevancia desde el punto de vista de la salud pública.

No se registraron casos de mortalidad materna durante éste año 2006

En las tablas 1 y 2 aparece reflejada la **evolución de la mortalidad** en el Área Sanitaria VIII desde el año 1996 (primer año con datos definitivos) hasta 2006 (último año disponible).

TABLA 1. Varones fallecidos en el Área Sanitaria VIII durante el periodo 1996-2006 por grupos de edad, tasas específicas de mortalidad (por 1000), tasas estandarizadas por población europea (por 1000) y tasa estandarizada de años potenciales de vida perdidos por población europea (por 100000).

| | año | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| gedad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 00-00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 01-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20-24 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 25-29 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 30-34 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| 35-39 | 16 | 5 | 14 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 40-44 | 9 | 7 | 9 | 13 | 14 | 5 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 45-49 | 14 | 11 | 16 | 11 | 15 | 18 | 20 | 18 | 17 | 11 | 22 |
| 50-54 | 17 | 24 | 17 | 16 | 23 | 29 | 20 | 22 | 18 | 13 | 15 |
| 55-59 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 31 | 14 | 30 | 21 | 28 | 28 |
| 60-64 | 51 | 36 | 37 | 36 | 24 | 28 | 23 | 21 | 23 | 29 | 25 |
| 65-69 | 55 | 73 | 77 | 85 | 60 | 53 | 66 | 35 | 36 | 45 | 36 |
| 70-74 | 100 | 82 | 97 | 84 | 112 | 86 | 96 | 72 | 94 | 82 | 77 |
| 75-79 | 79 | 102 | 100 | 99 | 129 | 110 | 119 | 131 | 128 | 102 | 106 |
| 80-84 | 65 | 71 | 64 | 81 | 74 | 81 | 88 | 77 | 118 | 93 | 116 |
| 85+ | 77 | 89 | 60 | 80 | 68 | 64 | 84 | 74 | 76 | 90 | 100 |
| total | 528 | 538 | 518 | 545 | 565 | 520 | 555 | 510 | 560 | 521 | 557 |
| tasa 0/00 | 12,1 | 12,4 | 12,1 | 12,8 | 13,4 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 13,8 | 13,0 | 14,0 |
| t.std | 10,3 | 10,3 | 9,2 | 9,7 | 9,6 | 9,1 | 9,3 | 8,4 | 8,7 | 8,3 | 8,7 |
| t.std APVP | | | | | | | 62,6 | 60,3 | 55,6 | 52,0 | 68,1 |

TABLA 2. Mujeres fallecidas en el Área Sanitaria VIII durante el periodo 1996-2006 por grupos de edad, tasas específicas de mortalidad (por 1000), tasas estandarizadas por población europea (por 1000) y tasa estandarizada de años potenciales de vida perdidos por población europea (por 100000).

| | año | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| gedad | | | 1000 | 1000 | | | | 2000 | | 0005 | |
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 00-00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01-04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 0 | 0 | 1_ | 0 | 0 | 1_ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 30-34 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 35-39 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 40-44 | 5 | 3 | 1_ | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 45-49 | 7_ | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 |
| 50-54 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| 55-59 | 9 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 5 | 8 | 8 | 4 |
| 60-64 | 22 | 12 | 9 | 19 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 14 |
| 65-69 | 25 | 39 | 23 | 34 | 23 | 31 | 24 | 18 | 18 | 10 | 12 |
| 70-74 | 57 | 47 | 43 | 46 | 41 | 40 | 47 | 44 | 36 | 34 | 41 |
| 75-79 | 90 | 73 | 82 | 87 | 88 | 80 | 73 | 84 | 72 | 73 | 66 |
| 80-84 | 100 | 91 | 91 | 102 | 88 | 94 | 113 | 96 | 124 | 104 | 125 |
| 85+ | 175 504 | 176 459 | 180 | 188 | 183 463 | 194 | 179 | 220 501 | 213 | 219 486 | 213 487 |
| total tasa 0/00 | 504 10,7 | 459 9,9 | 455 9,9 | 506 11,1 | 10,2 | 481 10,7 | 476 10,8 | 11,4 | 502 11,5 | 486 11,2 | 11,3 |
| t.std | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 3,7 |
| t.std APVP | 5,4 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 18,3 | 22,7 | 22,7 | 24,2 | 10,1 |

Respecto a las **causas de muerte**, al igual que ocurre en el total de Asturias, las enfermedades del sistema circulatorio se mantuvieron como primera causa de muerte, representando el 31,0%, seguidas por los tumores malignos responsables del 28,3% y las enfermedades del sistema respiratorio responsables del 12,6% de las muertes ocurridas.

Las figuras 2 y 3 representan la evolución de las tasas de mortalidad de alguno de los principales **grandes grupos de causa de defunción** en el periodo 2002-2006, donde aparecen variaciones según sexo y año.

Figura 2. Tasas de mortalidad por grandes grupos de causa de defunción en varones del Área Sanitaria VIII durante el periodo 2002-2006.(Tasas por 100000 personas-año)





Figura 3. Tasas de mortalidad por grandes grupos de causa de defunción en mujeres del Área Sanitaria VIII durante el periodo 2002-2006.(Tasas por 100000 personas-año)



El tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón es la **causa más frecuente** de fallecimiento entre los varones con un 10,6%, seguido de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma) con un 9,7%. En el caso de las mujeres, las enfermedades cerebrovasculares con un 9,7% fueron las causantes del mayor porcentaje de muertes seguidas por los trastornos mentales orgánicos, senil y presenil que representaron el 7,4%.

Mortalidad en el Área Sanitaria VIII, año 2006

La mortalidad por suicidio aparece como la **primera causa de muerte** tanto en varones como en mujeres dentro del **grupo de edad de 15-39 años**, seguida de otros accidentes y de las muertes asociadas al consumo de drogas en el caso de los varones. Las muertes ligadas al cáncer de pulmón, cáncer de mama, infartos de miocardio, otras enfermedades del corazón y el cáncer de estómago ocurren dentro del g**rupo de edad de 40-64 años** en varones y mujeres. Reducir la mortalidad por estas patologías en estas edades aparece como prioridad de trabajo para mejorar la salud pública en este Área Sanitaria.

Para **más información**, cada Centro de Salud dispone de un ejemplar en formato papel donde se muestran los resultados globales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias acompañado de un CD con los datos globales de Asturias y de las Áreas de Salud definidas según el mapa sanitario, así como la metodología utilizada y las listas detallada y reducida de la CIE-10.

También puedes acceder a este informe, a los de años anteriores y a otros estudios específicos relacionados con la mortalidad en Asturias a través de la página web http://tematico.asturias.es/salud/plan/portada.php

http://tinyurl.com/5adg7h



Gobierno del Principado de Asturias

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS