

RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN DURANTE EL EMBARAZO (Calendario de Vacunación para todas las edades 2025)

Vacuna	Recomendación	Pauta
Gripe	Vacunación anual con vacuna inactivada (si el embarazo ocurre de noviembre a marzo) Contraindicada la vacuna atenuada	1 dosis (según campaña de vacunación)
Covid-19	Todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación	1 dosis (según campaña de vacunación)
Tdpa	A partir de la 27 semana de gestación (preferentemente en las semanas 27 o 28).	1 dosis en cada embarazo (puede sustituir a una dosis de Td si es necesario aplicarla en el embarazo)
Td	Solo si es necesaria para: <ul style="list-style-type: none"> - completar la pauta básica de primovacunación. - completar las dosis de recuerdo - una profilaxis antitetánica de heridas 	<ul style="list-style-type: none"> - Al menos 2 dosis antes del final del embarazo, y la última como vacuna Tdpa (semanas 28-36) - 1 dosis como vacuna Tdpa (semanas 28 a 36) - 1 dosis como vacuna Tdpa
VHB	Serología (detectar madres portadoras, inmunidad y enfermedad pasada) Vacunar a mujeres no inmunes y no vacunadas si hay alguna indicación médica, ocupacional, conductual o epidemiológica	3 dosis (0-1-6 meses) con vacuna de adulto
VNC, MenACWY, Hib, HA, VPH	No recomendadas durante el embarazo. Valorar en cada caso particular el riesgo de enfermedad y el beneficio de la vacunación	Pauta estándar de cada vacuna
Triple vírica (SRP)	Contraindicada. Realizar serología de rubéola en el embarazo y vacunar a las seronegativas tras el parto	Vacunación posparto: Completar hasta 2 dosis, separadas 4 semanas, teniendo en cuenta solo las dosis anteriores documentadas Si ya tiene 2 dosis documentadas, aplicar una 3.ª dosis una sola vez
Varicela	Contraindicada. Realizar serología de varicela en el embarazo, y vacunar a las mujeres seronegativas tras el parto	Vacunación posparto: 2 dosis separadas 1-3 meses