

Calendario de vacunaciones del adulto, Asturias 2014

**RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN EN EL EMBARAZO**

| Vacuna   | Recomendación  | Pauta  |
|--|--|--|
| <b>Gripe</b>                                       | Vacunación anual con vacuna inactivada (si el embarazo ocurre de noviembre a marzo)<br>Contraindicada la vacuna atenuada   | 1 dosis (campana de vacunación)  |
| <b>Td</b>  | Solo si es necesaria para:<br>- completar la pauta básica de primovacuna<br><br>- completar las dosis de recuerdo<br><br>- una profilaxis antitetánica de heridas                                  | Al menos 2 dosis antes del final del embarazo, y la última como vacuna Tdpa (entre las semanas 28 a 36)<br><br>1 dosis como vacuna Tdpa (entre las semanas 28 a 36)<br><br>1 dosis como vacuna Tdpa      |
| <b>Tdpa</b>  | Vacunar entre las semanas 28 a 36 de embarazo (revisión del 3 <sup>er</sup> trimestre)   | 1 dosis en cada embarazo (puede sustituir a una dosis de Td si es necesario aplicarla en el embarazo)  |
| <b>HB</b>  | Serología (detectar madres portadoras, inmunidad y enfermedad pasada)<br><br>Vacunar a mujeres no inmunes y no vacunadas si hay alguna indicación médica, ocupacional, conductual o epidemiológica | 3 dosis (0-1-6 meses) con vacuna de adulto   |
| <b>VNC13<br/>VNP23<br/>MenC Hib<br/>HA<br/>VPH</b> | <b>No recomendadas durante el embarazo.</b><br><br>Valorar en cada caso particular el riesgo de enfermedad y el beneficio de la vacunación   | Pauta estándar de cada vacuna  |
| <b>Triple vírica (SRP)</b>                         | <b>Contraindicada.</b><br><br>Realizar serología de rubéola en el embarazo y vacunar a las seronegativas tras el parto   | <i>Vacunación posparto: Completar hasta 2 dosis, separadas 4 semanas, teniendo en cuenta solo las dosis anteriores documentadas Si ya tiene 2 dosis documentadas, aplicar una 3.ª dosis una sola vez</i> |
| <b>Varicela</b>                                    | <b>Contraindicada.</b><br><br>Realizar serología de varicela en el embarazo, y vacunar a las mujeres seronegativas tras el parto   | <i>Vacunación posparto: 2 dosis separadas 1-3 meses</i>  |