

# Píldora inFormativa BIFAP

## ¿Qué es una Píldora inFormativa BIFAP?

Los datos registrados en la Historia Clínica Electrónica disponibles en BIFAP:

Permiten estudiar la seguridad y efectividad de los medicamentos

Su calidad influye en los resultados obtenidos en los estudios de investigación



Píldoras inFormativas



*Te informaremos del interés epidemiológico del registro de los datos clínicos en los estudios de investigación*

*Te daremos unas sencillas recomendaciones para el buen registro de la información*

*Te aconsejaremos cómo realizarlo en la Historia Clínica Electrónica*


*Te orientaremos sobre la importancia del registro adecuado*

# Píldora inFormativa BIFAP

## Tromboembolismo venoso y uso de anti-osteoporóticos

Un estudio\* realizado con BIFAP ha permitido:

- Describir las características de los usuarios de estos medicamentos**
- Comprobar que la incidencia de TEV no es diferente entre distintos anti-osteoporóticos**



*Todo ello gracias a que la información registrada en la historia clínica electrónica de AP incluía:*

*-Los datos relevantes sobre los 83.334 pacientes que iniciaron tratamiento con un anti-osteoporótico*

*-La identificación correcta y validación del 98% de los 401 casos de TEV detectados*

*-La información suficiente para que los resultados en BIFAP sean equiparables a la base de datos británica CPRD, de referencia en farmacoepidemiología*

# Píldora inFormativa BIFAP

## Sin embargo... el registro de tabaco



Faltaba en el 70% de los pacientes del mismo estudio sobre tromboembolismo venoso y uso de anti-osteopóroticos\*

Lo que fue una limitación en el análisis del tabaquismo como factor de riesgo de TEV.

*El registro de tabaco es de especial interés epidemiológico en cualquier estudio de investigación*

*Debe realizarse siguiendo los protocolos de cada centro de salud*

*Es importante registrar también al paciente NO fumador ya que un paciente sin registro de tabaco no se puede asumir que no fume*

*Recomendamos actualizar el registro de tabaco en cada paciente al menos cada 3 años*