


Píldora inFormativa BIFAP

Incidencia de Tiroiditis en niñas

BIFAP contiene información pediátrica para realizar estudios de investigación.

En este estudio* se estimó la tasa basal de incidencia de tiroiditis en niñas de BIFAP.



La incidencia aumentó con la edad hasta la adolescencia y después se estabilizó. La incidencia resultó algo mayor en el último periodo del estudio.

Todo ello gracias a:

Los datos registrados en la HCE de 480.169 niñas de 9-18 años desde el 2002 al 2016.

El registro en la HCE de AP:

- Diagnóstico y tipo de tiroiditis.*
- El resultado de la prueba de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea.*
- La medicación asociada.*
- Los comentarios vinculados en el texto libre del episodio.*

Píldora inFormativa BIFAP

Sin embargo...

La fecha, en el 10% de los episodios de tiroiditis, estaba registrada con fecha posterior al inicio del tratamiento o las primeras consultas que desencadenaron el diagnóstico.



De los casos de tiroiditis, 53,98% eran autoinmunes y 2,65% tenían otra etiología, pero en el 43,37% no se informó del tipo de tiroiditis.



Un tercio de las tiroiditis registradas no incluyeron datos confirmatorios del diagnóstico.



Recordad la importancia de registrar:

- La fecha correcta de inicio del episodio*
- Los diagnósticos de los informes del hospital y especialistas*
- Las pruebas complementarias que confirman el diagnóstico*
- La medicación asociada al episodio correspondiente*
- En texto libre, la información relevante que contribuya a confirmar el diagnóstico y que no pueda ser registrada en otro lugar de la HCE*