

INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEO DE ZYNTABAC® (bupropion)

El bupropion (Zyntabac®) es un medicamento que ayuda a lograr el objetivo de abandono de consumo de tabaco y reduce los síntomas del síndrome de abstinencia, ayudando a dejar el hábito.

Cómo se usa

Comenzar con el tratamiento 7 a 10 días antes de dejar de fumar, fijando la fecha de cese en la segunda semana.

- **Días 1º al 6º:** 1 comprimido (150 mg) al levantarse.
- **A partir del 7º día:** dos comprimidos al día, separados al menos 8 horas (intentar evitar el la toma del segundo comprimido después de las 5 de la tarde, para prevenir insomnio). La pauta de mantenimiento es de 7-9 semanas.

Seguridad del medicamento

Normalmente los efectos secundarios son leves y desaparecen solos. Los más frecuentes son: insomnio, sequedad de boca, náuseas y dolor de cabeza. Si aparecen, informe a su profesional sanitario de referencia.

No debe tomar este medicamento si está embarazada o tiene previsto estarlo. Tampoco si ha sufrido convulsiones o epilepsia, tiene cirrosis hepática, tumores cerebrales, o anorexia, bulimia o trastorno bipolar. Informe a su médico de otros fármacos que está tomando, por si hay interacciones.

Consulte con su médico la relación del fármaco con el consumo del alcohol o con su abandono.



1	150mg/día	<input type="radio"/>	
2	150mg/día	<input type="radio"/>	
3	150mg/día	<input type="radio"/>	
4	150mg/día	<input type="radio"/>	
5	150mg/día	<input type="radio"/>	
6	150mg/día	<input type="radio"/>	
7	150mg/12 h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	150mg/12 h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	150mg/12 h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	150mg/12 h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	150mg/12 h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	150mg/12 h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	150mg/12 h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...	Iniciar pauta 1-2 semanas antes de dejar de fumar Pauta de mantenimiento de 7-9 semanas Intervalo mínimo de 8 horas entre tomas		