Prevención y Atención al Cáncer de Mama en Asturias

P A C M A

Noticias PACMA ‖ Número 1- 09 de mayo del 2005

Políticas sanitarias

"Alianza contra el cáncer" en Europa para coordinar la lucha contra la enfermedad

Los ministros de sanidad de la Unión Europea se reunieron en París el pasado mes de abril y acordaron "fortalecer la coordinación" de sus políticas contra el cáncer y para ello han constituido una "alianza contra el cáncer" que "asociará a los mejores expertos" de todos los países en estrategias de lucha contra la enfermedad. Se desarrollarán líneas para "el intercambio de prácticas en materia de prevención y detección de casos" y la puesta en marcha de un "programa de evaluación de las prácticas clínicas".

Acceso a la noticia en Eurosurveillance weekly
http://www.eurosurveillance.org/ew/2005/050421.asp#3

Epidemiología

Cáncer en Europa en el año 2004

Nota de prensa publicada por International Agency for Research on Cancer , 17 febrero 2005

Más de 1,7 millones de muertes por cáncer y cerca de 2,9 millones de nuevos casos, se produjeron en Europa durante el pasado año 2004, según las estimaciones de un artículo publicado en Annals of Oncology, por el IARC, el pasado mes de febrero. Los autores advierten que el envejecimiento de la población europea mantendrá este incremento.
Entre las mujeres el cáncer de mama sigue siendo el más frecuente, representando el 27.4% de todos los casos en mujeres. También es el más letal, con una mortalidad cercana a 130.000 muertes (el 17.4% del total). Uno de cada ocho cánceres en Europa era un cáncer de mama y esta forma de cáncer representa el 7.6% de todos los fallecimientos por cáncer.

Acceso a la nota de prensa de la IARC:
http://www.iarc.fr/ENG/Press_Releases/pr159a.html

Acceso al texto completo en Annals of Oncology:
http://annonc.oupjournals.org/cgi/content/full/16/3/481

Las frutas y verduras no protegen del cáncer de mama:

Noticia publicada en Plan de Salud Asturias: enero 2005

El consumo de vegetales y frutas no protege frente al cáncer de mama. Esta es una de las conclusiones del estudio realizado por un grupo de investigadores europeos liderado por la Dra Carla van Gils que acaba de publicar la prestigiosa revista científica JAMA. El trabajo está basado en el estudio y seguimiento de cerca de 300.000 mujeres pertenecientes a 8 países europeos (5459 asturianas). Más de 3500 de estas mujeres desarrollaron cáncer…

Acceso a la noticia en Plan de Salud Asturias:
http://tematico.princast.es/salud/plan/noticias/index.php?task=view&id=14
Acceso a la nota de prensa de IARC:
http://www.iarc.fr/ENG/Press_Releases/pr157a.html
Acceso al resumen del artículo en JAMA:
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/293/2/183

Información a las mujeres

Uso de metáforas en el discurso del cáncer

Referenciado en Escepticemia. Doyma, 2 de mayo 2005
Artículo publicado en *Journal of Clinical Oncology*, Vol 22, No 19 (October 1), 2004

Gary M. Reisfield, del departamento de Salud Comunitaria y Medicina de Familia de la Universidad de Florida (EE UU), es sobrino de la señora X y desde que su tía le contó lo sucedido empezó a interesarse por el uso de las metáforas en medicina. Hace unos meses, publicó un brillante artículo sobre "El uso de metáforas en el discurso del cáncer" en el Journal of Clinical Oncology. Reisfield llama la atención sobre el amplio uso de las metáforas de corte militar, con sus batallas, luchas, arsenales terapéuticos, victorias y rendiciones.

Artículo publicado en: acceso al texto completo en formato pdf:
http://www.scielosp.org/pdf/gs/v17n3/opinion.pdf
Acceso a la referencia en Escepticemia (precisa log-in):
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/pescepticemia.plantilla?pident=2651

Informar para la toma de decisiones en el screening de cáncer de mama:

Artículo publicado en British Medical Journal 2005;330:936 23 de abril.

Artículo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sydney donde se presentan resultados sobre el screening de mama que pueden ser utilizados para mejorar la toma de decisiones por parte de las mujeres participantes.

Acceso al texto completo en el BMJ:
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/330/7497/936

¿Qué información reciben las mujeres italianas en los programas de screening?

Artículo publicado en European Journal of Public Health 2205 15 (1):66-69.

Se estudiaron las cartas de invitación y los folletos informativos usados en 60 programas de screening de cáncer de mama en Italia. Se evaluó qué tipo de información se ofrecía a las mujeres. Los autores concluyen que aunque las cartas y los folletos aportan información, dichos materiales son inadecuados para presentar los riesgos y efectos secundarios de la mamografía. Teniendo en cuenta la importancia que dicha información tiene para que las mujeres tomen decisiones, es necesario mejorar los contenidos de estos materiales

Acceso al resumen del artículo:
http://eurpub.oupjournals.org/cgi/content/abstract/15/1/66
Acceso al texto completo del artículo:
http://eurpub.oupjournals.org/cgi/content/full/15/1/66

Asesoramiento cáncer de mama y diferencias raciales

Artículo publicado en JAMA vol 293, nº 1, 14 abril 2005.

En el estudio se investiga la relación entre la raza y la solicitud de asesoramiento genético (BRCA 1-2)de mujeres con historia familiar de cáncer mama u ovárico y determinar la contribución de factores socioeconómicos, percepción de riesgo, preocupación, actitudes ante el test e interacciones con atención primaria.
Las diferencias raciales en el uso del asesoramiento del BRCA 1/2 son grandes y no parecen ser explicadas por los diferentes factores anteriormente citados. Estas diferencias deben ser tenidas en cuenta antes de desarrollar un asesoramiento de estas características.

Acceso al resumen del artículo en JAMA:
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/293/14/1729

Asistencia

Tamoxifeno y riesgo de esteatosis hepática no alcohólica:

Articulo publicado en BMJ 2205; 330: 932.

Artículo publicado por el grupo italiano del estudio del tamoxifeno. Los resultados de este estudio, en el que participaron 5.408 mujeres, muestran que el tamoxifeno se asocia al riesgo de padecer esteatosis hepática no alcohólica en mujeres con sobrepeso. No se observó ningún dato que sugiera la progresión a cirrosis en las mujeres afectadas.

Acceso al articulo completo en BMJ:
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/330/7497/932
Acceso al resumen del artículo en BMJ:
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/330/7497/932

Páginas web

Center for Devices and Radiological Health:

Información ofrecida por la FDA americana sobre la implementación de los estándares de calidad de la mamografía (Mammography Quality Standards Act of 1992 MQSA)

Acceso a página web:
http://www.fda.gov/cdrh/mammography/

Sociedad española de diagnóstico por imagen de la mama

Sección de mama de la Sociedad Española de Radiología Médica

Acceso página web:
http://www.sedim.es

Noticias PACMA
Sección de Programas de Prevención
Dirección General de Organización de las Prestaciones Sanitarias

Más información en:
pacma@princast.es

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS