

PAXLOVID® PARA LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)

A usted le han diagnosticado COVID-19 y le han recomendado tomar PAXLOVID®.

¿Qué debe saber mi profesional de medicina antes de recetar PAXLOVID®?

- **TODOS** los medicamentos que tomo: los de receta electrónica y los que compro en la farmacia sin receta, plantas medicinales, vitaminas y suplementos dietéticos. Paxlovid® **puede producir interacciones con la medicación que está tomando** y es importante revisarlas antes de su uso.
- Si tengo alguna alergia.
- Si tengo enfermedad hepática o renal o cualquier enfermedad grave.
- Si tomo anticonceptivos.
- Si estoy embarazada o planeo quedar embarazada; o en periodo de lactancia.

Cómo tomar Paxlovid®

Desayuno 	Comida	Cena 	Duración 
2 comprimidos rosa 1 comprimido blanco		2 comprimidos rosa 1 comprimido blanco	5 días

RECUERDE:

- Trague los comprimidos enteros. No mastique, rompa o triture los comprimidos.
- Si olvida una dosis dentro de las 8 horas posteriores a cuándo corresponde, debe tomarla lo antes posible. Si han pasado más de 8 horas, salte esa dosis. En ambas ocasiones continúe con la siguiente dosis en el horario habitual.
- No refrigerar ni congelar. Conservar a una temperatura menor de 25°C.

Posibles efectos secundarios:

- sentido del gusto alterado.
- diarrea, vómitos.
- dolor de cabeza.
- color amarillento de la piel (ictericia).

Si aparece algún efecto secundario comuníquelo a su profesional de medicina

Puede obtener más información sobre PAXLOVID® en:

- <https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/procedimiento-de-actuacion-ante-sospechas-de-caso-de-infeccion-por-el-nuevo-coronavirus-2019-ncov-en-asturias>