

CÁNCER EN ASTURIAS

2001-2004



CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN
SERVICIO DE SALUD POBLACIONAL

CÁNCER EN ASTURIAS

2001-2004

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN
SERVICIO DE SALUD POBLACIONAL

FICHA TÉCNICA

Promueve y Edita

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias

Distribuye

Dirección General de Salud Pública y Participación

Servicio de Salud Poblacional

Sección de Información Sanitaria

Realización del estudio

Marcial Vicente Argüelles Suárez

Laudina Rodríguez Suárez

Soledad Covadonga Sánchez González

María Luisa Redondo Cornejo

Susana González Huerta

Revisión

Rafael Cofiño Fernández

Imagen Portada

Claudia Argüelles Arias

Agradecimientos

A todas las personas que nos han facilitado los datos precisos para la realización de este trabajo.

Copias adicionales de este informe en versión electrónica pueden obtenerse gratuitamente a través de:

INFORSAN@asturias.org

<http://tematico.asturias.es/salud/plan/portada.php>

<http://tinyurl.com/5adq7h>

<http://tinyurl.com/yhr9js8>

Imprime

Gráficas SUMMA S.A.

Depósito Legal: AS.:728-10

Oviedo, 18 de Marzo de 2010

Dedicado a todas las personas que padecen o han padecido cáncer, a los familiares y amigos que los apoyan y a todos los profesionales que desde distintos ámbitos dedican su labor a esta enfermedad.

ÍNDICE

<u>- INTRODUCCIÓN.....</u>	<u>8</u>
<u>- METODOLOGÍA DE TRABAJO</u>	<u>9</u>
<i>Definición de caso de cáncer incidente.....</i>	<i>9</i>
<i>Fuentes y recogida de información.....</i>	<i>9</i>
<i>Codificación de la información.....</i>	<i>10</i>
<i>Depuración de la información.....</i>	<i>10</i>
<i>Análisis de los datos.....</i>	<i>11</i>
<u>- ANÁLISIS DEL PERÍODO 2001-2004.....</u>	<u>14</u>
<i>Datos generales de incidencia.....</i>	<i>14</i>
<i>Localizaciones tumorales más frecuentes según sexo.....</i>	<i>16</i>
<i>Tasas específicas por grupos de edad.....</i>	<i>18</i>
• <i>Tasas específicas por grupos de edad quinqueniales (2001-2004) y evolución de las mismas (1991-2004) de tumores de próstata y pulmón en los varones, cuerpo de útero en mujeres</i>	<i>19</i>
• <i>Tasas específicas por grupos de edad quinqueniales (2001-2004) y evolución de las mismas (1991-2004) de las localizaciones tumorales sometidas o susceptibles de ser sometidas a cribado.....</i>	<i>20</i>
<i>Localizaciones tumorales más frecuentes según sexo y grupo de edad.....</i>	<i>21</i>
<i>Evolución de las tasas de incidencia ajustadas a población europea de las localizaciones tumorales más frecuentes.....</i>	<i>25</i>
<i>Tendencias de las tasas de incidencia ajustadas a población europea.....</i>	<i>28</i>
<i>Incidencia de cáncer según Área de Salud y sexo.....</i>	<i>33</i>
<i>Relación entre mortalidad e incidencia.....</i>	<i>33</i>
<i>Indicadores de calidad del RTPA.....</i>	<i>36</i>

<u>.- BIBLIOGRAFÍA.....</u>	<u>37</u>
<u>.- TABLAS ESTADÍSTICAS.....</u>	<u>39</u>
<i>Indicadores resumen de la situación del cáncer en Asturias 2001-2004.....</i>	<i>41</i>
<i>Etiquetas usadas en las tablas con equivalencias CIE-10 y literal de tumores incluidos en cada rúbrica.....</i>	<i>42</i>
<i>Incidencia de cáncer según localización, edad, sexo y año.....</i>	<i>44</i>
• <i>Números absolutos.....</i>	<i>44</i>
• <i>Tasas específicas por 100.000.....</i>	<i>52</i>
• <i>Tasas ajustadas a población europea por 100.000.....</i>	<i>60</i>
<i>Media de casos y porcentaje medio de cambio de las tasas ajustadas a población europea según localización y sexo en el periodo 2001-2004.....</i>	<i>62</i>
<i>Riesgo de padecer un cáncer antes de los 75 años según localización, sexo y año.....</i>	<i>64</i>
<i>Incidencia de cáncer según localización, sexo, año y Área de Salud.....</i>	<i>66</i>
• <i>Números absolutos.....</i>	<i>66</i>
• <i>Tasas específicas por 100.000.....</i>	<i>82</i>
<i>Indicadores de calidad.....</i>	<i>98</i>
• <i>Porcentaje de casos con verificación microscópica, procedentes del Boletín Estadístico de Defunción y con otros diagnósticos, según localización, grupo de edad y sexo en el periodo 2001-2004.....</i>	<i>98</i>
• <i>Razones de mortalidad/incidencia, número de casos incidentes y número de defunciones por cáncer según localización y sexo en el periodo 2001-2004.....</i>	<i>102</i>

INTRODUCCIÓN

El Registro de Tumores del Principado de Asturias (*RTPA*) es un registro de base poblacional que depende actualmente de la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias.

Recoge y publica información acerca de la incidencia de casos de cáncer entre la población residente en el Principado de Asturias. Además colabora con grupos de investigación españoles y extranjeros y forma parte de la European Network of Cancer Registries (*ENCR*) y de la International Association of Cancer Registries (*IACR*)

Los datos del registro son incluidos desde hace unos años en la publicación “Cancer Incidence in Five Continents” de la International Agency for Research on Cancer (*IARC*), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este informe recoge la información básica sobre la incidencia de cáncer en nuestra región durante el periodo 2001-2004.

Está organizado en varios apartados:

1. En el primero se describe de forma breve la metodología de trabajo del *RTPA*, en lo que se refiere a recogida, depuración y análisis de los datos
2. En el segundo se resume la situación general del cáncer en Asturias durante el periodo estudiado y, en algunos indicadores seleccionados, también durante el periodo 1991-2004.
3. En el último apartado se recoge una serie detallada de tablas donde figuran:
 - las tablas explicativas de las rúbricas utilizadas en este informe.
 - un resumen de los principales indicadores de cáncer en Asturias.
 - la incidencia de cáncer en Asturias según edad, sexo, localización topográfica del tumor y Área de Salud ofreciendo número absoluto de casos, tasas específicas, tasas ajustadas por población europea, porcentaje medio de cambio de las tasas ajustadas a población europea para el periodo 2001-2004 y riesgo de sufrir un cáncer antes de los 75 años, por año de diagnóstico.
 - las tablas de los principales indicadores de calidad (porcentaje casos con verificación microscópica, procedentes del Boletín Estadístico de Defunción y con otras bases diagnósticas; razón de mortalidad/incidencia según localización y sexo) para el periodo 2001-2004.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

.- DEFINICIÓN DE CASO DE CÁNCER INCIDENTE

A efectos de esta publicación se considera como caso de cáncer incidente el diagnóstico de un tumor maligno de cualquier localización anatómica en una persona residente en Asturias, con las siguientes aclaraciones:

- no se incluyen los tumores de piel no melanoma
- en el Sistema Nervioso Central figuran también los tumores benignos y de comportamiento incierto
- en la vejiga urinaria se engloban también los tumores *in situ* y de comportamiento incierto

El *RTPA* además recoge los tumores *in situ* de la mama y del cérvix uterino, pero no se han analizado para esta publicación.

El *RTPA* no registra información de personas no residentes en Asturias que hayan sido diagnosticadas aquí.

.- FUENTES Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN:

Las fuentes primarias de información del *RTPA* son todos los hospitales públicos de Asturias, los dependientes de las Fundaciones sin ánimo de lucro de Jove y Arriondas así como el centro privado “Centro Médico de Asturias”.

En todos los hospitales, los datos informatizados de los Servicios de Anatomía Patológica y Hematología se extraen por informáticos del Área de Sistemas de Información de los Servicios Centrales del SESPA que los remiten al *RTPA* en el formato requerido. En el caso del “Centro Médico de Asturias” la información es suministrada directamente por Anatomía Patológica.

Además, los Registros Hospitalarios de Tumores del SESPA a través del Registro Hospitalario de Tumores Central (*RHTC*) actualmente dependiente de la Unidad de Atención al Cáncer del SESPA, aportan al *RTPA* información referida a pacientes diagnosticados y/o tratados de patología tumoral en los correspondientes hospitales.

El *RTPA* no recoge directamente información de los Servicios de Radioterapia, Oncología Médica, Radiodiagnóstico, de los programas de cribado ni de Atención Primaria, aunque la mayoría de estos casos se incluirían a través del *RHTC*.

Por otra parte, toda la información recopilada por el *RTPA* de la forma descrita se cruza en el Registro de Mortalidad del Principado de Asturias, dependiente también de la Dirección General de Salud Pública y Participación, recuperándose de esta manera información procedente de los Boletines Estadísticos de Defunción.

La historia clínica de los casos cuya única información disponible procede del Registro de Mortalidad se revisa en los Servicios de Archivos y Documentación Clínica de los distintos hospitales asturianos.

También se incorporan al registro, tras revisar la historia clínica, los casos de cáncer autoreportados por los miembros de la cohorte asturiana del estudio *EPIC* (*European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition*).

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de los diferentes indicadores del periodo 2001-2004 proceden de los Padrones Municipales de Habitantes de cada año, cuyos datos agrupados fueron facilitados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) en el marco del convenio *INE-Principado de Asturias*. Para los indicadores del periodo 1991-2000 se utilizaron las mismas poblaciones empleadas en el informe previo “Cáncer en Asturias 1991-2000”.

.- CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Toda la información recogida es codificada por personal del *RTPA* utilizando para ello, desde la incidencia del año 2001, la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología Tercera Edición de la OMS (*CIE-0-3*).

Para facilitar las comparaciones con otras publicaciones, la topografía también se codifica de acuerdo a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud Décima Revisión de la OMS (*CIE-10*), que es la que se utiliza en las tablas presentadas en este informe. En la tabla A.1 de la sección de *Tablas Estadísticas* de este informe se recoge la equivalencia de los códigos iniciales de *CIE-10* referidos a cáncer con el rótulo explicativo utilizado en este informe y la descripción original de los contenidos de cada epígrafe *CIE-10*. Es importante consultar esta tabla para asegurarse qué tumores están incluidos o no en cada rúbrica del informe.

Con respecto a la agrupación de códigos para el análisis, cabe señalar algunos cambios en este informe en comparación al del Cáncer en Asturias 1991-2000:

- el tumor maligno del timo (C37) se ha analizado conjuntamente con los tumores malignos del corazón, del mediastino y de la pleura (C38), que agrupamos bajo la denominación de “otros órganos torácicos” (en el informe previo aparecía englobado en la denominación “otras glándulas endocrinas”)
- la policitemia vera (D45), los Síndromes Mielodisplásicos (D46) y Otros trastornos hematológicos (D47) se incluyen en este informe porque en la *CIE-0-3* han pasado a ser considerados como de comportamiento maligno, mientras que en la *CIE-0-2* se les asignaba un comportamiento incierto.

Con respecto a la codificación de los tumores de vejiga urinaria, desde la incidencia del año 2001 se han seguido de forma sistemática las recomendaciones de la European Network of Cancer Registries (*ENCR*). Esto ha supuesto que tumores que anteriormente se codificaban como malignos, ahora puedan considerarse tumores “*in situ*” o de comportamiento incierto, por lo que en esta publicación se incluyen todos en el análisis.

.- DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La depuración de los datos incluye procedimientos informáticos de detección de incongruencias y duplicidades. En esta fase se utilizan algoritmos informáticos que permiten etiquetar un tumor como duplicado o múltiple primario. Para ello se usan las recomendaciones de la International Association of Cancer Registries (*IACR*) sobre tumores múltiples primarios.

Después se realiza un cruce de la información obtenida del periodo en estudio con la información del *RTPA* para todos los años anteriores, con el fin de detectar casos ya diagnosticados previamente y, por tanto, prevalentes.

Posteriormente es cuando se realiza el cruce con el Registro de Mortalidad, incorporándose al RTPA la información correspondiente a fecha y causa básica de defunción. Las historias clínicas de los nuevos casos que aparecen en este cruce se localizan y revisan en los correspondientes hospitales por personal del registro, añadiéndose esta información al mismo.

Aquellos fallecidos con cáncer que no se han podido documentar con otra fuente distinta del Registro de Mortalidad son incluidos como incidentes con fecha de diagnóstico igual a la fecha de fallecimiento y topografía la que aparece en el Boletín Estadístico de Defunción. Estos casos son los que están incluidos en este informe como casos *DCO* (*death certificate only*).

A continuación se realizan los controles de calidad de la base de datos. Para ello se utilizan programas del propio registro y, después, el *IARC-CHECK program versión 2.04*, programa informático elaborado por la International Agency for Research on Cancer (*IARC*) que chequea la validez y consistencia entre variables.

Resueltos los problemas detectados en el control de calidad se crea la base de datos definitiva para el año o años cuya incidencia se va a analizar.

.- ANÁLISIS DE LOS DATOS

La medida básica utilizada en este informe es la incidencia de cáncer bien como número absoluto de casos incidentes (*I*) o como tasa de incidencia (*T*).

Ya se ha comentado que para que un caso sea incidente en un año determinado debe ser diagnosticado en una persona residente en Asturias, debe tratarse de un proceso tumoral maligno, invasivo, nuevo, no recidiva de otro anterior (con las exclusiones y matizaciones ya señaladas anteriormente) y cuya fecha de inicio del proceso diagnóstico esté comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en cuestión.

La tasa cruda de incidencia (*Ti*) para un determinado año sería:

$$Ti = \frac{\sum_{i=1}^n I_i}{\sum_{i=1}^n P_i} \times 100000$$

donde *Ii* es el número de casos incidentes de cáncer en el grupo de edad *i* y *Pi* la población media asturiana calculada para ese año en ese grupo de edad *i*. En este informe esta tasa se presenta multiplicada por 100.000.

Calculando este indicador para cada sexo, grupo de edad, localización y Área de Salud se obtienen las denominadas tasas de incidencia específicas. Se calculan igual que la tasa cruda pero limitando *I* y *P* a los grupos en cuestión. Por ejemplo la tasa de incidencia específica en mujeres de 45-49 años es el cociente entre el número de casos incidentes de cáncer contabilizados entre mujeres de ese grupo de edad dividido por la población de mujeres asturianas de ese grupo de edad. Estas tasas también se presentan multiplicadas por 100.000.

Para realizar las comparaciones de tasas de incidencia con otros registros se han utilizado tasas de incidencia estandarizadas (*TIE*). Para ello se han utilizado los métodos de estandarización directa usando los 18 grupos de edad quinquenales (0-4, 5-9...85+) y utilizando como población estándar la denominada población europea o la mundial según el caso.

Para la mortalidad se ofrecen los mismos estadísticos (tasa de mortalidad y tasa de mortalidad ajustada por edad), que se han calculado para la incidencia, cambiando únicamente en la fórmula l_i por D_i siendo D_i el número de muertes debidas a cáncer en el grupo i de edad durante ese año.

El riesgo de padecer un cáncer antes de los 65 años se ha calculado como:

$$R = 1 - \exp(-LA)$$

Siendo IA la incidencia acumulada hasta los 65 años calculada con el siguiente estadístico:

$$IA = \sum_{i=1}^{13} Ti \times 5$$

Siendo Ti la tasa específica de incidencia en el grupo de edad i y efectuando el sumatorio en los 13 primeros grupos de edad quinquenales (último 60-64 años).

Para calcular el riesgo de padecer un cáncer antes de los 75 años se ha utilizado la misma fórmula anterior pero ampliando el sumatorio para el cálculo de la IA hasta el grupo de edad 15 (último grupo de edad 70-74).

Para la comparación de la incidencia entre Asturias y cada una de las Áreas de Salud se ha utilizado la razón de incidencia estandarizada (RIE) calculada como sigue:

$$RIE = \frac{\sum_{i=1}^n Oi}{\sum_{i=1}^n Ti \times PAi} \times 100$$

Siendo Oi el número de casos de cáncer observados en el grupo de edad i en una determinada Área de Salud, Ti la tasa específica de incidencia de cáncer en el grupo de edad i en Asturias y PAi la población en el grupo de edad i del Área de Salud en cuestión. Para el cálculo se utilizaron los 18 grupos de edad quinquenales (0-4, 5-9...85+).

El error estándar del RIE (EE) se ha calculado mediante la fórmula:

$$EE(RIE) = \sqrt{\frac{RIE}{\sum_{i=1}^n Oi}}$$

Para el cálculo de la variación media anual de las tasas se utilizaron modelos de regresión lineal utilizando como variable dependiente el logaritmo neperiano de las tasas estandarizadas de incidencia y como variable independiente el año calendario. El porcentaje de variación media ($\%V$) se obtuvo como:

$$\%V = 100 \times (\exp(\beta) - 1)$$

Siendo β la estimación de la pendiente en cada ecuación.

La confección de la base de datos y la mayor parte de la explotación estadística se realizó con SAS versión 8.02.


Para analizar la tendencia de las tasas ajustadas a la población europea durante el periodo 1991-2004 se utilizó el *Joinpoint Regression Program* del *National Cancer Institute de Estados Unidos* (versión 3.4.2- Octubre 2009) que, además de calcular el cambio porcentual medio anual de las tasas en un determinado periodo (especificando si es significativo o no), es capaz de detectar la presencia o no de puntos de cambio en la tasa durante dicho periodo y calcular el cambio porcentual medio anual de la misma antes y después de cada punto de cambio detectado.

ANÁLISIS DEL PERÍODO 2001-2004

.- DATOS GENERALES DE INCIDENCIA


Globalmente en el periodo 2001-2004, 23.453 personas residentes en nuestra región fueron diagnosticadas de un tumor maligno de cualquier localización (se exceptúan los tumores de piel no melanoma; se incluyen además todos los tumores del Sistema Nervioso Central independientemente de su comportamiento y los tumores de comportamiento incierto e "in situ" de la vejiga); correspondiendo el 61% de los casos a varones y el 39% a mujeres. La media anual de casos nuevos diagnosticados en este periodo fue de 5.863 (3.577 casos en varones y 2.286 en mujeres)

Durante el periodo 2001-2004 la tasa cruda de incidencia fue de 693,9 casos por 100.000 habitantes en varones y de 408,9 casos por 100.000 habitantes en mujeres. Esta tasa ha aumentado en Asturias en los últimos años, tanto en varones como en mujeres, pero especialmente en varones, como se aprecia en el siguiente gráfico:



A lo largo de los años 2001-2004 la tasa de incidencia ajustada a población europea para todas las localizaciones tumorales fue de 492,2 casos por 100.000 habitantes en varones y 262,6 casos por 100.000 habitantes en mujeres. Esta tasa también ha aumentado en Asturias en los últimos años, especialmente en los varones, como se aprecia en el siguiente gráfico:

Cáncer en Asturias 2001-2004



Si comparamos nuestros datos de 2004 con las estimaciones para España y Europa para el año 2006 vemos que nuestras tasas estandarizadas (521,5 casos por 100.000 habitantes) son más elevadas en los varones con respecto a España (416,9 casos por 100.000 habitantes) y Europa (439,7 casos por 100.000 habitantes), mientras que en las mujeres (267,2 casos por 100.000 habitantes) son un poco más elevadas que las estimadas para España (263,4 casos por 100.000 habitantes) y más bajas que las estimadas para Europa (303 casos por 100.000 habitantes)

Si nos comparamos con las cifras de otros registros españoles a través de la tasa de incidencia ajustada por población mundial que aparece en el volumen IX de la publicación "Cancer Incidence in Five Continents" de la IARC, vemos como nuestras tasas en varones en el periodo 2001-2004 (341,5 casos por 100.000 habitantes) son superiores y en mujeres (191,9 casos por 100.000 habitantes) estamos en una posición intermedia. Estas tasas han aumentado en nuestra región tanto en varones como en mujeres con respecto a nuestras propias cifras presentes en la citada publicación y correspondientes al periodo 1996-2000, como se ve en la siguiente tabla:

Registro	Periodo	Todas las localizaciones excepto piel no melanoma	
		T. incidencia ajustada pob. mundial	
		Varones	Mujeres
Cuenca	1998-2002	221.1	150.9
Gerona	1998-2002	335.9	207.2
Granada	1998-2002	255.0	175.4
Navarra	1998-2002	325.2	204.8
Asturias	1996-2000	320.7	181.2

.- LOCALIZACIONES TUMORALES MÁS FRECUENTES SEGÚN SEXO

Entre 2001 y 2004, los tumores malignos proporcionalmente más frecuentes, entre los varones residentes en Asturias fueron por este orden:

- Próstata: 18,2%
- Pulmón: 17,6%
- Colon y recto: 14,1%
- Vejiga: 9,9%
- Cabeza y cuello: 8,5%

Localizaciones tumorales con mayor número de casos en varones.
Asturias 2001-2004.

CIE10 Localización	Orden	Casos	%
C61 Próstata	1	2606	18.2
C33-34 Pulmón	2	2519	17.6
C18-21 Colon-recto	3	2019	14.1
C66-68 Vejiga*	4	1430	10.0
C00-14,30-32 Cabeza-cuello	5	1215	8.5
C16 Estómago	6	631	4.4
C80,26,39,48,76 Otros	7	578	4.0
C22 Hígado	8	444	3.1
C64-65 Riñón	9	435	3.0
C82-85,96 Otr.Linfomas	10	404	2.8

* incluye tanto los tumores malignos como los de comportamiento incierto e "in situ"

Si comparamos estos datos con los previos correspondientes al periodo 1991-2000, vemos que el cambio más importante en los últimos años ha sido que el cáncer de próstata ha pasado a ocupar el primer lugar por delante del de pulmón en varones.

Entre las mujeres residentes en Asturias, los tumores malignos proporcionalmente más frecuentes (excluidos los de origen desconocido y mal definidos) en el mismo periodo fueron por este orden:

- Mama: 24,9%
- Colon y recto: 14,4%
- Cuerpo de útero: 6,8%
- Estómago: 4,5%
- Pulmón: 4,1%
- Linfomas no Hodgkin: 4%
- Ovario: 4%

Localizaciones tumorales con mayor número de casos en mujeres.
Asturias 2001-2004.

CIE10 Localización		Orden	Casos	%
C50	Mama	1	2274	24.9
C18-21	Colon-recto	2	1317	14.4
C54-55	Cuerpo útero	3	622	6.8
C80,26,39,48,76	Otros	4	471	5.2
C16	Estómago	5	412	4.5
C33-34	Pulmón	6	377	4.1
C56	Ovario	7	367	4.0
C82-85,96	Otr.Linfomas	7	367	4.0
C66-68	Vejiga*	9	320	3.5
C70-72	S.N.Central**	10	311	3.4

* incluye tanto los tumores malignos como los de comportamiento incierto e “in situ”

** incluye tumores de cualquier comportamiento, también benignos





Al comparar estos datos con los previos correspondientes al periodo 1991-2000, destaca sobre todo el aumento de los casos de cáncer de pulmón entre las mujeres, que se ha convertido en más importante proporcionalmente que los Linfomas no Hodgkin y que el cáncer de ovario.

El descenso porcentual del cáncer de ovario y el ascenso porcentual del de cuerpo uterino con respecto al periodo 1991-2000 se podrían atribuir, en parte, a un cambio en el criterio de codificación que se sigue en la CIE-O-3 (Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología editada por la OMS) con respecto a la versión anterior.

.- TASAS ESPECÍFICAS POR GRUPOS DE EDAD







Globalmente en los varones durante 2001-2004 las tasas específicas aumentaron progresivamente con la edad, especialmente a partir de los 40 años, hasta los 80-84 años, descendiendo un poco en los mayores de 85 años. En el caso de las mujeres en el mismo periodo, las tasas específicas también aumentaron progresivamente con la edad, especialmente a partir de los 35 años e incluso entre las mayores de 85 años, pero de forma más suave que en los varones.

Acompañando las tasas específicas por grupos quinqueniales de edad, se muestra la evolución a lo largo del periodo 1991-2004 de dichas tasas pero para diferentes grupos de edad.











Cáncer en Asturias 2001-2004

..- TASAS ESPECÍFICAS POR GRUPOS DE EDAD QUINQUENALES (2001-2004) Y EVOLUCIÓN DE LAS MISMAS (1991-2004) DE TUMORES DE PRÓSTATA Y PULMÓN EN VARONES, CUERPO DE ÚTERO EN MUJERES.



Cáncer en Asturias 2001-2004

- TASAS ESPECÍFICAS POR GRUPOS DE EDAD QUINQUENALES (2001-2004) Y EVOLUCIÓN DE LAS MISMAS (1991-2004) DE LAS LOCALIZACIONES TUMORALES SOMETIDAS O SUSCEPTIBLES DE SER SOMETIDAS A CRIBADO



.- LOCALIZACIONES TUMORALES MÁS FRECUENTES SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD

En el grupo de edad de 0 a 14 años, las leucemias y los tumores del SNC siguen siendo los tumores más frecuentes tanto en niños como en niñas.

00-14 Años -- Varones. Asturias 2001-2004

CIE10	Localización	Orden	Casos	%
C91-95	Leucemias	1	9	25.0
C70-72	S.N.Central**	2	7	19.4
C82-85,96	Otr.Linfomas	3	5	13.9
C40-41	Hueso	4	4	11.1
C81	Linfoma Hodgkin	4	4	11.1

** incluye tumores de cualquier comportamiento, también benignos

00-14 Años -- Mujeres. Asturias 2001-2004

CIE10	Localización	Orden	Casos	%
C91-95	Leucemias	1	10	32.3
C70-72	S.N.Central**	2	6	19.4
C40-41	Hueso	3	4	12.9
C47,49	Tejidos blandos	4	3	9.7
C56	Ovario	5	2	6.5

** incluye tumores de cualquier comportamiento, también benignos

En los varones de 15 a 34 años los cinco tumores con más casos incidentes en este periodo son los mismos que en el periodo 1991-2000, aunque se ha modificado el orden, destacando el aumento porcentual de los de testículo que ocupan actualmente el primer lugar y el descenso de los Linfomas Hodgkin que han pasado al segundo lugar y, sobre todo, de los Linfomas no Hodgkin que ahora ocupan el quinto lugar.

En el caso de las mujeres del mismo grupo de edad las localizaciones más frecuentes siguen siendo mama, tiroides y Linfomas Hodgkin, el SNC ha descendido al quinto lugar y ha subido al cuarto lugar el melanoma que no aparecía en esta lista en el periodo 1991-2000.

15-34 Años -- Varones. Asturias 2001-2004

CIE10 Localización		Orden	Casos	%
C62	Testículo	1	56	22.1
C81	Linfoma Hodgkin	2	30	11.9
C70-72	S.N.Central**	3	25	9.9
C91-95	Leucemias	4	23	9.1
C82-85,96	Otr.Linfomas	5	20	7.9

** incluye tumores de cualquier comportamiento, también benignos

15-34 Años -- Mujeres. Asturias 2001-2004

CIE10 Localización		Orden	Casos	%
C50	Mama	1	61	22.4
C73	Tiroides	2	37	13.6
C81	Linfoma Hodgkin	3	28	10.3
C43	Melanoma	4	18	6.6
C70-72	S.N.Central**	4	18	6.6

** incluye tumores de cualquier comportamiento, también benignos

Entre los varones de 35 a 64 años, los tumores malignos de pulmón y de cabeza-cuello siguen siendo los más frecuentes, siendo el cambio más importante en el periodo 2001-2004 el ascenso del cáncer de próstata a la tercera posición, desplazando a los de colon-recto y vejiga al cuarto y quinto puesto respectivamente.

En el caso de las mujeres de este grupo de edad los cuatro primeros lugares siguen ocupados por mama, colon-recto, cuerpo de útero y ovario, habiendo cambiado sólo el quinto lugar que ocupa ahora el cáncer de pulmón en detrimento del de cérvix uterino.

35-64 Años -- Varones. Asturias 2001-2004

CIE10 Localización		Orden	Casos	%
C33-34	Pulmón	1	865	19.5
C00-14,30-32	Cabeza-cuello	2	634	14.3
C61	Próstata	3	521	11.7
C18-21	Colon-recto	4	496	11.2
C66-68	Vejiga*	5	380	8.5

* incluye tanto los tumores malignos como los de comportamiento incierto e "in situ"

35-64 Años -- Mujeres. Asturias 2001-2004

CIE10 Localización		Orden	Casos	%
C50	Mama	1	1219	37.3
C18-21	Colon-recto	2	328	10.0
C54-55	Cuerpo útero	3	257	7.9
C56	Ovario	4	167	5.1
C33-34	Pulmón	5	153	4.7

Entre los varones de 65-74 años el principal cambio ocurrido en el periodo estudiado es el incremento del cáncer de próstata que ha desplazado del primer lugar al cáncer de pulmón pasando a ocupar éste el segundo lugar.

En cuanto a las mujeres de este grupo de edad, los tumores de mama, colon-recto y cuerpo uterino siguen siendo los más frecuentes y ya no aparece el cáncer de estómago entre los cinco primeros habiendo sido sustituido por los Linfomas no Hodgkin.

65-74 Años -- Varones. Asturias 2001-2004

CIE10 Localización		Orden	Casos	%
C61	Próstata	1	1158	23.8
C33-34	Pulmón	2	852	17.5
C18-21	Colon-recto	3	763	15.7
C66-68	Vejiga*	4	433	8.9
C00-14,30-32	Cabeza-cuello	5	336	6.9

* incluye tanto los tumores malignos como los de comportamiento incierto e "in situ"

65-74 Años -- Mujeres. Asturias 2001-2004

CIE10 Localización		Orden	Casos	%
C50	Mama	1	467	21.3
C18-21	Colon-recto	2	353	16.1
C54-55	Cuerpo útero	3	196	8.9
C82-85,96	Otr.Linfomas	4	106	4.8
C80,26,39,48,76	Otros	5	105	4.8

Entre los varones de mayor edad (≥ 75 años) no hubo cambios con respecto al periodo 1991-2000: próstata, pulmón, colon-recto, vejiga y el grupo de otros (origen desconocido y mal definidos) siguen siendo, por este orden, las localizaciones más frecuentes.

En el caso de las mujeres de este grupo de edad, los de colon-recto, mama, de origen desconocido y mal definidos y los de estómago siguen ocupando los primeros lugares por este orden. La única diferencia con respecto a 1991-2000 es que en quinto lugar aparece el de cuerpo de útero en lugar del tumor maligno de páncreas.

75+ Años -- Varones. Asturias 2001-2004



CIE10 Localización		Orden	Casos	%
C61	Próstata	1	927	19.8
C33-34	Pulmón	2	793	16.9
C18-21	Colon-recto	3	751	16.0
C66-68	Vejiga*	4	598	12.8
C80,26,39,48,76	Otros	5	249	5.3

* incluye tanto los tumores malignos como los de comportamiento incierto e "in situ"


75+ Años -- Mujeres. Asturias 2001-2004

CIE10 Localización		Orden	Casos	%
C18-21	Colon-recto	1	624	18.5
C50	Mama	2	526	15.6
C80,26,39,48,76	Otros	3	279	8.3
C16	Estómago	4	255	7.6
C54-55	Cuerpo útero	5	162	4.8


- EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INCIDENCIA AJUSTADAS A POBLACIÓN EUROPEA DE LAS LOCALIZACIONES TUMORALES MÁS FRECUENTES



Cáncer en Asturias 2001-2004



Cáncer en Asturias 2001-2004



.- TENDENCIAS DE LAS TASAS DE INCIDENCIA AJUSTADAS A POBLACIÓN EUROPEA


Las tasas de incidencia ajustadas a la población europea para todas las localizaciones analizadas en este informe aumentaron anualmente desde 2001 a 2004 un 1,6% en varones y disminuyeron anualmente un 0,4% en mujeres, en ambos casos de forma no significativa.

Las localizaciones tumorales más frecuentes cuyas tasas de incidencia ajustadas a población europea experimentaron durante el periodo 2001-2004 un cambio medio anual significativo fueron: en varones la próstata que aumentó un 9,1% anual ($IC_{95\%}$: 4 - 14,6%) y en mujeres los Linfomas no Hodgkin que aumentaron un 15,5% al año ($IC_{95\%}$: 7,7 – 23,9%).


Para poder apreciar las tendencias de un periodo más largo analizamos conjuntamente los datos de nuestro registro desde 1991 a 2004 mediante el *Joinpoint Regression Program* del National Cancer Institute de Estados Unidos (*versión 3.4.2*).

Así vemos como estas tasas de incidencia ajustadas por población europea para todas las localizaciones han aumentado de media un 1,6 % al año en varones ($IC_{95\%}$: 0,9 - 2,2%) y un 1% al año en mujeres ($IC_{95\%}$: 0,7 - 1,4%), cambios que son en ambos casos significativos.

Tendencia de las tasas de incidencia ajustadas a población europea.
Todas las localizaciones (C00-D47). Varones. Asturias 1991-2004




Tendencia de las tasas de incidencia ajustadas a población europea.
Todas las localizaciones (C00-47). Mujeres. Asturias 1991-2004



Para el cáncer de próstata las tasas de incidencia ajustadas a población europea han experimentado desde 1991 a 2004 un aumento significativo pudiendo establecerse un punto de cambio en el año 1996 (IC_{95%}: 1995-1998), de tal manera que antes de este momento las tasas han sufrido un cambio medio anual del 23,5% (IC_{95%}: 16,7 – 30,6%), mientras que después del mismo el aumento fue del 3,4% anual (IC_{95%}: 0,6 – 6,3%).


Tendencia de las tasas de incidencia ajustadas a población europea.
Próstata (C61).Varones. Asturias 1991-2004




Cáncer en Asturias 2001-2004

Las tasas de incidencia ajustadas por población europea del cáncer de pulmón en varones han sufrido desde 1991 a 2004 una disminución media anual significativa del 0,9 % ($IC_{95\%}$: (-1,7) - (-0,1)%). Por el contrario, en las mujeres las tasas de incidencia ajustadas por población europea del cáncer de pulmón han experimentado en el mismo periodo un incremento medio significativo del 5,6 % anual ($IC_{95\%}$: 3,6 – 7,6%)

Tendencia de las tasas de incidencia ajustadas a población europea. Cáncer de Pulmón (C33-34). Varones. Asturias 1991-2004




Tendencia de las tasas de incidencia ajustadas a población europea. Cáncer de Pulmón (C33-34). Mujeres. Asturias 1991-2004




Cáncer en Asturias 2001-2004

Con respecto al cáncer de colon y recto las tasas de incidencia ajustadas a población europea han experimentado desde 1991 a 2004 un incremento medio anual del 3,1 % en varones (IC_{95%}: 2,3 –3,9%) y del 1,6% en mujeres (IC_{95%}: 0,3 – 2,9%), ambos significativos.

Tendencia de las tasas de incidencia ajustadas a población europea. Cáncer de Colon-recto (C18-21). Varones. Asturias 1991-2004




Tendencia de las tasas de incidencia ajustadas a población europea. Cáncer de Colon-recto (C18-21). Mujeres. Asturias 1991-2004



Cáncer en Asturias 2001-2004


Para el cáncer de mama en la mujer, las tasas de incidencia ajustadas por población europea han aumentado de forma significativa un 1,8% de media anual durante el periodo 1991-2004 (IC_{95%}: 1 – 2,5%)

Tendencia de las tasas de incidencia ajustadas a población europea. Cáncer de Mama (C50). Mujeres. Asturias 1991-2004



Con respecto al cáncer de cuerpo uterino las tasas de incidencia ajustadas por población europea han experimentado un aumento medio anual del 1,6% durante el periodo 1991-2004 (IC_{95%}: (-0,1) – 3,4%), pero que no es significativo. Sin embargo, este incremento se hace significativo si analizamos sólo los datos de los últimos 10 años disponibles (1995-2004) y se transforma en un descenso no significativo si tenemos en cuenta los datos de 2001-2004. Por tanto, en esta localización, habrá que esperar a tener el número de casos incidentes de años posteriores para ver qué tendencia se consolida.

Tendencia de las tasas de incidencia ajustadas a población europea. Cáncer de Cuerpo útero (C54-55).Mujeres. Asturias 1991- 2004



.- INCIDENCIA DE CÁNCER SEGÚN ÁREA DE SALUD Y SEXO

En el caso de los varones, las Áreas de Salud que durante el periodo 2001-2004 tienen una incidencia global de cáncer mayor que la del total de Asturias son el Área IV (+7%), el Área III (+6%) y el Área II (+5%). Las que tienen menor incidencia global son el Área I (-13%), Área VI (- 9%) y Área V (- 6%). Las Áreas VII y VIII tienen una incidencia global de cáncer semejante a la del total de Asturias.

Para las mujeres, las Áreas de Salud que durante el periodo 2001-2004 tienen una incidencia global de cáncer mayor que la del total de Asturias son el Área IV (+5%) y el Área VIII (+4%). Las que tienen menor incidencia global son el Área I (-12%), Área VI (-5%) y Área III (- 4%). Las Áreas II, V y VII tienen una incidencia global de cáncer semejante a la del total de Asturias.

.- RELACIÓN ENTRE MORTALIDAD E INCIDENCIA

En el mismo periodo fallecieron a consecuencia de los mismos tumores analizados en este informe 13.132 personas residentes en Asturias, de las que el 63% eran varones y el 37% mujeres. En este periodo, la media anual de personas fallecidas por cáncer fue de 3.283 personas (2.072 varones y 1.211 mujeres).

En el periodo 2001-2004, la razón mortalidad/incidencia por cáncer fue de 0,56 (0,58 en varones y 0,53 en mujeres).

Si analizamos la razón mortalidad/incidencia según las distintas localizaciones tumorales, vemos como entre los varones, las que alcanzan un valor igual o superior a 1, es decir, aquellas en las que el número de fallecidos es igual o superior al de nuevos casos diagnosticados en el periodo 2001-2004 son, por este orden: los Síndromes Mieloproliferativos (enfermedades inmunoproliferativas malignas), los tumores de otros órganos torácicos (timo, corazón, mediastino y pleura), tumores de páncreas, esófago y la policitemia vera. Los tumores de hígado, que en el periodo 1991-2000 tenían esta razón en 1,03, ahora la tienen en 0,86.

Para las mujeres, las localizaciones tumorales con una razón mortalidad/incidencia igual o superior a 1 en 2001-2004 son, por este orden: los tumores de otros órganos torácicos (timo, corazón, mediastino y pleura), la policitemia vera, los Síndromes Mielodisplásicos, tumores de páncreas, de otras glándulas endocrinas (glándula suprarrenal, paratiroides, hipófisis, conducto craneofaríngeo, glándula pineal, cuerpo carotídeo, cuerpo aórtico) y de esófago. . Los tumores de hígado, que en el periodo 1991-2000 tenían esta razón en 1,39, ahora la tienen en 0,87. Los mesoteliomas que antes tenían una razón de incidencia/mortalidad de 1,11, ahora la tienen en 0,70.


En el periodo 2001-2004, los tumores más frecuentes en los varones residentes en Asturias (próstata, pulmón y colon-recto) tienen una razón mortalidad/incidencia de 0,29, 0,91 y 0,50 respectivamente. Estos indicadores han disminuido, especialmente el del cáncer de próstata, con respecto a los del periodo 1991-2000 que eran 0,46, 0,96 y 0,55, respectivamente.

En el periodo 2001-2004, los tumores más frecuentes en las mujeres residentes en Asturias (mama, colon-recto y cuerpo uterino) tienen una razón mortalidad/incidencia de 0,34, 0,52 y 0,34, respectivamente. Estos indicadores han disminuido algo con respecto a los del periodo 1991-2000 que eran 0,37, 0,59 y 0,36, respectivamente.

Cáncer en Asturias 2001-2004

Los tumores que causaron un mayor número de fallecidos entre los varones residentes en Asturias en el periodo 1991-2004 aparecen en la siguiente tabla y gráfico:


CIE10 Localización	nº casos incidentes	media anual de casos incidentes	nº defunciones	media anual de defunciones
C33-34 Pulmón	8376	598	7917	566
C18-21 Colon y recto	5697	407	3027	216
C61 Próstata	6728	481	2606	186
C16 Estómago	2340	167	1747	125
C66-68 Vejiga	4594	328	1413	101



Cáncer en Asturias 2001-2004

Los tumores que causaron un mayor número de fallecidas entre las mujeres residentes en Asturias en el periodo 1991-2004 aparecen en la siguiente tabla y gráfico:

CIE10 Localización	nº casos incidentes	media anual de casos incidentes	nº defunciones	media anual de defunciones
C50 Mama	7266	519	2639	189
C18-21 Colon y recto	3950	282	2227	159
C16 Estómago	1543	110	1226	88
C25 Páncreas	810	58	933	67
C33-34 Pulmón	1013	72	882	63



.- INDICADORES DE CALIDAD DEL RTPA

Globalmente, el 90,7% de los nuevos diagnósticos tumorales realizados durante 2001-2004 en los varones residentes en Asturias se hicieron por verificación microscópica (biopsias, citologías, punciones, hematologías y necropsias), el 2,7% sólo por el Boletín Estadístico de Defunción (*DCO*) y el 6,6% por otras técnicas diagnósticas (técnicas de imagen, clínica, analítica, etc). A medida que aumenta la edad al diagnóstico, se aprecia como disminuye el porcentaje de diagnósticos realizados por verificación microscópica. A su vez, el porcentaje de diagnósticos realizados sólo por Boletín Estadístico de Defunción (*DCO*) y por otras técnicas diagnósticas es mayor en los grupos de más edad, especialmente entre los varones de 85 y más años donde alcanza el 13,3% y el 21,8%, respectivamente.

En el caso de las mujeres residentes en Asturias, globalmente, el 89,2% de los nuevos diagnósticos tumorales realizados durante 2001-2004 se hicieron por verificación microscópica, el 3,2% sólo por Boletín Estadístico de Defunción (*DCO*) y el 7,6% por otras técnicas diagnósticas. También en ellas, a medida que aumenta la edad, se aprecia como disminuye el porcentaje de diagnósticos realizados por verificación microscópica y como aumenta el porcentaje de los realizados sólo por Boletín Estadístico de Defunción (*DCO*) y por otras técnicas diagnósticas, especialmente entre las mujeres de 85 y más años (14,3% y el 24,3%, respectivamente).

Analizando localización por localización es de destacar en varones el bajo porcentaje de verificación microscópica y el alto porcentaje de otras técnicas utilizadas para el diagnóstico de los tumores de páncreas e hígado; los tumores de otras glándulas endocrinas destacan por ser diagnosticados en un 11,1% de los casos sólo por el Boletín Estadístico de Defunción (*DCO*).

En el caso de las mujeres, también destaca el bajo porcentaje de verificación microscópica y el alto porcentaje de otras técnicas utilizadas para el diagnóstico de los tumores de páncreas e hígado, pero en este caso, los Síndromes Mielodisplásicos y la policitemia vera son los más frecuentemente diagnosticados sólo por el Boletín Estadístico de Defunción (*DCO*) (27,8% y 25%, respectivamente).

Tanto en varones como en mujeres, el porcentaje de diagnósticos con verificación microscópica ha aumentado y el de diagnosticados sólo por *DCO* ha disminuido en el periodo 2001-2004 con respecto a los datos previos de 1991-2000.

Otro indicador útil para evaluar la calidad del RTPA es el porcentaje de tumores cuya localización primaria es desconocida o viene mal definida (Epígrafe “Otros”), que sería de desear fuera lo más bajo posible. Durante 2001-2004, el 4% de todos los tumores en varones y el 5,2% de todos los tumores en mujeres, se clasificaron en esta categoría. Estos porcentajes son inferiores a los obtenidos en el informe previo de 1991-2000 (5,7% y 6,2%, respectivamente).

BIBLIOGRAFÍA

Argüelles MV, Losada A, Alonso de la Torre R, Redondo ML, Quirós JR. "Cáncer en Asturias 1991-2000". Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias. Oviedo 2006

Fritz A, Percy C, Jack A, Shanmugaratnam K, Sabin L, Parkin DM, Whelan S, eds. "*International Classification of Diseases for Oncology, Third edition*". World Health Organization. Geneva 2000

Pheby D, Martínez C, Roumagnac M, Schouten L. "Recommendations for coding bladder tumours". European Network of Cancer Registries (ENCR) 1995 (<http://www.encri.com.fr/>)

Ferlay J, Burkhard C, Whelan S, Parkin DM. "Check and Conversion Programs for Cancer Registries (IARC/IACR Tools for Cancer Registries). IARC Technical Reports No.42". International Agency for Research on Cancer (WHO) & International Association of Cancer Registries. Lyon 2005.

Breslow NE, Day NE. "Statistical Method in Cancer Research: Volume II – The Design and Analysis of Cohort Studies. IARC Scientific Publications No.82". International Agency for Research on Cancer (WHO). Lyon 1987.

Esteve J, Benhamou E, Raymond L. "Statistical Methods in Cancer Research Volume IV. Descriptive Epidemiology. IARC Scientific Publications No.128" International Agency for Research on Cancer (WHO). Lyon 1994.

Kim HJ, Fay MP, Feuer EJ, Midthune DN. "Permutation tests for joinpoint regression with applications to cancer rates". Stat Med 2000 Feb 15; 19(3): 335-51. [Erratum in: Stat Med 2001 Feb 28; 20(4): 655]

Jensen OM, Parkin DM, MacLennan R, Muir CS, Skeet RG, eds. *Cancer Registration: Principles and Methods*. IARC Scientific Publication No.95". International Agency for Research on Cancer (WHO). Lyon 1991.

Ferlay RJ, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. "Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006". Ann Oncol March 2007; 18 (3): 581-92

Curado MP, Edwards B, Shin HR, Storm H, Ferlay J, Heanue M and Boyle P, eds . "Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX. IARC Scientific Publications No. 160". International Agency for Research on Cancer (WHO). Lyon 2007 (printed in 2009)

TABLAS ESTADÍSTICAS

| TABLA A.0. Indicadores resumen de la situación del cáncer en Asturias 2001-2004.

Indicadores de cáncer	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
Varones	Casos incidentes	14309	3544	3404	3497
	Tasa cruda incidencia	693.90	686.90	660.76	677.79
	Riesgo 0-64 años	0.17	0.17	0.17	0.17
	Riesgo 0-74 años	0.33	0.33	0.32	0.33
	Tasa inc. ajustada europea	492.16	496.67	473.18	478.49
	Tasa inc. ajustada mundial	341.52	344.11	328.96	332.43
	Fallecidos por cáncer	8289	2071	1999	2095
	Tasa cruda mortalidad	401.97	401.40	388.03	406.05
	Tasa mort. ajustada europea	269.89	276.03	262.55	270.55
	Tasa mort. ajustada mundial	177.31	180.28	172.73	178.31
Mujeres	Casos incidentes	9144	2303	2244	2236
	Tasa cruda incidencia	408.88	411.70	401.57	399.69
	Riesgo 0-64 años	0.12	0.12	0.12	0.12
	Riesgo 0-74 años	0.19	0.19	0.19	0.18
	Tasa inc. ajustada europea	262.63	267.53	262.23	253.93
	Tasa inc. ajustada mundial	191.89	195.40	190.98	184.29
	Fallecidos por cáncer	4843	1218	1165	1234
	Tasa cruda mortalidad	216.56	217.74	208.48	220.58
	Tasa mort. ajustada europea	110.32	113.40	105.66	112.78
	Tasa mort. ajustada mundial	73.73	75.30	70.77	75.52

(0104=Periodo 2001-2004)

TABLA A.1. Etiqueta que aparece en las tablas del informe, código CIE-10 y literal explicativo de los tumores incluidos en cada rúbrica.

Informe		CIE-10	Literal
C00	Labio	C00	Tumor maligno del labio.
C01-02	Lengua	C01	Tumor maligno de la base de la lengua.
		C02	Tumor maligno de otras partes y no especificadas de la lengua.
C03-06	Boca	C03	Tumor maligno de la encía.
		C04	Tumor maligno del piso de la boca.
		C05	Tumor maligno del paladar
		C06	Tumor maligno de otras partes y no especificadas de la boca.
C07-08	Gl.salivales	C07	Tumor maligno de la glándula parótida.
		C08	Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas.
C09-14	Faringe	C09	Tumor maligno de la amígdala.
		C10	Tumor maligno de la orofaringe.
		C11	Tumor maligno de la nasofaringe.
		C12	Tumor maligno del seno piriforme.
		C13	Tumor maligno de la hipofaringe.
		C14	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de labio cavidad bucal y faringe.
C15	Esófago	C15	Tumor maligno del esófago.
C16	Estómago	C16	Tumor maligno del estómago.
C17	Intestino delgado	C17	Tumor maligno del intestino delgado.
C18	Colon		Tumor maligno del colon.
C19-21	Recto	C19	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea.
		C20	Tumor maligno del recto.
		C21	Tumor maligno del ano y del conducto anal.
C22	Hígado	C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas.
C23-24	Vesícula biliar	C23	Tumor maligno de la vesícula biliar.
		C24	Tumor maligno de otras partes y no especificadas de las vías biliares.
C25	Páncreas	C25	Tumor maligno del páncreas.
C30-31	Nariz,senos	C30	Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio.
		C31	Tumor maligno de los senos paranasales.
C32	Laringe	C32	Tumor maligno de la laringe.
C33-34	Pulmón	C33	Tumor maligno de la tráquea.
		C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón.
C37-38	Otr. Org. torácicos	C37	Tumor maligno del timo
		C38	Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura
C40-41	Hueso	C40	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros
		C41	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de otros sitios y de los no especificados.
C43	Melanoma	C43	Melanoma maligno de la piel
C45	Mesotelioma	C45	Mesotelioma
C46	S. Kaposi	C46	Sarcoma de Kaposi
C47,49	Tejidos blandos	C47	Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo.
		C49	Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos.
C50	Mama	C50	Tumor maligno de la mama.

TABLA A.1 (cont.). Etiqueta que aparece en las tablas del informe, código CIE-10 y literal explicativo de los tumores incluidos en cada rúbrica.

Informe		CIE-10	Literal
C51-52,57	Otr.genit.fem.	C51 C52 C57	Tumor maligno de la vulva. Tumor maligno de la vagina. Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y los no especificados.
C53	Cervix	C53	Tumor maligno del cuello del útero.
C54-55	Cuerpo útero	C54 C55	Tumor maligno del cuerpo del útero. Tumor maligno del útero, parte no especificada.
C56	Ovario	C56	Tumor maligno del ovario.
C58	Placenta	C58	Tumor maligno de la placenta.
C60,63	Otr.genit.mas.	C60 C63	Tumor maligno del pene. Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados.
C61	Próstata	C61	Tumor maligno de la próstata.
C62	Testículo	C62	Tumor maligno del testículo.
C64-65	Riñón	C64 C65	Tumor maligno de riñón excepto de la pelvis renal. Tumor maligno de la pelvis renal.
C66-68	Vejiga*	C66 C67 C68 D09 D41	Tumor maligno del uréter. Tumor maligno de la vejiga urinaria. Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados. Tumor <i>in situ</i> de la vejiga urinaria. Tumor de comportamiento incierto de la vejiga urinaria.
C69	Ojo	C69	Tumor maligno de ojo y sus anexos.
C70-72	S.N.Central**	C70 C71 C72 D32 D33 D42 D43	Tumor maligno de las meninges. Tumor maligno del encéfalo Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central. Tumores benignos de las meninges. Tumores benignos de encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges. Tumores de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y otras partes del sistema nervioso central.
C73		C73	Tumor maligno de la glándula tiroides.
C74-75		C74 C75	Tumor maligno de la glándula suprarrenal. Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y estructuras afines.
C81	Linfoma Hodgkin	C81	Enfermedad de Hodgkin,
C82-85,C96	Otr.Linfomas	C82 C83 C84 C85 C96	Linfoma no Hodgkin folicular(nodular). Linfoma no Hodgkin difuso. Linfoma de células T periférico y cutáneo. Linfoma no Hodgkin de otro tipo y no especificado. Otros tumores malignos y no especificados del tejido linfático, los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines.
C88	S.Mieloproliferat.	C88	Enfermedades inmunoproliferativas malignas.
C90	Mieloma múltiple	C90	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas.
C91-95	Leucemias	C91 C92 C93 C94 C95	Leucemia linfoides. Leucemia mieloide. Leucemia monocítica. Otras leucemias de tipo celular especificado. Leucemias de tipo celular no especificado.
C80,C26,C39,C48,C76	Otros	C26 C39 C48 C76 C80	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos. Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo. Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos. Tumor maligno de sitios no especificados.
D45	Policitemia vera	D45	Policitemia vera
D46	S.Mielodisplásicos	D46	Síndromes mielodisplásicos
D47	Otr.t.hematológicos	D47	Otros trastornos hematológicos

* Incluye tanto los tumores malignos como los de comportamiento incierto e "in situ"

** Incluye tanto tumores malignos como benignos y de comportamiento incierto

TABLA A.2. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones.
Asturias 2001. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		
	00-04	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total	
C00-D47 Todas local.	4	6	9	12	13	25	26	85	145	228	301	325	584	669	566	333	211	3544	
C00 Labio	1	2	2	3	3	1	1	12	
C01-02 Lengua	2	3	5	6	5	9	4	4	1	.	39	
C03-06 Boca	3	3	8	6	4	1	1	7	1	1	35	
C07-08 Gl.salivales	1	.	1	.	.	1	2	1	1	.	7	
C09-14 Faringe	1	5	7	14	9	11	9	3	7	3	1	70	
C15 Esófago	6	7	7	8	8	19	3	4	3	65	
C16 Estómago	1	.	4	4	9	15	17	28	22	28	18	15	161	
C17 Intestino delgado	1	1	2	1	2	.	1	8	
C18 Colon	1	1	1	14	15	24	11	53	72	58	40	29	319		
C19-21 Recto	2	.	3	8	8	17	17	38	40	30	15	8	186		
C22 Hígado	2	6	4	12	12	23	27	17	14	3	120		
C23-24 Vesícula biliar	2	1	.	1	4	2	.	3	2	15		
C25 Páncreas	6	4	4	8	7	10	10	8	4	5	66		
C30-31 Nariz,senos	1	6	1	.	.	.	8		
C32 Laringe	1	8	4	17	20	20	14	9	15	4	2	114		
C33-34 Pulmón	.	.	.	1	2	4	16	32	42	63	73	110	121	92	59	34	649		
C37-38 Otr.org.torácicos	1	.	.	.	1	2		
C40-41 Hueso	1	.	2	.	.	.	1	.	1	1	.	2	8		
C43 Melanoma	4	1	2	5	5	2	4	6	2	1	2	35		
C45 Mesotelioma	1	.	.	1	.	1	.	1	2	1	1	8		
C46 S. Kaposi	1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	4		
C47,49 Tejidos blandos	1	1	4	.	1	2	2	3	.	1	1	16		
C50 Mama	1	2	.	2	2	1	.	9		
C60,63 Otr.genit.mas.	3	1	.	1	1	3	2	.	11	
C61 Próstata	1	1	2	15	28	63	123	133	121	48	38	573		
C62 Testículo	1	.	3	5	6	3	1	1	.	.	1	21		
C64-65 Riñón	1	2	7	14	7	9	13	20	14	9	2	98		
C66-68 Vejiga*	.	.	2	.	1	2	6	5	17	31	23	58	71	76	43	27	362		
C69 Ojo	1	1	.	.	1	1	1	.	5		
C70-72 S.N.Central**	2	2	2	2	1	.	3	7	3	5	5	15	13	6	7	.	73		
C73 Tiroides	.	.	.	1	1	.	1	.	.	1	.	2	1	3	2	1	13		
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	.	.	.	1	1	3		
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	1	.	1	4	6	13	10	11	15	31	22	18	17	149		
C81 Linfoma Hodgkin	2	2	3	.	1	2	2	1	.	1	.	.	2	.	.	.	16		
C82-85,96 Otr.Linfomas	1	3	.	2	4	2	7	11	9	9	7	8	15	15	11	5	110		
C90 Mieloma múltiple	2	1	.	.	5	1	2	5	9	7	6	2	40		
C91-95 Leucemias	1	.	2	.	1	2	.	4	4	4	5	7	9	14	14	8	6	81	
D45 Policitemia vera	1	1		
D46 Sindr. mielodisplásicos	1	.	3	5	2	3	.	14		
D47 Otr.tr.hematológicos	1	.	3	.	3	5	2	1	3	18		

TABLA A.3. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres.
Asturias 2001. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		
	00-04	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total	
C00-D47 Todas local.	5	6	7	11	14	31	61	97	133	171	162	176	265	307	352	247	258	2303	
C00 Labio	1	2	1	1	.	.	5	
C01-02 Lengua	1	1	2	2	2	.	2	10	
C03-06 Boca	1	.	2	.	1	1	1	1	1	2	9	
C07-08 Gl.salivales	1	2	.	.	3	
C09-14 Faringe	1	.	.	3	1	.	.	1	1	.	1	.	8	
C15 Esófago	1	2	1	1	2	2	1	10	
C16 Estómago	1	2	4	2	1	11	12	19	23	23	98	
C17 Intestino delgado	2	.	3	2	1	1	1	9	
C18 Colon	.	.	1	.	1	.	3	3	9	12	18	18	32	50	38	43	228		
C19-21 Recto	1	2	4	3	2	3	8	13	21	9	10	76		
C22 Hígado	.	.	.	1	1	.	2	.	2	1	2	2	8	8	7	4	38		
C23-24 Vesícula biliar	3	3	6	4	1	17		
C25 Páncreas	.	.	.	1	.	.	1	1	4	3	2	4	7	5	11	11	50		
C30-31 Nariz,senos	1	.	.	.	1	1	.	3	
C32 Laringe	1	.	.	1	1	1	.	4		
C33-34 Pulmón	.	.	.	1	1	1	5	4	5	7	10	13	15	8	7	13	90		
C40-41 Hueso	1	2	.	.	3	2	.	.	.	1	9	
C43 Melanoma	.	1	.	1	.	1	4	1	2	7	3	3	7	8	8	6	6	58	
C45 Mesotelioma	1	.	.	.	1	2		
C46 S. Kaposi	1	1	.	2		
C47,49 Tejidos blandos	1	1	.	.	1	1	.	4	.	2	4	4	18		
C50 Mama	.	.	1	1	9	29	43	66	73	61	56	79	57	53	33	32	593		
C51-52,57 Otr.genit.fem.	3	1	1	1	1	1	2	3	3	4	4	5	28	
C53 Cervix	.	.	.	1	3	3	5	6	4	4	.	7	10	9	2	3	57		
C54-55 Cuerpo útero	.	.	1	1	.	1	6	5	13	20	24	27	34	21	7	14	174		
C56 Ovario	.	2	.	1	1	1	4	8	9	12	12	9	12	7	14	12	3	107	
C64-65 Riñón	.	.	.	1	3	1	2	1	2	3	5	5	5	5	10	5	1	44	
C66-68 Vejiga*	.	.	1	.	1	4	2	.	4	.	3	7	9	13	13	13	70		
C69 Ojo	1	1	.	.	1	2	.	1	.	.	6		
C70-72 S.N.Central**	.	.	2	.	1	1	1	7	3	4	7	8	13	12	3	3	65		
C73 Tiroides	.	.	3	2	2	2	3	.	5	6	10	6	3	.	4	3	.	49	
C80,26,39,48,76 Otros	1	5	1	7	2	6	11	21	29	19	34	136		
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	3	1	.	1	.	1	.	1	.	3	3	.	.	.	13		
C82-85,96 Otr.Linfomas	2	2	3	7	4	6	3	17	15	7	11	77		
C88 S.Mieloproliferat.	1	1	.	1	.	3		
C90 Mieloma múltiple	1	.	4	2	4	7	10	10	6	44		
C91-95 Leucemias	3	1	1	.	1	3	.	3	2	2	1	4	10	8	11	9	6	65	
D46 Sindr. mielodisplásicos	1	.	1	.	.	1	1	.	1	1	4	10		
D47 Otr.tr.hematológicos	1	.	1	1	.	.	1	3	5	3	.	15		

TABLA A.4. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones.
Asturias 2002. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		
	00-04	05-09	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total	
C00-D47 Todas local.	4	7	6	13	19	23	34	75	120	203	285	336	533	620	580	324	221	3404	
C00 Labio	1	1	.	3	4	7	1	2	19	
C01-02 Lengua	1	.	3	3	8	6	3	5	4	4	2	.	39	
C03-06 Boca	.	.	1	.	1	.	.	4	5	6	2	3	6	2	2	2	2	36	
C07-08 Gl.salivales	1	.	2	2	1	6	
C09-14 Faringe	1	4	7	15	13	10	13	9	7	3	2	84	
C15 Esófago	1	7	4	7	5	11	8	6	1	4	54	
C16 Estómago	3	6	6	15	19	16	25	31	14	11	146	
C17 Intestino delgado	2	.	.	1	4	1	1	1	10	
C18 Colon	.	.	1	.	.	1	2	5	10	14	28	42	60	55	21	17	256		
C19-21 Recto	1	.	4	5	11	17	11	30	30	33	16	8	166		
C22 Hígado	.	.	.	1	.	4	4	4	4	7	12	14	27	13	9	6	105		
C23-24 Vesícula biliar	1	.	.	6	2	2	2	2	15	
C25 Páncreas	1	.	4	5	2	5	10	12	14	10	4	67		
C30-31 Nariz,senos	1	2	1	1	.	1	.	6		
C32 Laringe	1	3	1	9	11	18	16	23	12	10	9	1	114		
C33-34 Pulmón	1	5	13	25	43	61	59	84	127	107	64	38	627		
C37-38 Otr.org.torácicos	1	1	.	.	1	.	.	1	1	.	5		
C40-41 Hueso	1	1	1	.	1	1	1	.	.	1	1	.	1	.	2	.	11		
C43 Melanoma	2	1	3	3	3	2	5	1	3	2	2	3	30		
C45 Mesotelioma	2	.	1	2	1	2	1	.	9		
C46 S. Kaposi	1	1	.	.	1	3		
C47,49 Tejidos blandos	.	.	2	1	1	1	1	4	5	1	.	.	16		
C50 Mama	1	.	1	2	1	2	.	1	.	8	
C60,63 Otr.genit.mas.	1	.	.	1	2	1	.	5		
C61 Próstata	2	16	35	58	131	143	115	67	48	615	
C62 Testículo	.	1	5	6	.	2	4	.	3	21	
C64-65 Riñón	3	.	1	4	7	11	15	22	17	22	7	1	110		
C66-68 Vejiga*	1	.	1	1	5	2	8	14	17	32	42	49	48	73	35	29	358		
C69 Ojo	1	2	.	.	.	1	4		
C70-72 S.N.Central**	1	.	.	3	2	2	2	1	4	3	8	6	17	3	2	3	57		
C73 Tiroides	.	.	.	1	.	.	1	.	1	3	2	1	2	.	.	2	13		
C80,26,39,48,76 Otros	1	3	3	5	7	10	13	18	21	32	25	19	157		
C81 Linfoma Hodgkin	.	1	3	1	2	3	2	.	2	2	.	.	1	1	.	.	18		
C82-85,96 Otr.Linfomas	3	.	2	1	1	5	5	7	7	6	9	13	9	9	5	82			
C88 S.Mieloproliferat.	1	.	.	1		
C90 Mieloma múltiple	2	4	.	6	2	4	4	2	24		
C91-95 Leucemias	2	3	2	.	2	2	2	2	4	1	4	5	13	8	14	9	5	78	
D45 Policitemia vera	1	1	.	2	1	.	.	5		
D46 Sindr. mielodisplásicos	1	.	.	.	2	1	.	2	2	.	4	12		
D47 Otr.tr.hematológicos	1	.	2	1	1	1	3	2	1	.	12		

TABLA A.5. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 2002. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		
	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total	
C00-D47 Todas local.	4	2	2	10	25	37	51	97	152	150	203	179	232	279	327	266	226	2244	
C00 Labio	1	.	2	2	.	1	6		
C01-02 Lengua	2	1	1	.	.	.	2	1	1	1	8	
C03-06 Boca	1	1	1	2	1	1	3	2	.	1	13		
C07-08 Gl.salivales	1	.	.	1	.	2	.	4	
C09-14 Faringe	1	1	1	.	1	.	.	1	.	1	5	
C15 Esófago	1	1	1	3	1	1	.	1	1	2	12		
C16 Estómago	1	3	2	2	8	8	9	17	27	19	30	126		
C17 Intestino delgado	1	.	.	1	1	.	3	1	1	8		
C18 Colon	.	.	.	1	.	2	3	11	5	15	20	20	24	38	33	26	198		
C19-21 Recto	.	.	.	1	2	1	6	5	5	10	11	15	19	20	13	9	117		
C22 Hígado	.	.	.	1	2	1	3	5	8	6	7	8	41		
C23-24 Vesícula biliar	2	1	2	4	6	6	21		
C25 Páncreas	1	1	1	3	3	6	3	13	17	13	61		
C30-31 Nariz,senos	1	.	1	1	1	.	.	4		
C32 Laringe	1	.	.	2	1	4		
C33-34 Pulmón	5	5	11	11	14	5	13	15	11	6	8	104		
C40-41 Hueso	1	1	1	1	4		
C43 Melanoma	.	.	1	3	1	2	1	2	4	3	2	3	8	10	5	6	51		
C45 Mesotelioma	1	.	1	2	.	4		
C47,49 Tejidos blandos	1	1	.	5	2	1	1	1	5	1	.	18		
C50 Mama	.	.	2	6	15	18	48	62	47	59	50	48	50	53	44	30	532		
C51-52,57 Otr.genit.fem.	1	1	1	1	1	2	1	4	.	10	6	3	31		
C53 Cervix	.	.	1	.	4	3	6	8	9	9	4	7	2	3	1	2	59		
C54-55 Cuerpo útero	1	.	3	16	11	24	14	19	22	23	9	6	148		
C56 Ovario	.	.	1	2	1	.	3	1	7	9	8	16	12	7	9	3	79		
C64-65 Riñón	.	.	.	1	.	.	.	2	6	4	3	4	10	8	4	1	43		
C66-68 Vejiga*	1	.	4	2	3	7	14	14	15	19	10	90		
C69 Ojo	1	1		
C70-72 S.N.Central**	2	.	.	2	1	3	1	2	9	8	9	11	16	10	6	6	86		
C73 Tiroides	.	1	2	2	5	5	1	4	.	6	3	2	4	.	5	1	41		
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	.	.	1	2		
C80,26,39,48,76 Otros	1	5	4	6	4	5	9	15	12	19	26	106		
C81 Linfoma Hodgkin	.	1	2	5	3	3	1	2	2	.	.	1	.	.	1	.	21		
C82-85,96 Otr.Linfomas	1	.	1	1	1	.	3	6	4	7	5	16	18	10	11	11	85		
C90 Mieloma múltiple	1	2	.	3	4	1	2	8	4	9	2	36		
C91-95 Leucemias	1	.	1	.	.	2	.	1	3	5	11	4	10	6	5	5	49		
D45 Policitemia vera	1	1	.	2		
D46 Sindr. mielodisplásicos	1	1	3	2	4	11		
D47 Otr.tr.hematológicos	.	1	.	.	.	1	2	.	.	.	1	1	2	3	1	1	13		

TABLA A.6. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones.
Asturias 2003. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																			Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C00-D47 Todas local.	3	2	4	7	13	27	27	34	69	109	225	301	325	553	647	580	358	211	3497	
C00 Labio	1	.	3	2	7	1	3	17	
C01-02 Lengua	1	5	2	5	2	9	3	1	1	.	29	
C03-06 Boca	1	2	3	6	5	6	5	1	5	2	4	40	
C07-08 Gl.salivales	1	.	1	.	1	.	3	3	1	.	.	10	
C09-14 Faringe	1	1	1	6	6	20	11	12	12	7	5	1	2	85	
C15 Esófago	2	4	4	7	9	14	10	2	2	2	56	
C16 Estómago	1	1	1	2	1	10	12	14	17	39	19	21	9	147	
C17 Intestino delgado	1	1	.	.	2	2	.	1	7	
C18 Colon	5	5	12	18	25	55	70	50	55	21	316	
C19-21 Recto	2	6	20	16	16	35	51	23	22	7	199	
C22 Hígado	1	.	.	2	1	4	8	5	14	15	27	23	8	5	113	
C23-24 Vesícula biliar	1	3	1	3	6	2	2	16	
C25 Páncreas	1	.	.	1	5	5	5	10	14	11	9	8	6	75	
C30-31 Nariz,senos	1	.	.	.	2	.	4	.	4	1	2	.	.	14	
C32 Laringe	1	.	.	4	3	15	16	21	26	21	8	5	3	123	
C33-34 Pulmón	2	3	13	25	41	51	57	91	111	101	68	35	598	
C40-41 Hueso	.	1	1	.	.	.	3	1	.	.	.	2	.	1	1	1	.	.	11	
C43 Melanoma	3	1	.	5	4	3	1	1	3	3	6	1	.	31	
C45 Mesotelioma	1	.	1	1	1	.	1	1	.	1	7	
C46 S. Kaposi	2	.	.	1	2	1	1	1	.	.	.	8	
C47,49 Tejidos blandos	3	3	1	.	2	3	4	1	.	1	2	2	22	
C50 Mama	1	.	1	.	2	
C60,63 Otr.genit.mas.	1	1	1	1	1	1	.	1	7	
C61 Próstata	1	3	20	53	60	128	151	155	65	32	668	
C62 Testículo	.	.	.	2	2	10	6	2	1	.	4	27	
C64-65 Riñón	1	1	1	1	4	10	12	13	12	18	15	12	2	102	
C66-68 Vejiga*	1	2	1	1	3	11	12	31	25	48	49	69	35	41	329	
C70-72 S.N.Central**	1	1	1	1	1	1	1	2	1	.	9	5	10	6	9	10	.	2	61	
C73 Tiroides	1	1	2	1	.	2	2	1	.	.	10		
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	1	
C80,26,39,48,76 Otros	1	1	6	5	9	13	5	19	20	26	24	15	144	
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	1	3	4	1	1	1	1	.	2	.	.	1	1	.	.	16	
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	1	.	2	.	2	6	8	7	4	7	7	15	18	8	9	11	105	
C88 S.Mieloproliferat.	1	1	2	
C90 Mieloma múltiple	2	.	2	1	7	1	1	1	14	
C91-95 Leucemias	.	.	1	2	3	2	2	2	.	1	5	5	7	5	7	13	3	.	59	
D45 Policitemia vera	1	1	1	.	.	3	
D46 Sindr. mielodisplásicos	.	.	.	1	1	.	1	2	4	2	3	14	
D47 Otr.tr.hematológicos	1	.	1	.	1	.	2	1	.	3	.	9	

TABLA A.7. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 2003. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		
	00-04	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total	
C00-D47 Todas local.	1	2	3	8	23	31	55	99	156	153	185	160	230	297	317	260	249	2236	
C00 Labio	1	.	.	.	1	.	3	1	6	
C01-02 Lengua	1	1	2	1	.	2	1	.	8	
C03-06 Boca	1	1	1	3	.	.	2	.	3	2	1	14	
C07-08 Gl.salivales	1	.	.	.	1	1	.	1	.	.	1	.	1	6	
C09-14 Faringe	2	.	1	.	.	.	1	4	
C15 Esófago	1	1	1	1	1	1	2	8	
C16 Estómago	1	2	1	4	4	2	9	17	19	18	13	90		
C17 Intestino delgado	3	3	3	.	1	2	12		
C18 Colon	1	1	6	9	14	13	10	18	43	39	40	41	237		
C19-21 Recto	.	.	.	1	.	1	2	4	8	9	4	17	17	14	18	7	102		
C22 Hígado	.	.	1	1	.	.	1	10	12	13	6	9	54		
C23-24 Vesícula biliar	7	7	6	5	25		
C25 Páncreas	2	3	3	3	4	10	11	12	14	9	71		
C30-31 Nariz,senos	1	1	1	1	4		
C32 Laringe	4	1	.	.	.	1	.	1	7		
C33-34 Pulmón	5	4	7	7	9	3	8	9	17	13	11	94		
C37-38 Otr.org.torácicos	1	1		
C40-41 Hueso	1	1	.	.	2		
C43 Melanoma	.	1	1	4	.	1	3	4	2	8	6	4	4	9	4	10	61		
C45 Mesotelioma	1		
C46 S. Kaposi	1	1		
C47,49 Tejidos blandos	1	2	2	.	1	.	1	.	2	3	4	3	20		
C50 Mama	.	.	.	4	11	21	48	69	61	59	49	45	64	47	36	42	557		
C51-52,57 Otr.genit.fem.	2	.	.	1	2	2	4	2	2	15		
C53 Cervix	.	.	.	1	3	3	3	7	6	4	2	5	6	8	7	2	57		
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	1	1	3	4	5	5	26	17	25	20	23	13	10	153		
C56 Ovario	.	.	.	1	.	2	6	8	6	9	11	8	15	9	6	10	91		
C64-65 Riñón	1	.	1	2	3	2	3	8	8	5	6	39		
C66-68 Vejiga*	2	5	2	6	10	5	13	11	6	12	72		
C69 Ojo	1	.	1	2		
C70-72 S.N.Central**	.	.	1	3	1	3	2	5	6	11	7	10	10	8	5	2	74		
C73 Tiroides	1	.	2	2	6	2	2	6	4	1	4	5	2	1	6	6	50		
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	1		
C80,26,39,48,76 Otros	.	1	.	.	1	1	2	6	1	5	5	11	6	27	15	20	101		
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	2	2	5	.	1	.	.	.	1	.	.	1	1	1	14		
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	2	1	1	3	3	3	10	7	17	17	15	14	3	96		
C90 Mieloma múltiple	1	1	1	3	2	.	1	6	4	19		
C91-95 Leucemias	1	1	1	1	1	.	3	1	4	5	.	2	5	6	9	5	54		
D45 Policitemia vera	1	.	1		
D46 Sindr. mielodisplásicos	1	.	.	.	1	.	1	1	1	2	7		
D47 Otr.tr.hematológicos	1	1	2	.	1	5		

TABLA A.8. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones.
Asturias 2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		
	00-04	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total	
C00-D47 Todas local.	3	3	4	13	19	23	42	77	145	234	320	401	570	697	692	405	209	3864	
C00 Labio	1	.	2	1	4	4	6	4	2	24	
C01-02 Lengua	1	.	2	2	4	4	5	4	3	1	.	26	
C03-06 Boca	1	3	2	2	2	7	3	4	1	1	26	
C07-08 Gl.salivales	1	.	2	2	.	.	2	2	9	
C09-14 Faringe	.	.	.	1	9	17	18	9	9	15	9	3	4	94	
C15 Esófago	1	2	1	9	7	7	5	13	14	5	.	64	
C16 Estómago	1	2	5	9	7	15	25	36	41	20	16	177	
C17 Intestino delgado	1	.	.	1	1	3	3	3	2	14	
C18 Colon	.	.	.	1	.	1	3	7	16	28	26	42	59	78	47	29	337		
C19-21 Recto	1	4	4	3	13	19	20	41	45	50	26	13	240		
C22 Hígado	.	.	1	.	.	.	4	6	7	9	13	19	16	19	10	2	106		
C23-24 Vesícula biliar	2	.	2	5	3	6	1	1	20		
C25 Páncreas	2	6	4	5	9	15	9	11	7	6	74		
C30-31 Nariz,senos	1	.	1	.	.	2	1	3	3	2	1	14		
C32 Laringe	1	1	5	12	9	19	16	15	16	10	6	4	115		
C33-34 Pulmón	4	11	36	49	73	66	91	117	105	67	23	645		
C37-38 Otr.org.torácicos	1	1		
C40-41 Hueso	.	1	1	.	.	.	1	4	1	1	9		
C43 Melanoma	.	.	2	2	4	4	7	2	2	3	5	5	6	7	3	5	57		
C45 Mesotelioma	2	.	1	.	.	2	2	.	7		
C46 S. Kaposi	2	.	.	1	1	1	1	.	3	.	.	9		
C47,49 Tejidos blandos	1	.	.	1	2	1	5	1	8	5	4	.	28		
C50 Mama	1	4	.	.	1	3	.	9		
C60,63 Otr.genit.mas.	1	1	2	2	2	1	3	12		
C61 Próstata	2	19	42	100	151	198	143	71	24	750		
C62 Testículo	.	.	2	4	4	4	4	4	.	1	.	.	.	1	.	.	20		
C64-65 Riñón	.	.	.	1	.	.	6	6	17	15	13	22	17	13	12	3	125		
C66-68 Vejiga*	.	.	.	1	2	1	6	9	19	29	34	44	66	88	51	31	381		
C69 Ojo	1	1	.	1	1	.	.	4		
C70-72 S.N.Central**	1	1	2	2	4	3	3	.	6	4	8	9	10	5	8	3	70		
C73 Tiroides	.	.	1	1	1	2	2	2	.	.	1	1	.	1	.	.	10		
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	.	.	.	1	1	1	.	.	1	.	.	5		
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	1	.	.	1	10	6	9	12	17	21	17	18	16	128		
C81 Linfoma Hodgkin	2	1	4	3	.	1	.	4	5	.	1	2	.	1	1	.	26		
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	2	2	5	6	9	6	9	8	19	10	18	8	5	107		
C88 S.Mieloproliferat.	1	1		
C90 Mieloma múltiple	1	.	2	1	2	1	3	4	6	7	2	29		
C91-95 Leucemias	2	.	.	1	2	4	7	2	4	3	8	3	4	11	6	7	64		
D45 Policitemia vera	1	.	.	2	.	.	.	3		
D46 Sindr. mielodisplásicos	2	2	.	.	.	2	3	1	10		
D47 Otr.tr.hematológicos	1	.	3	.	2	2	3	1	2	14	

TABLA A.9. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																			Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C00-D47 Todas local.	6	2	3	4	10	24	32	43	92	163	175	166	185	244	337	315	297	262	2361	
C00 Labio	1	.	1	.	2	3	7	
C01-02 Lengua	1	1	1	1	.	1	1	2	2	1	11	
C03-06 Boca	1	1	.	1	.	2	1	1	1	1	9	
C07-08 Gl.salivales	1	.	1	1	.	1	.	1	.	.	5	
C09-14 Faringe	1	1	3	.	.	.	1	.	.	.	6	
C15 Esófago	1	2	5	.	8	
C16 Estómago	1	.	.	1	2	4	4	4	5	13	13	19	32	98	
C17 Intestino delgado	1	.	2	3	1	2	2	11	
C18 Colon	1	1	3	5	7	9	13	16	21	45	38	35	32	226	
C19-21 Recto	1	4	7	13	15	21	22	24	17	9	133	
C22 Hígado	1	.	.	1	2	2	.	4	3	3	7	9	7	39	
C23-24 Vesícula biliar	1	1	5	3	2	4	16	
C25 Páncreas	2	5	5	3	6	15	13	14	63	
C30-31 Nariz,senos	1	2	.	1	.	4	
C32 Laringe	2	.	1	.	.	.	1	.	1	5	
C33-34 Pulmón	1	4	11	7	6	6	9	13	8	11	13	89	
C37-38 Otr.org.torácicos	1	.	.	.	1	2	
C40-41 Hueso	.	.	.	1	.	.	1	2	.	.	1	.	.	.	1	1	1	.	8	
C43 Melanoma	.	.	.	1	1	3	1	2	6	3	6	6	4	8	7	8	7	63		
C45 Mesotelioma	1	.	2	3	
C46 S. Kaposi	1	1	
C47,49 Tejidos blandos	.	2	.	1	1	.	.	1	.	2	.	3	.	4	2	3	2	21		
C50 Mama	1	1	10	20	36	66	70	54	54	58	66	75	44	37	592	
C51-52,57 Otr.genit.fem.	1	.	.	3	1	.	1	3	7	3	7	10	36	
C53 Cervix	3	3	9	6	6	1	3	4	4	3	5	2	49	
C54-55 Cuerpo útero	2	.	3	3	4	8	23	19	31	18	19	13	4	147	
C56 Ovario	2	.	1	2	8	8	9	9	7	6	15	6	9	8	90	
C64-65 Riñón	1	.	1	1	2	4	3	8	8	8	6	3	2	47	
C66-68 Vejiga*	1	.	4	3	3	4	4	8	20	11	17	13	88	
C69 Ojo	2	.	.	.	2	4	
C70-72 S.N.Central**	2	2	.	.	1	4	2	3	3	5	7	9	4	16	9	11	2	6	86	
C73 Tiroides	.	.	.	1	.	5	2	1	5	4	8	3	4	5	8	3	2	3	54	
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	1	1	1	4	
C80,26,39,48,76 Otros	1	.	1	1	4	5	2	4	13	19	19	30	29	128	
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	1	.	1	1	2	.	1	.	.	.	2	.	1	1	.	.	11	
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	1	1	3	2	.	1	12	10	2	9	10	21	17	14	6	109	
C88 S.Mieloproliferat.	1	1	
C90 Mieloma múltiple	1	.	2	1	.	2	6	4	3	11	5	35	
C91-95 Leucemias	3	.	.	1	1	1	1	.	2	2	2	2	1	4	8	6	3	37		
D45 Policitemia vera	1	1	
D46 Sindr. mielodisplásicos	1	.	.	2	1	4	8		
D47 Otr.tr.hematológicos	1	.	.	.	1	.	.	1	2	1	6		

TABLA A.10. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones.
Asturias 2001.Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		
	00-04	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total	
C00-D47 Todas local.	26.3	26.6	29.3	29.1	30.6	63.8	64.9	205.1	381.0	630.2	1022.9	1292.7	1869.0	2455.8	2832.4	3171.4	2951.9	686.9	
C00 Labio	4.0	6.4	7.3	15.0	28.6	14.0	2.3	
C01-02 Lengua	4.8	7.9	13.8	20.4	19.9	28.8	14.7	20.0	9.5	.	7.6	
C03-06 Boca	7.2	7.9	22.1	20.4	15.9	3.2	3.7	35.0	9.5	14.0	6.8	
C07-08 Gl.salivales	2.4	.	2.8	.	.	3.2	7.3	5.0	9.5	.	1.4	
C09-14 Faringe	2.5	12.1	18.4	38.7	30.6	43.8	28.8	11.0	35.0	28.6	14.0	13.6	
C15 Esófago	15.8	19.3	23.8	31.8	25.6	69.7	15.0	38.1	42.0	12.6	
C16 Estómago	2.6	.	9.7	10.5	24.9	51.0	67.6	89.6	80.8	140.1	171.4	209.8	31.2	
C17 Intestino delgado	3.4	4.0	6.4	3.7	10.0	.	14.0	1.6	
C18 Colon	2.6	2.5	2.4	36.8	41.5	81.6	43.8	169.6	264.3	290.2	381.0	405.7	61.8		
C19-21 Recto	5.1	.	7.2	21.0	22.1	57.8	67.6	121.6	146.8	150.1	142.9	111.9	36.1	
C22 Hígado	4.8	15.8	11.1	40.8	47.7	73.6	99.1	85.1	133.3	42.0	23.3		
C23-24 Vesícula biliar	5.3	2.8	.	4.0	12.8	7.3	.	28.6	28.0	2.9		
C25 Páncreas	14.5	10.5	11.1	27.2	27.8	32.0	36.7	40.0	38.1	69.9	12.8		
C30-31 Nariz,senos	4.0	19.2	3.7	1.6	
C32 Laringe	2.5	19.3	10.5	47.0	68.0	79.5	44.8	33.0	75.1	38.1	28.0	22.1		
C33-34 Pulmón	.	.	.	2.4	5.1	10.0	38.6	84.1	116.1	214.1	290.4	352.0	444.2	460.4	561.9	475.7	125.8		
C37-38 Otr.org.torácicos	2.6	.	.	.	3.2	0.4		
C40-41 Hueso	4.4	4.8	2.4	.	2.8	3.4	.	6.4	1.6		
C43 Melanoma	10.0	2.4	5.3	13.8	17.0	8.0	12.8	22.0	10.0	9.5	28.0	6.8		
C45 Mesotelioma	2.5	.	.	2.8	.	4.0	.	3.7	10.0	9.5	14.0	1.6	.		
C46 S. Kaposi	2.5	.	.	2.8	.	4.0	.	.	.	9.5	.	0.8	.		
C47,49 Tejidos blandos	2.5	2.4	10.5	.	3.4	8.0	6.4	11.0	.	9.5	14.0	3.1	.		
C50 Mama	2.8	6.8	.	6.4	7.3	5.0	.	14.0	1.7		
C60,63 Otr.genit.mas.	8.3	3.4	.	3.2	3.7	15.0	19.0	.	2.1		
C61 Próstata	2.5	2.4	5.3	41.5	95.2	250.6	393.7	488.2	605.5	457.1	531.6	111.1		
C62 Testículo	6.6	.	7.3	11.8	15.3	7.5	2.4	2.6	.	.	4.0	4.1		
C64-65 Riñón	6.6	4.8	18.4	38.7	23.8	35.8	41.6	73.4	70.1	85.7	28.0	19.0	.		
C66-68 Vejiga*	.	.	4.8	.	2.6	5.0	14.5	13.1	47.0	105.4	91.5	185.6	260.6	380.3	409.5	377.7	70.2		
C69 Ojo	2.8	3.4	.	3.7	5.0	9.5	.	1.0	.		
C70-72 S.N.Central**	8.9	6.5	4.8	4.7	2.6	.	7.2	18.4	8.3	17.0	19.9	48.0	47.7	30.0	66.7	.	14.1		
C73 Tiroides	.	.	.	2.4	2.6	.	2.4	.	.	3.4	.	6.4	3.7	15.0	19.0	14.0	2.5		
C74-75 Otr.gl.endocr.	6.6	.	.	2.6	4.0	0.6		
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	2.4	.	2.5	9.7	15.8	35.9	34.0	43.8	48.0	113.8	110.1	171.4	237.8	28.9	.		
C81 Linfoma Hodgkin	8.9	6.5	7.3	.	2.6	5.0	4.8	2.6	.	3.4	.	7.3	3.1		
C82-85,96 Otr.Linfomas	4.4	9.8	.	4.7	10.2	5.0	16.9	28.9	24.9	30.6	27.8	25.6	55.1	75.1	104.8	69.9	21.3		
C90 Mieloma múltiple	5.1	2.5	.	.	13.8	3.4	8.0	16.0	33.0	35.0	57.1	28.0	7.8		
C91-95 Leucemias	6.6	.	6.5	.	2.4	5.1	.	9.7	10.5	11.1	17.0	27.8	28.8	51.4	70.1	76.2	83.9	15.7	
D45 Policitemia vera	4.0	0.2		
D46 Sindr. mielodisplásicos	3.4	.	9.6	18.4	10.0	28.6	.	2.7		
D47 Otr.tr.hematológicos	2.6	.	10.2	.	9.6	18.4	10.0	9.5	42.0	3.5		

TABLA A.11. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres.
Asturias 2001.Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																	
	00-04	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
C00-D47 Todas local.	35.2	28.1	23.9	27.7	33.7	80.2	150.0	225.7	341.3	459.5	518.0	626.4	737.8	882.0	1204.5	1245.0	1389.6	411.7
C00 Labio	2.6	5.6	2.9	3.4	.	.	0.9
C01-02 Lengua	2.5	2.3	5.1	5.7	6.8	.	10.8	1.8
C03-06 Boca	2.6	.	6.4	.	2.8	2.9	3.4	5.0	10.8	1.6
C07-08 Gl.salivales	2.9	6.8	.	.	0.5
C09-14 Faringe	2.6	.	.	7.7	2.7	.	.	2.8	2.9	.	5.0	.	1.4
C15 Esófago	3.2	7.1	2.8	2.9	6.8	10.1	5.4	1.8
C16 Estómago	2.3	5.1	10.7	6.4	3.6	30.6	34.5	65.0	115.9	123.9	17.5
C17 Intestino delgado	7.1	.	8.6	6.8	5.0	5.4	1.6
C18 Colon	.	.	.	2.5	.	2.6	.	7.0	7.7	24.2	38.4	64.1	50.1	91.9	171.1	191.5	231.6	40.8
C19-21 Recto	2.5	4.7	10.3	8.1	6.4	10.7	22.3	37.3	71.9	45.4	53.9	13.6
C22 Hígado	.	.	.	2.4	2.6	.	4.7	.	5.4	3.2	7.1	5.6	23.0	27.4	35.3	21.5	6.8	
C23-24 Vesícula biliar	8.4	8.6	20.5	20.2	5.4	3.0	
C25 Páncreas	.	.	2.4	.	.	2.3	2.6	10.7	9.6	7.1	11.1	20.1	17.1	55.4	59.2	8.9		
C30-31 Nariz,senos	3.2	.	.	.	3.4	5.0	.	0.5	
C32 Laringe	2.7	.	2.8	2.9	3.4	.	.	.	0.7	
C33-34 Pulmón	.	.	2.4	2.6	2.5	11.6	10.3	13.4	22.4	35.6	36.2	43.1	27.4	35.3	70.0	16.1		
C40-41 Hueso	7.0	9.4	.	7.2	5.6	.	.	.	5.4	1.6	
C43 Melanoma	.	4.7	.	2.5	.	2.6	9.8	2.3	5.1	18.8	9.6	10.7	19.5	23.0	27.4	30.2	32.3	10.4
C45 Mesotelioma	3.6	.	.	.	5.4	0.4		
C46 S. Kaposi	2.6	3.4	.	.	0.4	
C47,49 Tejidos blandos	7.0	2.5	.	.	2.7	3.2	.	11.1	.	6.8	20.2	21.5	3.2	
C50 Mama	.	.	2.5	2.4	23.3	71.3	100.0	169.4	196.2	195.0	199.3	219.9	163.8	181.4	166.3	172.4	106.0	
C51-52,57 Otr.genit.fem.	7.4	2.3	2.6	2.7	3.2	7.1	8.4	8.6	13.7	20.2	26.9	5.0	
C53 Cervix	.	.	2.4	7.8	7.4	11.6	15.4	10.7	12.8	.	19.5	28.7	30.8	10.1	16.2	10.2		
C54-55 Cuerpo útero	.	2.5	2.4	.	2.5	14.0	12.8	34.9	63.9	85.4	75.2	97.7	71.9	35.3	75.4	31.1		
C56 Ovario	9.4	2.5	2.4	2.6	9.8	18.6	23.1	32.2	38.4	32.0	33.4	20.1	47.9	60.5	16.2	19.1		
C64-65 Riñón	.	.	2.4	7.8	2.5	4.7	2.6	5.4	9.6	17.8	13.9	14.4	34.2	25.2	5.4	7.9		
C66-68 Vejiga*	.	2.5	.	2.6	9.8	4.7	.	10.7	.	10.7	19.5	25.9	44.5	65.5	70.0	12.5		
C69 Ojo	2.3	2.6	.	.	3.6	5.6	.	3.4	.	.	1.1		
C70-72 S.N.Central**	.	5.0	.	2.6	2.5	2.3	18.0	8.1	12.8	24.9	22.3	37.3	41.1	15.1	16.2	11.6		
C73 Tiroides	.	10.2	5.0	4.8	5.2	7.4	.	12.8	16.1	32.0	21.4	8.4	.	13.7	15.1	.	8.8	
C80,26,39,48,76 Otros	2.5	11.6	2.6	18.8	6.4	21.4	30.6	60.3	99.2	95.8	183.1	24.3	
C81 Linfoma Hodgkin	.	10.2	2.5	.	2.5	4.9	4.7	7.7	18.8	12.8	21.4	8.4	48.8	51.3	35.3	59.2	13.8	
C82-85,96 Otr.Linfomas	2.8	2.9	.	5.0	.	0.5	
C88 S.Mieloproliferat.	2.6	.	12.8	7.1	11.1	20.1	34.2	50.4	32.3	7.9	
C90 Mieloma múltiple	3.6		
C91-95 Leucemias	21.1	4.7	3.4	.	2.4	7.8	.	7.0	5.1	5.4	3.2	14.2	27.8	23.0	37.6	45.4	32.3	11.6
D46 Sindr. mielodisplásicos	2.6	.	2.3	.	.	3.6	2.8	.	3.4	5.0	21.5	1.8	
D47 Otr.tr.hematológicos	2.6	.	2.3	2.6	.	.	2.8	8.6	17.1	15.1	.	2.7	

TABLA A.12. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones.
Asturias 2002.Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																	
	00-04	05-09	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
C00-D47 Todas local.	25.2	40.1	20.5	33.1	44.1	57.8	85.2	180.6	307.9	560.3	910.1	1418.7	1723.6	2267.1	2826.1	2892.9	3013.8	660.8
C00 Labio	2.8	3.2	.	9.7	14.6	34.1	8.9	27.3	3.7
C01-02 Lengua	2.5	.	7.2	7.7	22.1	19.2	12.7	16.2	14.6	19.5	17.9	.	7.6
C03-06 Boca	.	.	3.4	.	2.3	.	.	9.6	12.8	16.6	6.4	12.7	19.4	7.3	9.7	17.9	27.3	7.0
C07-08 Gl.salivales	3.2	.	9.7	17.9	13.6	1.2
C09-14 Faringe	2.5	9.6	18.0	41.4	41.5	42.2	42.0	32.9	34.1	26.8	27.3	16.3
C15 Esófago	2.4	18.0	11.0	22.4	21.1	35.6	29.3	29.2	8.9	54.5	10.5
C16 Estómago	7.2	15.4	16.6	47.9	80.2	51.7	91.4	151.1	125.0	150.0	28.3
C17 Intestino delgado	5.5	.	.	3.2	14.6	4.9	8.9	13.6	1.9
C18 Colon	.	.	2.5	.	.	2.5	4.8	12.8	27.6	44.7	118.2	135.8	219.4	268.0	187.5	231.8	49.7	
C19-21 Recto	2.5	.	9.6	12.8	30.4	54.3	46.4	97.0	109.7	160.8	142.9	109.1	32.2
C22 Hígado	.	.	.	2.3	.	.	10.0	9.6	10.3	11.0	22.4	50.7	45.3	98.7	63.3	80.4	81.8	20.4
C23-24 Vesícula biliar	2.8	.	.	19.4	7.3	9.7	17.9	27.3	2.9
C25 Páncreas	2.5	.	10.3	13.8	6.4	21.1	32.3	43.9	68.2	89.3	54.5	13.0	
C30-31 Nariz,senos	3.2	8.4	3.2	3.7	.	8.9	.	1.2	
C32 Laringe	2.5	7.5	2.4	23.1	30.4	57.5	67.6	74.4	43.9	48.7	80.4	13.6	22.1
C33-34 Pulmón	2.5	12.5	31.3	64.2	118.7	194.8	249.1	271.6	464.4	521.4	571.4	518.2	121.7
C37-38 Otr.org.torácicos	2.4	2.6	.	.	4.2	.	.	4.9	8.9	.	1.0
C40-41 Hueso	5.7	3.4	2.5	.	2.5	2.5	2.4	.	.	3.2	4.2	.	3.7	.	17.9	.	2.1	
C43 Melanoma	5.0	2.5	7.2	7.7	8.3	6.4	21.1	3.2	11.0	9.7	17.9	40.9	5.8
C45 Mesotelioma	5.5	.	4.2	6.5	3.7	9.7	8.9	.	1.7
C46 S. Kaposi	2.5	2.4	.	.	3.2	0.6	
C47,49 Tejidos blandos	.	.	5.1	2.3	2.8	3.2	4.2	12.9	18.3	4.9	.	.	3.1	
C50 Mama	2.6	.	3.2	8.4	3.2	7.3	.	8.9	.	1.6	
C60,63 Otr.genit.mas.	2.8	.	.	3.2	7.3	4.9	.	.	1.0	
C61 Próstata	5.1	44.2	111.8	244.9	423.6	522.9	560.3	598.2	654.6	119.4	
C62 Testículo	.	3.4	12.7	13.9	.	5.0	9.6	.	8.3	4.1	
C64-65 Riñón	7.5	.	2.4	10.3	19.3	35.1	63.3	71.1	62.2	107.2	62.5	13.6	21.4
C66-68 Vejiga*	6.3	.	2.5	2.3	12.6	5.0	19.3	35.9	46.9	102.2	177.3	158.5	175.5	355.7	312.5	395.5	69.5	
C69 Ojo	2.4	6.5	.	.	.	13.6	0.8	
C70-72 S.N.Central**	6.3	.	.	7.0	5.0	5.0	4.8	2.6	11.0	9.6	33.8	19.4	62.2	14.6	17.9	40.9	11.1	
C73 Tiroides	.	.	.	2.3	.	.	2.4	.	2.8	9.6	8.4	3.2	7.3	.	27.3	.	2.5	
C80,26,39,48,76 Otros	2.5	7.5	7.2	12.8	19.3	31.9	54.9	58.2	76.8	155.9	223.2	259.1	30.5	
C81 Linfoma Hodgkin	.	3.4	7.6	2.3	5.0	7.5	4.8	.	5.5	6.4	.	.	3.7	4.9	.	.	3.5	
C82-85,96 Otr.Linfomas	17.2	.	4.6	2.5	2.5	12.0	12.8	19.3	22.4	25.3	29.1	47.5	43.9	80.4	68.2	15.9		
C88 S.Mieloproliferat.	4.9	.	.	.	0.2	
C90 Mieloma múltiple	5.5	12.8	.	19.4	7.3	19.5	35.7	27.3	4.7	
C91-95 Leucemias	12.6	17.2	6.8	.	4.6	5.0	5.0	4.8	10.3	2.8	12.8	21.1	42.0	29.3	68.2	80.4	68.2	15.1
D45 Policitemia vera	3.2	4.2	.	7.3	4.9	.	.	1.0	
D46 Sindr. mielodisplásicos	2.5	.	.	.	6.4	4.2	.	7.3	9.7	.	54.5	2.3	
D47 Otr.tr.hematológicos	2.4	.	5.5	3.2	4.2	3.2	11.0	9.7	8.9	.	2.3	

TABLA A.13. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres.
Asturias 2002.Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		
	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total	
C00-D47 Todas local.	24.1	9.8	7.2	26.2	59.6	94.7	126.1	226.6	377.0	403.8	608.9	684.4	647.9	800.8	1085.9	1303.0	1193.9	401.6	
C00 Labio	3.8	.	5.7	6.6	.	5.3	1.1	
C01-02 Lengua	5.0	2.7	3.0	.	.	.	6.6	4.9	5.3	1.4	
C03-06 Boca	2.3	2.5	2.7	6.0	3.8	2.8	8.6	6.6	.	5.3	2.3	
C07-08 Gl.salivales	3.0	.	.	2.9	.	9.8	.	0.7	
C09-14 Faringe	2.5	2.7	.	3.8	.	.	3.3	.	5.3	0.9	
C15 Esófago	2.3	2.5	2.7	9.0	3.8	2.8	.	3.3	4.9	10.6	2.1	
C16 Estómago	2.5	7.0	5.0	5.4	24.0	30.6	25.1	48.8	89.7	93.1	158.5	22.5		
C17 Intestino delgado	2.5	.	.	3.8	2.8	.	10.0	4.9	5.3	1.4	
C18 Colon	.	.	2.4	.	4.9	7.0	27.3	13.5	45.0	76.5	55.9	68.9	126.2	161.7	137.3	35.4			
C19-21 Recto	.	2.4	5.1	2.5	14.0	12.4	13.5	30.0	42.1	41.9	54.5	66.4	63.7	47.5	20.9	.	.		
C22 Hígado	.	2.4	5.4	3.0	11.5	14.0	23.0	19.9	34.3	42.3	7.3			
C23-24 Vesícula biliar	7.6	2.8	5.7	13.3	29.4	31.7	3.8		
C25 Páncreas	2.3	2.5	2.7	9.0	11.5	16.8	8.6	43.2	83.3	68.7	10.9			
C30-31 Nariz,senos	3.0	.	2.8	2.9	3.3	.	.	0.7		
C32 Laringe	.	.	2.6	.	.	.	5.0	2.7	0.7		
C33-34 Pulmón	12.4	11.7	27.3	29.6	42.0	19.1	36.3	43.1	36.5	29.4	42.3	18.6			
C40-41 Hueso	6.0	2.3	2.5	5.3	0.7		
C43 Melanoma	.	2.6	7.2	2.6	4.9	2.3	5.0	10.8	9.0	7.6	8.4	23.0	33.2	24.5	31.7	9.1			
C45 Mesotelioma	2.8	.	3.3	9.8	.	0.7			
C47,49 Tejidos blandos	2.5	2.3	.	13.5	6.0	3.8	2.8	2.9	16.6	4.9	.	3.2			
C50 Mama	.	5.2	14.3	38.4	44.5	112.1	153.8	126.5	177.0	191.2	134.0	143.5	176.0	215.5	158.5	95.2			
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	2.6	2.5	2.3	2.5	2.7	6.0	3.8	11.2	.	33.2	29.4	15.8	5.5				
C53 Cervix	.	2.6	.	10.2	7.4	14.0	19.8	24.2	27.0	15.3	19.5	5.7	10.0	4.9	10.6	10.6			
C54-55 Cuerpo útero	.	.	2.6	.	2.6	.	7.0	39.7	29.6	72.0	53.5	53.1	63.1	76.4	44.1	31.7	26.5		
C56 Ovario	.	2.6	4.8	2.6	.	7.0	2.5	18.8	27.0	30.6	44.7	34.4	23.2	44.1	15.8	14.1			
C64-65 Riñón	.	.	2.4	.	.	.	5.0	16.2	12.0	11.5	11.2	28.7	26.6	19.6	5.3	7.7			
C66-68 Vejiga*	2.5	.	9.9	5.4	9.0	26.8	39.1	40.2	49.8	93.1	52.8	16.1			
C69 Ojo	5.3	0.2			
C70-72 S.N.Central**	12.0	.	4.8	2.6	7.4	2.3	5.0	24.2	24.0	34.4	30.7	45.9	33.2	29.4	31.7	15.4			
C73 Tiroídes	.	3.6	5.2	4.8	12.8	12.4	2.3	9.9	.	18.0	11.5	5.6	11.5	.	24.5	5.3	7.3		
C74-75 Otr.gl.endocr.	2.5	.	.	3.8	0.4			
C80,26,39,48,76 Otros	2.5	11.7	9.9	16.2	12.0	19.1	25.1	43.1	39.8	93.1	137.3	19.0			
C81 Linfoma Hodgkin	.	3.6	5.2	11.9	7.7	7.4	2.3	5.0	5.4	.	2.8	.	.	4.9	.	3.8			
C82-85,96 Otr.Linfomas	4.9	.	2.4	2.6	2.5	.	7.4	16.2	12.0	26.8	14.0	45.9	59.8	49.0	58.1	15.2			
C90 Mieloma múltiple	2.5	4.7	.	8.1	12.0	3.8	5.6	23.0	13.3	44.1	10.6	6.4			
C91-95 Leucemias	6.0	.	2.6	.	.	4.7	.	2.7	9.0	19.1	30.7	11.5	33.2	29.4	26.4	8.8			
D45 Policitemia vera	3.3	4.9	.	0.4			
D46 Sindr. mielodisplásicos	2.3	2.5	10.0	9.8	21.1	2.0			
D47 Otr.tr.hematológicos	4.9	.	.	2.6	4.9	3.8	2.8	5.7	10.0	4.9	5.3	2.3			

TABLA A.14. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones.
Asturias 2003.Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
C00-D47 Todas local.	18.2	11.7	19.3	25.0	34.9	62.2	66.9	84.6	166.2	273.1	606.5	915.8	1370.6	1901.5	2311.9	2784.2	2955.3	2837.5	677.8
C00 Labio	3.0	.	10.3	7.1	33.6	8.3	40.3	3.3
C01-02 Lengua	2.4	12.5	5.4	15.2	8.4	30.9	10.7	4.8	8.3	.	5.6
C03-06 Boca	2.5	4.8	7.5	16.2	15.2	25.3	17.2	3.6	24.0	16.5	53.8	7.8
C07-08 Gl.salivales	2.5	.	2.5	.	3.0	.	10.3	10.7	4.8	.	.	1.9
C09-14 Faringe	2.3	2.5	2.5	14.5	15.0	53.9	33.5	50.6	41.3	25.0	24.0	8.3	26.9	16.5
C15 Esófago	4.8	10.0	10.8	21.3	38.0	48.1	35.7	9.6	16.5	26.9	10.9
C16 Estómago	6.1	2.5	2.5	4.8	2.5	27.0	36.5	59.0	58.5	139.4	91.2	173.4	121.0	28.5
C17 Intestino delgado	2.7	3.0	.	.	7.1	9.6	.	13.4	1.4
C18 Colon	12.0	12.5	32.3	54.8	105.4	189.1	250.1	240.0	454.0	282.4	61.2
C19-21 Recto	4.8	15.0	53.9	48.7	67.5	120.3	182.2	110.4	181.6	94.1	38.6
C22 Hígado	2.7	.	.	5.0	2.4	10.0	21.6	15.2	59.0	51.6	96.5	110.4	66.0	67.2	21.9
C23-24 Vesícula biliar	4.2	10.3	3.6	14.4	49.5	26.9	3.1	
C25 Páncreas	2.3	.	.	2.4	12.5	13.5	15.2	42.2	48.1	39.3	43.2	66.0	80.7	14.5
C30-31 Nariz,senos	2.3	.	.	.	5.0	.	12.2	.	13.8	3.6	9.6	.	.	2.7
C32 Laringe	2.3	.	.	9.6	7.5	40.4	48.7	88.6	89.4	75.0	38.4	41.3	40.3	23.8
C33-34 Pulmón	5.0	7.5	31.3	62.6	110.5	155.2	240.4	312.9	396.6	484.8	561.3	470.7	115.9
C40-41 Hueso	.	5.9	4.8	.	.	.	7.4	2.5	.	.	.	6.1	.	3.4	3.6	4.8	.	.	2.1
C43 Melanoma	6.9	2.5	.	12.0	10.0	8.1	3.0	4.2	10.3	10.7	28.8	8.3	.	6.0
C45 Mesotelioma	2.4	.	.	2.7	3.0	4.2	.	3.6	4.8	.	13.4	1.4
C46 S. Kaposi	5.0	.	.	2.7	6.1	4.2	3.4	3.6	.	.	.	1.6	
C47,49 Tejidos blandos	7.4	7.5	2.4	.	5.4	9.1	16.9	3.4	.	4.8	16.5	26.9	4.3
C50 Mama	3.6	.	8.3	.	0.4	
C60,63 Otr.genit.mas.	2.3	2.5	4.2	3.4	3.6	4.8	.	13.4	1.4	
C61 Próstata	2.4	7.5	53.9	161.3	253.0	440.1	539.6	744.0	536.6	430.3	129.5
C62 Testículo	.	.	.	7.2	5.4	23.0	14.9	5.0	2.4	.	10.8	5.2	
C64-65 Riñón	6.1	2.5	2.5	2.4	10.0	27.0	36.5	54.8	41.3	64.3	72.0	99.1	26.9	19.8
C66-68 Vejiga*	2.7	4.6	2.5	2.5	7.2	27.6	32.3	94.3	105.4	165.1	175.1	331.2	288.9	551.4	63.8
C70-72 S.N.Central**	6.1	5.9	4.8	3.6	2.7	2.3	2.5	5.0	2.4	.	24.3	15.2	42.2	20.6	32.2	48.0	.	26.9	11.8
C73 Tiroides	2.5	2.4	5.0	2.7	.	8.4	6.9	3.6	.	.	1.9	
C74-75 Otr.gl.endocr.	3.0	0.2	
C80,26,39,48,76 Otros	2.5	2.5	14.5	12.5	24.3	39.6	21.1	65.3	71.5	124.8	198.1	201.7	27.9	
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	3.6	8.1	9.2	2.5	2.5	2.4	2.5	.	6.1	.	.	3.6	4.8	.	.	3.1	
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	4.8	.	5.4	.	5.0	14.9	19.3	17.5	10.8	21.3	29.5	51.6	64.3	38.4	74.3	147.9	20.4	
C88 S.Mieloproliferat.	3.0	4.2	0.4	
C90 Mieloma múltiple	6.1	.	6.9	3.6	33.6	8.3	13.4	2.7	
C91-95 Leucemias	.	4.8	7.2	8.1	4.6	5.0	5.0	.	2.5	13.5	15.2	29.5	17.2	25.0	62.4	24.8	.	11.4	
D45 Policitemia vera	2.5	3.6	4.8	.	.	0.6	
D46 Sindr. mielodisplásicos	.	.	3.6	3.0	.	3.4	7.1	19.2	16.5	40.3	2.7	
D47 Otr.tr.hematológicos	2.5	.	2.5	.	3.0	.	6.9	3.6	.	24.8	.	1.7	

TABLA A.15. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres.
Asturias 2003.Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																	
	00-04	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
C00-D47 Todas local.	6.5	10.1	11.4	22.0	54.7	78.1	136.0	232.3	377.3	404.3	524.3	620.1	679.8	834.3	1048.9	1193.6	1297.7	399.7
C00 Labio	2.6	.	.	.	2.8	.	13.8	5.2	1.1
C01-02 Lengua	2.6	2.8	7.8	3.0	.	6.6	4.6	.	1.4
C03-06 Boca	2.5	2.3	2.4	7.9	.	.	5.9	.	9.9	9.2	5.2	2.5
C07-08 Gl.salivales	2.4	.	.	.	2.4	2.6	.	3.9	.	.	3.3	.	5.2	1.1
C09-14 Faringe	4.9	.	2.4	.	.	.	3.0	0.7
C15 Esófago	2.3	2.4	.	.	.	3.0	2.8	3.3	4.6	10.4	1.4
C16 Estómago	2.5	4.7	2.4	10.6	11.3	7.8	26.6	47.8	62.9	82.6	67.8	16.1	
C17 Intestino delgado	11.6	8.9	8.4	.	4.6	10.4	.	2.1
C18 Colon	2.5	2.5	14.1	21.8	37.0	36.8	38.8	53.2	120.8	129.0	183.6	213.7	42.4	
C19-21 Recto	.	.	2.4	.	2.5	4.7	9.7	21.1	25.5	15.5	50.2	47.8	46.3	82.6	36.5	18.2	.	
C22 Hígado	.	2.8	2.4	.	.	3.9	29.6	33.7	43.0	27.5	46.9	9.7	
C23-24 Vesícula biliar	19.7	23.2	27.5	26.1	4.5	
C25 Páncreas	4.7	7.3	7.9	8.5	15.5	29.6	30.9	39.7	64.3	46.9	12.7	
C30-31 Nariz,senos	2.6	2.8	3.9	3.0	0.7	
C32 Laringe	10.6	2.8	.	.	.	3.3	.	5.2	1.3	
C33-34 Pulmón	12.4	9.4	16.9	18.5	25.5	11.6	23.6	25.3	56.3	59.7	57.3	16.8	
C37-38 Otr.org.torácicos	2.5	0.2	
C40-41 Hueso	2.6	3.3	.	.	0.4	
C43 Melanoma	3.8	2.8	9.5	.	2.5	7.0	9.7	5.3	22.7	23.3	11.8	11.2	29.8	18.4	52.1	10.9		
C45 Mesotelioma	0.2	
C46 S. Kaposi	5.2	.	0.2	
C47,49 Tejidos blandos	.	.	2.5	4.9	4.7	.	.	2.6	.	3.9	.	5.6	9.9	18.4	15.6	3.6	.	
C50 Mama	.	9.5	27.7	51.9	112.6	166.9	161.2	167.2	189.9	133.0	179.8	155.5	165.3	218.9	99.6	.	.	
C51-52,57 Otr.genit.fem.	4.8	.	.	3.9	5.9	5.6	13.2	9.2	10.4	2.7	.	
C53 Cervix	.	2.4	7.6	7.4	7.0	16.9	15.9	11.3	7.8	14.8	16.9	26.5	32.1	10.4	10.2	.	.	
C54-55 Cuerpo útero	.	2.4	2.5	7.4	9.4	12.1	13.2	73.7	65.9	73.9	56.2	76.1	59.7	52.1	27.3	.	.	
C56 Ovario	.	2.4	.	4.9	14.1	19.4	15.9	25.5	42.6	23.6	42.1	29.8	27.5	52.1	16.3	.	.	
C64-65 Riñón	.	.	.	2.5	.	2.4	5.3	8.5	7.8	8.9	22.5	26.5	23.0	31.3	7.0	.	.	
C66-68 Vejiga*	4.7	12.1	5.3	17.0	38.8	14.8	36.5	36.4	27.5	62.5	12.9	.	.	
C69 Ojo	2.8	.	3.0	0.4	
C70-72 S.N.Central**	.	2.8	7.1	2.5	7.4	4.7	12.1	15.9	31.2	27.1	29.6	28.1	26.5	23.0	10.4	13.2	.	
C73 Tiroides	5.1	5.5	4.8	15.1	4.9	4.7	14.5	10.6	2.8	15.5	14.8	5.6	3.3	27.5	31.3	8.9	.	
C74-75 Otr.gl.endocr.	3.0	0.2	
C80,26,39,48,76 Otros	3.8	.	.	2.5	2.5	4.7	14.5	2.6	14.2	19.4	32.5	16.9	89.3	68.9	104.2	18.1	.	
C81 Linfoma Hodgkin	.	5.5	4.8	12.6	.	2.3	.	.	.	3.9	.	3.3	4.6	5.2	2.5	.	.	
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	4.8	2.5	2.5	7.0	7.3	7.9	28.3	27.1	50.2	47.8	49.6	64.3	15.6	17.2	.	
C90 Mieloma múltiple	2.4	2.6	2.8	11.6	5.9	.	3.3	27.5	20.8	3.4	.	
C91-95 Leucemias	6.5	5.1	3.8	2.8	2.4	.	7.4	2.3	9.7	13.2	.	7.8	14.8	16.9	29.8	23.0	46.9	9.7
D45 Policitemia vera	4.6	.	0.2	.	
D46 Sindr. mielodisplásicos	2.3	.	.	.	3.9	.	2.8	3.3	4.6	10.4	1.3	
D47 Otr.tr.hematológicos	2.3	2.4	6.6	.	5.2	0.9	.	

TABLA A.16. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones.
Asturias 2004.Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																	
	00-04	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
C00-D47 Todas local.	17.8	15.0	15.1	36.7	43.6	56.3	104.9	186.2	357.8	630.2	936.1	1606.8	2111.7	2477.8	3220.4	3156.2	2760.5	750.2
C00 Labio	2.5	.	5.9	4.0	14.8	14.2	27.9	31.2	26.4	4.7
C01-02 Lengua	2.5	.	4.9	5.4	11.7	16.0	18.5	14.2	14.0	7.8	.	5.0
C03-06 Boca	2.4	7.4	5.4	5.9	8.0	25.9	10.7	18.6	7.8	13.2	5.0
C07-08 Gl.salivales	2.7	.	8.0	7.4	.	.	15.6	26.4	1.7
C09-14 Faringe	.	.	.	2.8	22.2	45.8	52.7	36.1	33.3	53.3	41.9	23.4	52.8	18.3
C15 Esófago	2.5	4.8	2.5	24.2	20.5	28.0	18.5	46.2	65.2	39.0	.	12.4
C16 Estómago	2.5	4.8	12.3	24.2	20.5	60.1	92.6	128.0	190.8	155.9	211.3	34.4
C17 Intestino delgado	2.5	.	.	4.0	3.7	10.7	14.0	23.4	26.4	2.7
C18 Colon	.	.	.	2.3	.	2.5	7.3	17.3	43.1	81.9	104.2	155.6	209.7	363.0	366.3	383.0	65.4	
C19-21 Recto	2.4	10.0	9.7	7.4	35.0	55.6	80.1	151.9	160.0	232.7	202.6	171.7	46.6	
C22 Hígado	.	3.8	9.7	14.8	18.9	26.3	52.1	70.4	56.9	88.4	77.9	26.4	20.6	
C23-24 Vesícula biliar	5.4	.	8.0	18.5	10.7	27.9	7.8	13.2	3.9	
C25 Páncreas	4.8	14.8	10.8	14.6	36.1	55.6	32.0	51.2	54.6	79.2	14.4	
C30-31 Nariz,senos	2.5	.	2.5	.	.	8.0	3.7	10.7	14.0	15.6	13.2	2.7	
C32 Laringe	2.4	2.5	12.1	29.6	24.2	55.6	64.1	55.6	56.9	46.5	46.8	52.8	22.3	
C33-34 Pulmón	10.0	26.6	88.8	132.0	213.6	264.5	337.1	415.9	488.6	522.1	303.8	125.2	
C37-38 Otr.org.torácicos	4.0	0.2	
C40-41 Hueso	.	3.8	2.8	.	.	.	2.4	9.9	2.7	13.2	1.7	
C43 Melanoma	.	.	5.7	4.6	9.8	10.0	16.9	4.9	5.4	8.8	20.0	18.5	21.3	32.6	23.4	66.0	11.1	
C45 Mesotelioma	5.4	.	4.0	.	.	9.3	15.6	.	1.4	
C46 S. Kaposi	5.0	.	.	2.7	2.9	4.0	3.7	.	14.0	.	.	1.7	
C47,49 Tejidos blandos	2.4	.	.	2.5	5.4	2.9	20.0	3.7	28.4	23.3	31.2	.	5.4	
C50 Mama	2.9	16.0	.	.	4.7	23.4	.	1.7	
C60,63 Otr.genit.mas.	2.9	4.0	7.4	7.1	9.3	7.8	39.6	2.3	
C61 Próstata	4.9	51.2	122.9	400.7	559.4	703.9	665.5	553.3	317.0	145.6	
C62 Testículo	.	.	5.7	9.2	9.8	10.0	9.7	.	2.7	4.7	.	.	3.9	
C64-65 Riñón	.	.	.	2.3	.	.	14.5	14.8	45.8	43.9	52.1	81.5	60.4	60.5	93.5	39.6	24.3	
C66-68 Vejiga*	.	.	2.3	4.9	2.5	14.5	22.2	51.2	84.8	136.2	163.0	234.6	409.5	397.4	409.5	74.0		
C69 Ojo	2.9	4.0	.	3.6	4.7	.	.	0.8	
C70-72 S.N.Central**	5.0	3.8	5.7	4.6	9.8	7.5	7.3	.	16.2	11.7	32.1	33.3	35.5	23.3	62.3	39.6	13.6	
C73 Tiroides	.	.	2.8	2.3	2.4	5.0	4.8	.	.	4.0	3.7	.	4.7	.	.	.	1.9	
C74-75 Otr.gl.endocr.	5.9	.	.	.	2.4	2.5	.	.	.	4.0	.	.	.	7.8	.	.	1.0	
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	2.3	.	.	2.4	24.7	16.2	26.3	48.1	63.0	74.7	79.1	140.3	211.3	24.9	
C81 Linfoma Hodgkin	10.0	3.8	11.3	6.9	.	2.5	.	9.9	13.5	.	4.0	7.4	.	4.7	7.8	.	5.0	
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	4.6	4.9	12.5	14.5	22.2	16.2	26.3	32.1	70.4	35.5	83.8	62.3	66.0	20.8	
C88 S.Mieloproliferat.	2.5	.	4.9	2.7	5.9	4.0	11.1	14.2	27.9	54.6	26.4	0.2	
C90 Mieloma múltiple	2.5	.	4.9	2.7	5.9	4.0	11.1	14.2	27.9	54.6	26.4	5.6	
C91-95 Leucemias	11.9	.	.	2.3	4.9	10.0	16.9	4.9	10.8	8.8	32.1	11.1	14.2	51.2	46.8	92.5	12.4	
D45 Policitemia vera	2.9	.	.	7.1	.	.	.	0.6	
D46 Sindr. mielodisplásicos	5.4	5.9	.	.	9.3	23.4	13.2	1.9		
D47 Otr.tr.hematológicos	2.5	.	8.8	.	7.4	7.1	14.0	7.8	26.4	2.7	

TABLA A.17. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres.
Asturias 2004.Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																			
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total	
C00-D47 Todas local.	38.1	12.6	15.7	16.1	29.1	57.3	79.7	107.6	217.3	386.6	460.7	453.7	684.7	768.5	949.2	1017.6	1310.0	1328.6	422.6	
C00 Labio	3.7	.	2.8	.	8.8	15.2	1.3
C01-02 Lengua	2.4	2.4	2.6	2.7	.	3.1	2.8	6.5	8.8	5.1	2.0	
C03-06 Boca	2.4	2.4	.	2.7	.	6.3	2.8	3.2	4.4	5.1	1.6	
C07-08 Gl.salivales	2.9	.	2.5	2.7	.	3.1	.	3.2	.	.	0.9	
C09-14 Faringe	2.4	2.4	7.9	.	.	.	2.8	.	.	.	1.1	
C15 Esófago	2.5	6.5	22.1	.	1.4	
C16 Estómago	2.4	.	.	2.4	4.7	10.5	10.9	14.8	15.7	36.6	42.0	83.8	162.3	17.5	
C17 Intestino delgado	2.7	.	6.3	8.4	3.2	8.8	10.1	2.0	
C18 Colon	2.4	2.5	7.5	11.8	16.6	23.7	35.5	59.2	66.1	126.7	122.8	154.4	162.3	40.5	
C19-21 Recto	2.4	9.5	18.4	35.5	55.5	66.1	62.0	77.5	75.0	45.6	23.8	
C22 Hígado	2.4	.	.	2.4	4.7	5.3	.	14.8	9.4	8.4	22.6	39.7	35.5	7.0	
C23-24 Vesícula biliar	3.7	3.1	14.1	9.7	8.8	20.3	2.9	.	
C25 Páncreas	5.3	13.7	18.5	9.4	16.9	48.5	57.3	71.0	11.3	.	
C30-31 Nariz,senos	2.5	5.6	.	4.4	.	0.7	
C32 Laringe	4.7	.	2.7	.	.	.	3.2	.	5.1	0.9	
C33-34 Pulmón	2.5	9.4	26.1	18.4	16.4	22.2	28.3	36.6	25.8	48.5	65.9	15.9	.	
C37-38 Otr.org.torácicos	2.4	.	.	.	3.1	0.4	
C40-41 Hueso	.	.	.	4.0	.	2.5	5.0	.	.	2.6	2.8	3.2	4.4	.	1.4	
C43 Melanoma	.	.	.	2.9	2.4	7.5	2.5	4.7	14.2	7.9	16.4	22.2	12.6	22.5	22.6	35.3	35.5	11.3	.	
C45 Mesotelioma	2.7	.	.	5.6	0.5	
C46 S. Kaposi	2.4	0.2	
C47,49 Tejidos blandos	.	.	10.4	.	2.9	2.4	.	2.4	.	5.3	.	11.1	.	11.3	6.5	13.2	10.1	3.8	.	
C50 Mama	.	.	.	2.9	2.4	24.9	50.0	85.0	156.5	184.3	147.6	199.9	182.7	185.9	242.3	194.1	187.6	106.0	.	
C51-52,57 Otr.genit.fem.	2.5	.	.	7.1	2.6	.	3.7	9.4	19.7	9.7	30.9	50.7	6.4	.	
C53 Cervix	7.5	7.5	21.3	14.2	15.8	2.7	11.1	12.6	11.3	9.7	22.1	10.1	8.8	.	
C54-55 Cuerpo útero	4.8	.	7.5	7.1	9.5	21.1	62.9	70.3	97.6	50.7	61.4	57.3	20.3	26.3	.	
C56 Ovario	.	.	.	5.8	.	2.5	5.0	18.9	19.0	23.7	24.6	25.9	18.9	42.2	19.4	39.7	40.6	16.1	.	
C64-65 Riñón	2.4	.	2.5	2.4	4.7	10.5	8.2	29.6	25.2	22.5	19.4	13.2	10.1	8.4	.	
C66-68 Vejiga*	2.5	.	9.4	7.1	7.9	10.9	14.8	25.2	56.3	35.5	75.0	65.9	15.8	.	
C69 Ojo	4.7	5.6	.	.	.	0.7	.	
C70-72 S.N.Central**	12.7	12.6	.	2.9	9.6	5.0	7.5	7.1	11.9	18.4	24.6	14.8	50.4	25.3	35.5	8.8	30.4	15.4	.	
C73 Tiroides	.	.	4.0	.	11.9	5.0	2.5	11.8	9.5	21.1	8.2	14.8	15.7	22.5	9.7	8.8	15.2	9.7	.	
C74-75 Otr.glandocr.	6.3	2.4	2.4	5.1	0.7	.	
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	2.4	.	2.5	2.4	9.5	13.2	5.5	14.8	40.9	53.5	61.4	132.3	147.1	22.9	.	.	
C81 Linfoma Hodgkin	.	5.2	.	2.9	2.4	5.0	.	2.4	.	.	.	7.4	.	2.8	3.2	.	.	2.0	.	
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	4.0	2.9	7.2	5.0	.	2.4	28.5	26.3	5.5	33.3	31.5	59.1	54.9	61.8	30.4	19.5	.	.	
C88 S.Mieloproliferat.	3.1	0.2	.	
C90 Mieloma múltiple	2.5	.	4.7	2.6	.	7.4	18.9	11.3	9.7	48.5	25.4	6.3	.	.	
C91-95 Leucemias	19.0	.	4.0	2.9	2.4	2.5	.	4.7	5.3	5.5	7.4	3.1	11.3	25.8	26.5	15.2	6.6	.		
D45 Policitemia vera	2.7	.	.	.	3.2	.	.	0.2	.	
D46 Sindr. mielodisplásicos	2.4	.	.	.	3.7	.	.	6.5	4.4	20.3	1.4	.		
D47 Otr.tr.hematológicos	2.4	.	.	3.7	.	.	3.2	8.8	5.1	1.1	.		

TABLA A.18. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Asturias 2001-2004.Tasas ajustadas a población europea por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	492.159	496.667	473.178	478.492	521.526
C00 Labio	2.133	1.401	2.256	1.968	2.878
C01-02 Lengua	5.185	6.163	6.203	4.495	3.926
C03-06 Boca	5.381	5.799	5.791	6.325	3.756
C07-08 Gl.salivales	1.053	0.906	0.639	1.362	1.306
C09-14 Faringe	13.454	11.647	13.499	14.117	14.453
C15 Esófago	8.809	9.694	8.116	8.593	8.834
C16 Estómago	21.115	22.393	20.211	19.663	22.340
C17 Intestino delgado	1.239	1.109	1.278	0.912	1.618
C18 Colon	39.330	41.466	33.683	39.775	42.462
C19-21 Recto	26.449	25.550	22.360	26.704	31.131
C22 Hígado	15.216	16.421	14.566	15.279	14.816
C23-24 Vesícula biliar	2.071	2.058	1.835	1.783	2.607
C25 Páncreas	9.841	9.809	8.711	10.607	10.354
C30-31 Nariz,senos	1.496	1.077	0.942	2.091	1.784
C32 Laringe	18.107	18.552	17.645	18.952	17.359
C33-34 Pulmón	86.854	92.289	86.308	80.942	88.050
C37-38 Otr.org.torácicos	0.313	0.312	0.746	.	0.200
C40-41 Hueso	1.830	1.472	2.029	2.149	1.644
C43 Melanoma	5.789	5.368	4.831	4.554	8.464
C45 Mesotelioma	1.096	1.112	1.250	1.088	0.919
C46 S. Kaposi	0.978	0.662	0.536	1.358	1.342
C47,49 Tejidos blandos	3.049	2.502	2.278	3.648	3.677
C50 Mama	1.014	1.318	1.232	0.190	1.304
C60,63 Otr.genit.mas.	1.172	1.513	0.639	1.021	1.546
C61 Próstata	83.757	74.242	78.768	85.137	96.841
C62 Testículo	3.974	4.008	3.709	4.800	3.382
C64-65 Riñón	15.791	14.483	15.657	14.802	18.270
C66-68 Vejiga*	47.385	47.707	50.019	43.369	48.552
C69 Ojo	0.461	0.703	0.564	.	0.576
C70-72 S.N.Central**	10.068	10.931	8.769	10.264	10.370
C73 Tiroides	1.778	1.713	2.143	1.686	1.660
C74-75 Otr.gl.endocr.	0.551	0.904	.	0.183	1.100
C80,26,39,48,76 Otros	19.170	20.489	20.692	18.614	17.030
C81 Linfoma Hodgkin	3.403	3.058	3.128	2.719	4.712
C82-85,96 Otr.Linfomas	14.816	16.485	12.534	15.174	15.264
C88 S.Mieloproliferat.	0.156	.	0.097	0.393	0.148
C90 Mieloma múltiple	3.400	5.284	3.168	1.636	3.500
C91-95 Leucemias	10.676	11.797	12.198	8.862	9.854
D45 Policitemia vera	0.424	0.199	0.720	0.377	0.389
D46 Sindr. mielodisplásicos	1.597	1.624	1.729	1.737	1.280
D47 Otr.tr.hematológicos	1.778	2.445	1.700	1.162	1.830

TABLA A.19. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Asturias 2001-2004.Tasas ajustadas a población europea por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	262.628	267.535	262.228	253.931	267.242
C00 Labio	0.524	0.559	0.549	0.459	0.510
C01-02 Lengua	1.060	1.111	0.950	1.039	1.158
C03-06 Boca	1.301	0.987	1.632	1.640	0.991
C07-08 Gl.salivales	0.532	0.223	0.364	0.833	0.732
C09-14 Faringe	0.852	1.156	0.672	0.634	0.969
C15 Esófago	0.975	1.037	1.589	0.752	0.525
C16 Estómago	8.618	7.794	11.135	7.736	7.827
C17 Intestino delgado	0.971	0.856	0.778	1.339	0.924
C18 Colon	21.187	20.999	20.193	21.902	21.677
C19-21 Recto	11.324	7.139	13.144	10.691	14.288
C22 Hígado	3.820	3.627	3.709	4.354	3.609
C23-24 Vesícula biliar	1.402	1.259	1.543	1.589	1.218
C25 Páncreas	5.413	4.733	4.950	6.692	5.251
C30-31 Nariz,senos	0.449	0.311	0.444	0.667	0.388
C32 Laringe	0.710	0.454	0.715	1.028	0.611
C33-34 Pulmón	10.982	10.459	13.332	10.113	9.940
C37-38 Otr.org.torácicos	0.115	.	.	0.173	0.292
C40-41 Hueso	1.063	2.001	0.811	0.251	1.184
C43 Melanoma	6.888	6.965	5.646	7.471	7.383
C45 Mesotelioma	0.216	0.232	0.276	.	0.333
C46 S. Kaposi	0.116	0.248	.	0.052	0.166
C47,49 Tejidos blandos	2.316	2.115	2.409	1.937	2.892
C50 Mama	75.921	81.952	71.742	74.282	75.821
C51-52,57 Otr.genit.fem.	2.590	2.932	2.992	1.398	3.021
C53 Cervix	7.525	7.160	9.177	7.122	6.715
C54-55 Cuerpo útero	19.164	21.427	18.818	18.286	18.212
C56 Ovario	11.690	14.615	9.713	11.226	11.226
C64-65 Ríñón	4.940	5.209	5.026	3.710	5.854
C66-68 Vejiga*	7.693	6.459	8.347	7.818	8.100
C69 Ojo	0.420	0.812	0.053	0.288	0.501
C70-72 S.N.Central**	10.276	7.849	11.122	9.787	12.354
C73 Tiroides	7.141	8.058	6.091	6.920	7.579
C74-75 Otr.gl.endocr.	0.350	.	0.365	0.118	0.890
C80,26,39,48,76 Otros	10.325	11.743	9.890	9.288	10.426
C81 Linfoma Hodgkin	2.382	2.029	3.559	2.122	1.770
C82-85,96 Otr.Linfomas	9.943	8.132	8.775	10.529	12.384
C88 S.Mieloproliferat.	0.091	0.248	.	.	0.126
C90 Mieloma múltiple	3.102	3.863	3.701	1.892	3.088
C91-95 Leucemias	6.405	8.429	5.411	6.567	5.147
D45 Policitemia vera	0.057	.	0.115	0.046	0.065
D46 Sindr. mielodisplásicos	0.757	0.968	0.846	0.659	0.540
D47 Otr.tr.hematológicos	1.022	1.387	1.645	0.518	0.554

TABLA A.20. Incidencia de cáncer. Media de casos y porcentaje medio de cambio de las tasas ajustadas a población europea. Varones. Asturias 2001-2004.

CIE10 Localización		Media de casos	% Medio de cambio	Valor p	Significación estadística (P<0.05)
C00-D47	Todas local.	3574.25	1.589	0.5363	
C00	Labio	18.00	22.419	0.1307	
C01-02	Lengua	33.25	-15.42	0.0595	
C03-06	Boca	34.25	-11.44	0.3328	
C07-08	Gl.salivales	8.00	20.358	0.3248	
C09-14	Faringe	83.25	7.169	0.0772	
C15	Esófago	59.75	-2.190	0.6144	
C16	Estómago	157.75	-0.346	0.9337	
C17	Intestino delgado	9.75	8.295	0.5739	
C18	Colon	307.00	2.403	0.7067	
C19-21	Recto	197.25	8.007	0.2711	
C22	Hígado	111.00	-2.573	0.3647	
C23-24	Vesícula biliar	16.50	7.045	0.4914	
C25	Páncreas	70.50	3.658	0.4713	
C30-31	Nariz,senos	10.50	25.994	0.2257	
C32	Laringe	116.25	-1.272	0.6000	
C33-34	Pulmón	629.00	-2.032	0.5129	
C37-38	Otr.org.torácicos	2.67	-19.78	0.6642	
C40-41	Hueso	9.75	3.965	0.7173	
C43	Melanoma	38.00	13.964	0.3996	
C45	Mesotelioma	7.75	-6.856	0.2761	
C46	S. Kaposi	6.00	35.642	0.1806	
C47,49	Tejidos blandos	20.50	17.647	0.1606	
C50	Mama	7.00	-17.32	0.7433	
C60,63	Otr.genit.mas.	8.75	5.461	0.8346	
C61	Próstata	651.50	9.144	0.0161	*
C62	Testículo	22.25	-2.479	0.7820	
C64-65	Riñón	108.75	6.617	0.2106	
C66-68	Vejiga*	357.25	-0.896	0.8115	
C69	Ojo	4.33	-5.404	0.5094	
C70-72	S.N.Central**	65.00	-0.006	0.9992	
C73	Tiroides	11.50	-3.290	0.6414	
C74-75	Otr.gl.endocr.	3.00	-5.658	0.9424	
C80,26,39,48,76	Otros	144.50	-6.394	0.0684	
C81	Linfoma Hodgkin	18.75	12.264	0.3778	
C82-85,96	Otr.Linfomas	100.75	-0.397	0.9560	
C88	S.Mieloproliferat.	1.33	23.316	0.8109	
C90	Mieloma múltiple	26.75	-17.28	0.4957	
C91-95	Leucemias	70.25	-8.236	0.2661	
D45	Policitemia vera	3.00	14.637	0.6642	
D46	Sindr. mielodisplásicos	12.50	-6.855	0.3637	
D47	Otr.tr.hematológicos	13.25	-11.75	0.4733	

TABLA A.21. Incidencia de cáncer. Media de casos y porcentaje medio de cambio de las tasas ajustadas a población europea. Mujeres. Asturias 2001-2004.

CIE10 Localización	Media de casos	% Medio de cambio	Valor p	Significación Estadística (P<0.05)
C00-D47 Todas local.	2283.50	-0.354	0.8123	
C00 Labio	6.00	-4.422	0.3456	
C01-02 Lengua	9.25	2.159	0.6810	
C03-06 Boca	11.25	0.165	0.9927	
C07-08 Gl.salivales	4.50	55.186	0.0816	
C09-14 Faringe	5.75	-5.731	0.7365	
C15 Esófago	9.50	-24.35	0.2357	
C16 Estómago	103.00	-3.453	0.7465	
C17 Intestino delgado	10.00	8.040	0.5802	
C18 Colon	221.75	1.781	0.3769	
C19-21 Recto	107.00	20.623	0.2184	
C22 Hígado	42.75	1.462	0.7901	
C23-24 Vesícula biliar	19.75	-0.679	0.9357	
C25 Páncreas	61.25	6.324	0.4871	
C30-31 Nariz,senos	3.75	11.288	0.5704	
C32 Laringe	5.00	13.378	0.5236	
C33-34 Pulmón	94.00	-4.197	0.5961	
C37-38 Otr.org.torácicos	1.50	68.748	.	*
C40-41 Hueso	5.75	-24.02	0.5976	
C43 Melanoma	58.25	4.656	0.5482	
C45 Mesotelioma	3.00	12.397	0.1083	
C46 S. Kaposi	1.33	-20.24	0.7195	
C47,49 Tejidos blandos	19.00	7.477	0.4659	
C50 Mama	568.25	-1.965	0.5453	
C51-52,57 Otr.genit.fem.	27.50	-6.494	0.7712	
C53 Cervix	55.50	-4.363	0.5850	
C54-55 Cuerpo útero	155.50	-5.032	0.1292	
C56 Ovario	91.75	-6.263	0.5098	
C64-65 Riñón	43.25	0.470	0.9689	
C66-68 Vejiga*	79.75	6.333	0.3135	
C69 Ojo	3.25	2.529	0.9729	
C70-72 S.N.Central**	77.75	13.121	0.1849	
C73 Tiroides	48.50	-0.562	0.9402	
C74-75 Otr.gl.endocr.	2.33	56.198	0.7094	
C80,26,39,48,76 Otros	117.75	-4.109	0.4554	
C81 Linfoma Hodgkin	14.50	-8.860	0.6088	
C82-85,96 Otr.Linfomas	91.50	15.534	0.0125	*
C88 S.Mieloproliferat.	2.00	-20.20	.	*
C90 Mieloma múltiple	33.50	-12.56	0.4701	
C91-95 Leucemias	51.25	-12.07	0.2584	
D45 Policitemia vera	1.33	-25.17	0.5723	
D46 Sindr. mielodisplásicos	9.00	-18.12	0.0060	*
D47 Otr.tr.hematológicos	9.75	-32.36	0.1633	

TABLA A.22. Riesgo de padecer un cáncer entre 0-74 años según localización y año de incidencia en varones. Asturias 2001-2004.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	0.3316	0.3339	0.3187	0.3253	0.3494
C00 Labio	0.0014	0.0009	0.0015	0.0010	0.0021
C01-02 Lengua	0.0046	0.0055	0.0051	0.0043	0.0037
C03-06 Boca	0.0041	0.0040	0.0045	0.0046	0.0033
C07-08 Gl.salivales	0.0008	0.0008	0.0002	0.0015	0.0009
C09-14 Faringe	0.0112	0.0092	0.0114	0.0120	0.0122
C15 Esófago	0.0080	0.0093	0.0070	0.0084	0.0073
C16 Estómago	0.0165	0.0167	0.0154	0.0168	0.0171
C17 Intestino delgado	0.0009	0.0009	0.0012	0.0006	0.0010
C18 Colon	0.0306	0.0317	0.0280	0.0323	0.0307
C19-21 Recto	0.0224	0.0222	0.0180	0.0243	0.0253
C22 Hígado	0.0132	0.0145	0.0129	0.0131	0.0126
C23-24 Vesícula biliar	0.0015	0.0016	0.0015	0.0009	0.0021
C25 Páncreas	0.0079	0.0080	0.0065	0.0087	0.0084
C30-31 Nariz,senos	0.0014	0.0013	0.0009	0.0018	0.0014
C32 Laringe	0.0158	0.0151	0.0153	0.0179	0.0150
C33-34 Pulmón	0.0696	0.0749	0.0680	0.0640	0.0717
C37-38 Otr.org.torácicos	0.0002	0.0003	0.0005		0.0002
C40-41 Hueso	0.0014	0.0012	0.0015	0.0017	0.0011
C43 Melanoma	0.0044	0.0046	0.0036	0.0034	0.0063
C45 Mesotelioma	0.0007	0.0006	0.0010	0.0008	0.0005
C46 S. Kaposi	0.0008	0.0005	0.0004	0.0012	0.0009
C47,49 Tejidos blandos	0.0026	0.0022	0.0024	0.0026	0.0033
C50 Mama	0.0009	0.0012	0.0012	0.0002	0.0009
C60,63 Otr.genit.mas.	0.0009	0.0009	0.0007	0.0008	0.0011
C61 Próstata	0.0714	0.0620	0.0654	0.0703	0.0880
C62 Testículo	0.0028	0.0029	0.0026	0.0034	0.0023
C64-65 Riñón	0.0134	0.0121	0.0135	0.0123	0.0156
C66-68 Vejiga*	0.0345	0.0358	0.0365	0.0305	0.0352
C69 Ojo	0.0004	0.0005	0.0004		0.0005
C70-72 S.N.Central**	0.0087	0.0097	0.0083	0.0084	0.0086
C73 Tiroides	0.0014	0.0010	0.0018	0.0016	0.0013
C74-75 Otr.gl.endocr.	0.0004	0.0007		0.0002	0.0007
C80,26,39,48,76 Otros	0.0135	0.0152	0.0135	0.0126	0.0128
C81 Linfoma Hodgkin	0.0025	0.0024	0.0023	0.0020	0.0035
C82-85,96 Otr.Linfomas	0.0114	0.0121	0.0097	0.0121	0.0119
C88 S.Mieloproliferat.	0.0001			0.0004	0.0002
C90 Mieloma múltiple	0.0024	0.0041	0.0022	0.0008	0.0023
C91-95 Leucemias	0.0077	0.0088	0.0087	0.0069	0.0064
D45 Policitemia vera	0.0004	0.0002	0.0007	0.0003	0.0005
D46 Sindr. mielodisplásicos	0.0010	0.0016	0.0010	0.0009	0.0006
D47 Otr.tr.hematológicos	0.0014	0.0020	0.0015	0.0009	0.0013

TABLA A.23. Riesgo de padecer un cáncer entre 0-74 años según localización y año de incidencia en mujeres. Asturias 2001-2004.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	0.1866	0.1882	0.1852	0.1809	0.1925
C00 Labio	0.0004	0.0006	0.0005	0.0003	0.0003
C01-02 Lengua	0.0007	0.0008	0.0005	0.0008	0.0008
C03-06 Boca	0.0010	0.0007	0.0014	0.0011	0.0008
C07-08 Gl.salivales	0.0004	0.0001	0.0003	0.0006	0.0006
C09-14 Faringe	0.0007	0.0009	0.0004	0.0005	0.0008
C15 Esófago	0.0007	0.0008	0.0012	0.0005	0.0001
C16 Estómago	0.0057	0.0047	0.0074	0.0057	0.0049
C17 Intestino delgado	0.0009	0.0008	0.0005	0.0014	0.0009
C18 Colon	0.0157	0.0143	0.0150	0.0162	0.0175
C19-21 Recto	0.0093	0.0051	0.0109	0.0089	0.0124
C22 Hígado	0.0029	0.0027	0.0030	0.0036	0.0024
C23-24 Vesícula biliar	0.0009	0.0008	0.0008	0.0010	0.0010
C25 Páncreas	0.0036	0.0033	0.0027	0.0052	0.0032
C30-31 Nariz,senos	0.0004	0.0002	0.0004	0.0006	0.0004
C32 Laringe	0.0005	0.0004	0.0005	0.0007	0.0004
C33-34 Pulmón	0.0088	0.0090	0.0110	0.0071	0.0080
C37-38 Otr.org.torácicos	0.0001	.	.	0.0001	0.0003
C40-41 Hueso	0.0007	0.0015	0.0005	0.0001	0.0008
C43 Melanoma	0.0052	0.0054	0.0042	0.0055	0.0058
C45 Mesotelioma	0.0002	0.0002	0.0001	.	0.0004
C46 S. Kaposi	0.0001	0.0001	.	.	0.0001
C47,49 Tejidos blandos	0.0016	0.0013	0.0017	0.0012	0.0023
C50 Mama	0.0595	0.0650	0.0554	0.0582	0.0593
C51-52,57 Otr.genit.fem.	0.0018	0.0021	0.0017	0.0010	0.0023
C53 Cervix	0.0059	0.0058	0.0073	0.0054	0.0052
C54-55 Cuerpo útero	0.0168	0.0194	0.0159	0.0157	0.0164
C56 Ovario	0.0097	0.0112	0.0087	0.0095	0.0093
C64-65 Riñón	0.0042	0.0040	0.0043	0.0029	0.0054
C66-68 Vejiga*	0.0060	0.0043	0.0066	0.0064	0.0067
C69 Ojo	0.0004	0.0007	.	0.0003	0.0005
C70-72 S.N.Central**	0.0087	0.0068	0.0096	0.0084	0.0101
C73 Tiroides	0.0056	0.0061	0.0049	0.0052	0.0063
C74-75 Otr.gl.endocr.	0.0003	.	0.0003	0.0001	0.0006
C80,26,39,48,76 Otros	0.0069	0.0077	0.0070	0.0057	0.0072
C81 Linfoma Hodgkin	0.0018	0.0019	0.0026	0.0015	0.0014
C82-85,96 Otr.Linfomas	0.0081	0.0064	0.0067	0.0092	0.0102
C88 S.Mieloproliferat.	0.0001	0.0003	.	.	0.0002
C90 Mieloma múltiple	0.0023	0.0027	0.0030	0.0013	0.0024
C91-95 Leucemias	0.0047	0.0062	0.0043	0.0046	0.0034
D46 Sindr. mielodisplásicos	0.0004	0.0006	0.0002	0.0005	0.0001
D47 Otr.tr.hematológicos	0.0007	0.0009	0.0012	0.0002	0.0003

TABLA A.24. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud I. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	730	189	183	160	198
C00 Labio	5	.	1	1	3
C01-02 Lengua	8	1	5	.	2
C03-06 Boca	5	.	1	1	3
C09-14 Faringe	17	5	3	3	6
C15 Esófago	9	5	1	1	2
C16 Estómago	31	4	9	7	11
C17 Intestino delgado	2	1	1	.	.
C18 Colon	43	14	9	13	7
C19-21 Recto	43	11	6	7	19
C22 Hígado	16	1	8	5	2
C23-24 Vesícula biliar	2	1	.	.	1
C25 Páncreas	22	4	6	8	4
C30-31 Nariz;senos	4	1	1	.	2
C32 Laringe	21	5	6	4	6
C33-34 Pulmón	145	42	36	30	37
C40-41 Hueso	3	1	2	.	.
C43 Melanoma	9	4	4	.	1
C47,49 Tejidos blandos	6	1	1	1	3
C50 Mama	1	.	1	.	.
C60,63 Otr.genit.mas.	5	2	1	.	2
C61 Próstata	125	27	36	28	34
C62 Testículo	3	1	.	2	.
C64-65 Riñón	19	7	5	3	4
C66-68 Vejiga*	63	16	16	15	16
C70-72 S.N.Central**	15	6	2	3	4
C73 Tiroides	2	1	.	.	1
C80,26,39,48,76 Otros	51	13	12	15	11
C81 Linfoma Hodgkin	3	.	1	.	2
C82-85,96 Otr.Linfomas	24	8	3	5	8
C90 Mieloma múltiple	1	.	1	.	.
C91-95 Leucemias	13	2	4	2	5
D46 Sindr. mielodisplásicos	6	1	.	4	1
D47 Otr.tr.hematológicos	8	4	1	2	1

TABLA A.25. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud I. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	454	122	103	96	133
C00 Labio	2	.	1	1	.
C01-02 Lengua	1	.	1	.	.
C03-06 Boca	2	.	.	1	1
C15 Esófago	3	2	1	.	.
C16 Estómago	20	5	5	3	7
C17 Intestino delgado	2	.	.	.	2
C18 Colon	41	17	8	9	7
C19-21 Recto	19	5	3	5	6
C22 Hígado	4	2	1	1	.
C23-24 Vesícula biliar	5	.	1	3	1
C25 Páncreas	9	1	6	1	1
C30-31 Nariz,senos	2	1	.	.	1
C33-34 Pulmón	19	7	6	.	6
C40-41 Hueso	1	.	1	.	.
C43 Melanoma	9	2	3	3	1
C45 Mesotelioma	1	.	.	.	1
C47,49 Tejidos blandos	4	2	.	1	1
C50 Mama	101	26	27	26	22
C51-52,57 Otr.genit.fem.	6	2	1	1	2
C53 Cervix	4	1	1	1	1
C54-55 Cuerpo útero	40	10	10	10	10
C56 Ovario	25	10	6	3	6
C64-65 Riñón	11	6	2	2	1
C66-68 Vejiga*	12	3	1	3	5
C69 Ojo	1	.	.	.	1
C70-72 S.N.Central**	18	2	1	4	11
C73 Tiroides	6	.	2	.	4
C80,26,39,48,76 Otros	34	7	3	6	18
C81 Linfoma Hodgkin	1	.	.	.	1
C82-85,96 Otr.Linfomas	25	3	7	5	10
C90 Mieloma múltiple	12	2	4	2	4
C91-95 Leucemias	7	3	.	3	1
D46 Sindr. mielodisplásicos	3	1	.	2	.
D47 Otr.tr.hematológicos	4	2	1	.	1

TABLA A.26. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud II. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	597	148	164	119	166
C00 Labio	6	.	.	2	4
C01-02 Lengua	6	2	1	1	2
C03-06 Boca	6	1	1	3	1
C07-08 Gl.salivales	3	.	2	.	1
C09-14 Faringe	8	4	2	1	1
C15 Esófago	13	7	1	3	2
C16 Estómago	16	5	3	4	4
C17 Intestino delgado	2	1	.	.	1
C18 Colon	27	8	7	4	8
C19-21 Recto	41	6	10	10	15
C22 Hígado	18	3	5	5	5
C25 Páncreas	12	5	4	.	3
C30-31 Nariz,senos	1	1	.	.	.
C32 Laringe	9	2	2	4	1
C33-34 Pulmón	95	24	29	19	23
C43 Melanoma	6	1	2	1	2
C45 Mesotelioma	1	.	1	.	.
C47,49 Tejidos blandos	7	1	2	3	1
C50 Mama	2	.	2	.	.
C60,63 Otr.genit.mas.	1	.	1	.	.
C61 Próstata	186	36	55	36	59
C62 Testículo	2	1	.	.	1
C64-65 Riñón	4	.	1	.	3
C66-68 Vejiga*	53	18	13	9	13
C70-72 S.N.Central**	5	3	1	1	.
C73 Tiroides	1	.	1	.	.
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	.	.	.	1
C80,26,39,48,76 Otros	26	8	10	6	2
C81 Linfoma Hodgkin	2	1	.	.	1
C82-85,96 Otr.Linfomas	13	3	3	1	6
C88 S.Mieloproliferat.	1	.	.	1	.
C90 Mieloma múltiple	3	1	.	1	1
C91-95 Leucemias	11	3	3	3	2
D45 Policitemia vera	2	.	1	.	1
D46 Sindr. mielodisplásicos	4	1	1	1	1
D47 Otr.tr.hematológicos	3	2	.	.	1

TABLA A.27. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud II. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	292	70	74	75	73
C00 Labio	2	.	.	1	1
C01-02 Lengua	2	.	.	1	1
C03-06 Boca	1	.	.	1	.
C07-08 Gl.salivales	1	.	.	1	.
C15 Esófago	1	.	1	.	.
C16 Estómago	12	4	5	1	2
C17 Intestino delgado	3	2	.	.	1
C18 Colon	23	5	7	8	3
C19-21 Recto	14	2	5	2	5
C22 Hígado	4	1	.	2	1
C23-24 Vesícula biliar	2	.	1	1	.
C25 Páncreas	5	1	1	2	1
C33-34 Pulmón	15	5	6	1	3
C43 Melanoma	4	.	.	3	1
C45 Mesotelioma	1	1	.	.	.
C47,49 Tejidos blandos	5	3	1	1	.
C50 Mama	68	21	18	13	16
C51-52,57 Otr.genit.fem.	5	.	1	4	.
C53 Cervix	7	2	1	2	2
C54-55 Cuerpo útero	29	3	6	7	13
C56 Ovario	13	6	4	2	1
C64-65 Riñón	2	.	1	.	1
C66-68 Vejiga*	7	1	.	2	4
C70-72 S.N.Central**	9	.	3	3	3
C73 Tiroides	13	3	3	2	5
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	.	.	.	1
C80,26,39,48,76 Otros	20	6	6	7	1
C81 Linfoma Hodgkin	2	1	1	.	.
C82-85,96 Otr.Linfomas	11	.	2	7	2
C90 Mieloma múltiple	1	.	.	.	1
C91-95 Leucemias	8	2	1	1	4
D47 Otr.tr.hematológicos	1	1	.	.	.

TABLA A.28. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud III. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	2120	518	514	544	544
C00 Labio	14	2	4	3	5
C01-02 Lengua	20	7	5	7	1
C03-06 Boca	21	6	6	6	3
C07-08 Gl.salivales	7	2	.	3	2
C09-14 Faringe	33	5	9	8	11
C15 Esófago	26	6	5	6	9
C16 Estómago	82	24	22	17	19
C17 Intestino delgado	2	.	.	.	2
C18 Colon	190	52	42	44	52
C19-21 Recto	137	27	31	31	48
C22 Hígado	61	21	9	12	19
C23-24 Vesícula biliar	12	.	3	5	4
C25 Páncreas	41	9	10	12	10
C30-31 Nariz,senos	5	2	.	1	2
C32 Laringe	74	11	15	28	20
C33-34 Pulmón	399	97	111	99	92
C40-41 Hueso	7	2	1	1	3
C43 Melanoma	23	5	5	6	7
C45 Mesotelioma	6	2	2	1	1
C46 S. Kaposi	1	1	.	.	.
C47,49 Tejidos blandos	13	1	2	6	4
C50 Mama	7	2	2	2	1
C60,63 Otr.genit.mas.	7	1	.	2	4
C61 Próstata	354	77	86	95	96
C62 Testículo	10	.	4	5	1
C64-65 Riñón	60	15	17	15	13
C66-68 Vejiga*	246	68	54	62	62
C69 Ojo	2	1	1	.	.
C70-72 S.N.Central**	33	7	13	4	9
C73 Tiroides	8	3	2	2	1
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	.	.	.	1
C80,26,39,48,76 Otros	86	18	27	20	21
C81 Linfoma Hodgkin	10	1	3	5	1
C82-85,96 Otr.Linfomas	63	17	11	21	14
C90 Mieloma múltiple	13	7	2	3	1
C91-95 Leucemias	34	15	6	8	5
D45 Policitemia vera	2	.	2	.	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	6	3	2	1	.
D47 Otr.tr.hematológicos	4	1	.	3	.

TABLA A.29. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud III. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	1205	295	297	305	308
C00 Labio	3	.	2	.	1
C01-02 Lengua	6	2	2	1	1
C03-06 Boca	8	1	4	2	1
C07-08 Gl.salivales	2	.	1	.	1
C09-14 Faringe	10	4	2	2	2
C15 Esófago	12	3	2	3	4
C16 Estómago	54	15	18	11	10
C17 Intestino delgado	6	1	2	1	2
C18 Colon	111	29	22	36	24
C19-21 Recto	67	12	14	20	21
C22 Hígado	25	8	7	4	6
C23-24 Vesícula biliar	9	2	.	3	4
C25 Páncreas	36	7	8	14	7
C30-31 Nariz,senos	1	1	.	.	.
C32 Laringe	1	.	1	.	.
C33-34 Pulmón	46	10	14	15	7
C37-38 Otr.org.torácicos	1	.	.	.	1
C40-41 Hueso	6	1	.	2	3
C43 Melanoma	28	8	4	7	9
C45 Mesotelioma	2	.	1	.	1
C47,49 Tejidos blandos	13	2	1	5	5
C50 Mama	284	76	58	65	85
C51-52,57 Otr.genit.fem.	18	.	6	2	10
C53 Cervix	34	10	10	7	7
C54-55 Cuerpo útero	85	25	21	21	18
C56 Ovario	47	12	9	10	16
C64-65 Riñón	20	7	4	3	6
C66-68 Vejiga*	35	10	12	10	3
C69 Ojo	1	.	.	1	.
C70-72 S.N.Central**	38	7	14	7	10
C73 Tiroides	18	3	7	6	2
C74-75 Otr.gi.endocr.	2	.	.	1	1
C80,26,39,48,76 Otros	70	16	21	18	15
C81 Linfoma Hodgkin	6	.	6	.	.
C82-85,96 Otr.Linfomas	47	6	9	16	16
C90 Mieloma múltiple	20	9	6	2	3
C91-95 Leucemias	26	6	8	9	3
D45 Policitemia vera	1	.	1	.	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	2	.	.	1	1
D47 Otr.tr.hematológicos	4	2	.	.	2

TABLA A.30. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud IV. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	4285	1027	980	1053	1225
C00 Labio	19	4	4	7	4
C01-02 Lengua	39	10	10	8	11
C03-06 Boca	43	15	8	13	7
C07-08 Gl.salivales	12	2	3	3	4
C09-14 Faringe	101	25	24	21	31
C15 Esófago	68	22	16	13	17
C16 Estómago	187	51	45	40	51
C17 Intestino delgado	14	3	2	3	6
C18 Colon	359	97	74	94	94
C19-21 Recto	226	52	49	63	62
C22 Hígado	118	30	31	30	27
C23-24 Vesícula biliar	20	3	6	5	6
C25 Páncreas	93	20	23	25	25
C30-31 Nariz,senos	15	3	4	3	5
C32 Laringe	134	39	32	26	37
C33-34 Pulmón	674	178	164	153	179
C37-38 Otr.org.torácicos	1	1	.	.	.
C40-41 Hueso	10	2	4	4	.
C43 Melanoma	47	7	10	7	23
C45 Mesotelioma	6	2	2	1	1
C46 S. Kaposi	11	1	.	4	6
C47,49 Tejidos blandos	25	3	5	7	10
C50 Mama	5	1	2	.	2
C60,63 Otr.genit.mas.	7	2	2	1	2
C61 Próstata	877	168	190	252	267
C62 Testículo	25	6	10	6	3
C64-65 Riñón	136	26	31	33	46
C66-68 Vejiga*	474	115	105	103	151
C69 Ojo	2	.	.	.	2
C70-72 S.N.Central**	76	19	10	24	23
C73 Tiroides	13	4	7	1	1
C74-75 Otr.gl.endocr.	2	1	.	1	.
C80,26,39,48,76 Otros	130	40	31	37	22
C81 Linfoma Hodgkin	27	4	6	3	14
C82-85,96 Otr.Linfomas	105	27	18	32	28
C88 S.Mieloproliferat.	1	.	1	.	.
C90 Mieloma múltiple	42	15	8	3	16
C91-95 Leucemias	103	22	34	20	27
D45 Policitemia vera	5	.	1	3	1
D46 Sindr. mielodisplásicos	13	3	4	1	5
D47 Otr.tr.hematológicos	20	4	4	3	9

TABLA A.31. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud IV. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	2779	679	680	673	747
C00 Labio	9	3	1	3	2
C01-02 Lengua	11	6	.	1	4
C03-06 Boca	10	1	1	5	3
C07-08 Gl.salivales	7	3	.	3	1
C09-14 Faringe	8	3	2	1	2
C15 Esófago	6	1	4	1	.
C16 Estómago	124	26	39	22	37
C17 Intestino delgado	12	3	2	4	3
C18 Colon	283	68	68	62	85
C19-21 Recto	130	25	38	29	38
C22 Hígado	41	6	11	15	9
C23-24 Vesícula biliar	24	7	6	7	4
C25 Páncreas	81	15	20	21	25
C30-31 Nariz,senos	7	1	3	2	1
C32 Laringe	9	2	1	5	1
C33-34 Pulmón	100	24	25	25	26
C40-41 Hueso	4	3	.	.	1
C43 Melanoma	62	16	16	13	17
C45 Mesotelioma	2	1	.	.	1
C46 S. Kaposi	2	.	.	1	1
C47,49 Tejidos blandos	24	2	9	7	6
C50 Mama	729	173	165	193	198
C51-52,57 Otr.genit.fem.	31	9	8	3	11
C53 Cervix	64	17	16	20	11
C54-55 Cuerpo útero	180	54	40	38	48
C56 Ovario	124	32	22	39	31
C64-65 Riñón	51	8	11	16	16
C66-68 Vejiga*	105	24	35	22	24
C69 Ojo	3	2	.	1	.
C70-72 S.N.Central**	82	20	26	21	15
C73 Tiroides	51	15	8	11	17
C74-75 Otr.gl.endocr.	2	.	.	.	2
C80,26,39,48,76 Otros	138	44	36	22	36
C81 Linfoma Hodgkin	24	5	3	10	6
C82-85,96 Otr.Linfomas	102	18	28	20	36
C90 Mieloma múltiple	36	10	9	6	11
C91-95 Leucemias	69	22	18	17	12
D45 Policitemia vera	1	.	.	1	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	17	6	5	2	4
D47 Otr.tr.hematológicos	14	4	4	4	2

TABLA A.32. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud V. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	3595	921	848	900	926
C00 Labio	20	5	6	4	5
C01-02 Lengua	36	9	10	9	8
C03-06 Boca	33	7	13	7	6
C07-08 Gl.salivales	6	2	.	3	1
C09-14 Faringe	89	19	27	25	18
C15 Esófago	65	17	19	12	17
C16 Estómago	146	39	27	39	41
C17 Intestino delgado	8	1	4	1	2
C18 Colon	336	88	71	92	85
C19-21 Recto	194	44	40	55	55
C22 Hígado	124	39	20	33	32
C23-24 Vesícula biliar	14	4	3	4	3
C25 Páncreas	54	15	8	18	13
C30-31 Nariz,senos	10	1	.	6	3
C32 Laringe	117	35	28	32	22
C33-34 Pulmón	680	167	167	171	175
C37-38 Otr.org.torácicos	6	1	4	.	1
C40-41 Hueso	11	1	3	2	5
C43 Melanoma	43	14	6	8	15
C45 Mesotelioma	11	3	1	4	3
C46 S. Kaposi	6	1	3	1	1
C47,49 Tejidos blandos	13	3	2	2	6
C50 Mama	7	4	1	.	2
C60,63 Otr.genit.mas.	10	3	.	3	4
C61 Próstata	617	160	139	150	168
C62 Testículo	30	8	3	11	8
C64-65 Riñón	128	28	37	27	36
C66-68 Vejiga*	301	83	85	60	73
C69 Ojo	7	4	2	.	1
C70-72 S.N.Central**	72	16	22	17	17
C73 Tiroides	14	3	1	5	5
C74-75 Otr.gl.endocr.	4	2	.	.	2
C80,26,39,48,76 Otros	153	41	41	37	34
C81 Linfoma Hodgkin	22	5	6	6	5
C82-85,96 Otr.Linfomas	99	23	24	27	25
C88 S.Mieloproliferat.	1	.	.	.	1
C90 Mieloma múltiple	32	9	9	6	8
C91-95 Leucemias	59	11	12	19	17
D45 Policitemia vera	2	1	1	.	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	10	2	2	4	2
D47 Otr.tr.hematológicos	5	3	1	.	1

TABLA A.33. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud V. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	2458	628	596	616	618
C00 Labio	4	1	1	.	2
C01-02 Lengua	6	2	.	2	2
C03-06 Boca	16	6	4	4	2
C07-08 Gl.salivales	2	.	.	2	.
C09-14 Faringe	3	1	.	1	1
C15 Esófago	6	2	.	2	2
C16 Estómago	101	26	29	27	19
C17 Intestino delgado	9	1	1	6	1
C18 Colon	232	59	53	65	55
C19-21 Recto	119	15	36	32	36
C22 Hígado	56	14	14	17	11
C23-24 Vesícula biliar	16	4	4	6	2
C25 Páncreas	62	12	13	21	16
C30-31 Nariz,senos	3	.	1	2	.
C32 Laringe	5	1	1	1	2
C33-34 Pulmón	126	29	36	33	28
C37-38 Otr.org.torácicos	1	.	.	.	1
C40-41 Hueso	7	3	2	.	2
C43 Melanoma	78	26	20	17	15
C45 Mesotelioma	2	.	2	.	.
C47,49 Tejidos blandos	16	5	2	4	5
C50 Mama	619	164	140	155	160
C51-52,57 Otr.genit.fem.	20	5	5	4	6
C53 Cervix	70	18	18	17	17
C54-55 Cuerpo útero	170	51	41	42	36
C56 Ovario	92	27	22	18	25
C64-65 Riñón	58	13	20	12	13
C66-68 Vejiga*	68	13	16	13	26
C69 Ojo	5	3	1	.	1
C70-72 S.N.Central**	97	19	26	23	29
C73 Tiroides	70	16	11	24	19
C74-75 Otr.gl.endocr.	2	.	2	.	.
C80,26,39,48,76 Otros	112	30	20	28	34
C81 Linfoma Hodgkin	18	6	8	3	1
C82-85,96 Otr.Linfomas	90	29	21	17	23
C88 S.Mieloproliferat.	1	1	.	.	.
C90 Mieloma múltiple	34	11	7	5	11
C91-95 Leucemias	44	11	10	11	12
D45 Policitemia vera	1	.	.	.	1
D46 Sindr. mielodisplásicos	8	1	4	1	2
D47 Otr.tr.hematológicos	9	3	5	1	.

TABLA A.34. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud VI. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	787	164	208	200	215
C00 Labio	2	1	.	.	1
C01-02 Lengua	2	1	.	.	1
C03-06 Boca	8	3	3	2	.
C09-14 Faringe	21	2	5	1	13
C15 Esófago	17	2	3	6	6
C16 Estómago	39	6	5	12	16
C17 Intestino delgado	3	.	1	.	2
C18 Colon	43	4	10	15	14
C19-21 Recto	31	9	9	7	6
C22 Hígado	28	5	12	7	4
C23-24 Vesícula biliar	3	2	.	1	.
C25 Páncreas	21	3	4	6	8
C30-31 Nariz,senos	1	.	.	1	.
C32 Laringe	26	6	7	8	5
C33-34 Pulmón	159	46	39	36	38
C43 Melanoma	4	.	.	2	2
C45 Mesotelioma	1	.	.	.	1
C46 S. Kaposi	1	.	.	1	.
C47,49 Tejidos blandos	3	1	.	.	2
C60,63 Otr.genit.mas.	2	.	1	1	.
C61 Próstata	147	32	35	41	39
C62 Testículo	6	1	3	.	2
C64-65 Riñón	22	3	5	8	6
C66-68 Vejiga*	85	13	32	22	18
C69 Ojo	1	.	1	.	.
C70-72 S.N.Central**	21	5	5	4	7
C73 Tiroides	4	.	1	2	1
C80,26,39,48,76 Otros	36	5	14	8	9
C81 Linfoma Hodgkin	2	.	.	1	1
C82-85,96 Otr.Linfomas	24	5	6	4	9
C88 S.Mieloproliferat.	1	.	.	1	.
C90 Mieloma múltiple	5	3	.	.	2
C91-95 Leucemias	12	4	6	1	1
D45 Policitemia vera	1	.	.	.	1
D46 Sindr. mielodisplásicos	3	1	.	2	.
D47 Otr.tr.hematológicos	2	1	1	.	.

TABLA A.35. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud VI. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	499	105	136	141	117
C00 Labio	1	.	.	.	1
C01-02 Lengua	3	.	1	1	1
C03-06 Boca	1	.	1	.	.
C07-08 Gl.salivales	3	.	2	.	1
C09-14 Faringe	1	.	1	.	.
C15 Esófago	5	.	3	1	1
C16 Estómago	22	2	4	10	6
C17 Intestino delgado	2	1	1	.	.
C18 Colon	44	5	9	23	7
C19-21 Recto	24	3	8	6	7
C22 Hígado	10	2	1	5	2
C23-24 Vesícula biliar	4	.	2	2	.
C25 Páncreas	14	3	2	3	6
C30-31 Nariz,senos	2	.	.	.	2
C32 Laringe	2	1	.	.	1
C33-34 Pulmón	19	5	3	5	6
C37-38 Otr.org.torácicos	1	.	.	1	.
C40-41 Hueso	2	2	.	.	.
C43 Melanoma	18	2	1	7	8
C45 Mesotelioma	1	.	1	.	.
C47,49 Tejidos blandos	2	.	.	1	1
C50 Mama	113	26	35	24	28
C51-52,57 Otr.genit.fem.	8	2	3	.	3
C53 Cervix	9	1	6	1	1
C54-55 Cuerpo útero	34	9	7	13	5
C56 Ovario	20	3	7	4	6
C64-65 Riñón	6	2	.	3	1
C66-68 Vejiga*	34	5	15	9	5
C70-72 S.N.Central**	11	3	2	2	4
C73 Tiroides	9	2	3	4	.
C80,26,39,48,76 Otros	26	10	4	7	5
C81 Linfoma Hodgkin	4	.	2	1	1
C82-85,96 Otr.Linfomas	17	2	6	4	5
C88 S.Mieloproliferat.	3	2	.	.	1
C90 Mieloma múltiple	8	3	3	2	.
C91-95 Leucemias	10	7	.	2	1
D45 Policitemia vera	1	.	1	.	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	1	1	.	.	.
D47 Otr.tr.hematológicos	4	1	2	.	1

TABLA A.36. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud VII. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	1026	266	229	248	283
C00 Labio	3	.	2	.	1
C01-02 Lengua	12	7	2	2	1
C03-06 Boca	9	1	1	4	3
C07-08 Gl.salivales	2	1	1	.	.
C09-14 Faringe	31	6	5	11	9
C15 Esófago	13	2	1	6	4
C16 Estómago	64	13	16	17	18
C17 Intestino delgado	4	1	1	1	1
C18 Colon	119	25	21	36	37
C19-21 Recto	59	19	10	13	17
C22 Hígado	35	11	8	9	7
C23-24 Vesícula biliar	6	2	1	.	3
C25 Páncreas	24	6	8	3	7
C30-31 Nariz,senos	1	.	.	1	.
C32 Laringe	45	8	12	14	11
C33-34 Pulmón	177	53	37	35	52
C40-41 Hueso	4	.	1	2	1
C43 Melanoma	12	1	2	4	5
C45 Mesotelioma	2	.	1	.	1
C47,49 Tejidos blandos	3	2	1	.	.
C60,63 Otr.genit.mas.	2	2	.	.	.
C61 Próstata	150	36	36	35	43
C62 Testículo	7	1	.	3	3
C64-65 Riñón	32	11	8	7	6
C66-68 Vejiga*	93	24	24	22	23
C69 Ojo	1	.	.	.	1
C70-72 S.N.Central**	16	6	3	2	5
C73 Tiroides	1	.	1	.	.
C80,26,39,48,76 Otros	37	7	9	7	14
C81 Linfoma Hodgkin	4	3	1	.	.
C82-85,96 Otr.Linfomas	32	7	10	10	5
C90 Mieloma múltiple	4	1	1	1	1
C91-95 Leucemias	18	9	4	2	3
D46 Sindr. mielodisplásicos	1	1	.	.	.
D47 Otr.tr.hematológicos	3	.	1	1	1

TABLA A.37. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud VII. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	684	177	172	168	167
C00 Labio	1	.	.	1	.
C01-02 Lengua	2	.	2	.	.
C03-06 Boca	5	.	2	1	2
C07-08 Gl.salivales	1	.	1	.	.
C15 Esófago	2	.	1	1	.
C16 Estómago	39	8	13	9	9
C17 Intestino delgado	3	1	.	.	2
C18 Colon	78	17	16	25	20
C19-21 Recto	24	10	6	2	6
C22 Hígado	5	1	1	2	1
C23-24 Vesícula biliar	10	2	4	1	3
C25 Páncreas	20	4	6	5	5
C33-34 Pulmón	26	7	6	8	5
C40-41 Hueso	1	.	.	.	1
C43 Melanoma	14	2	3	3	6
C47,49 Tejidos blandos	5	2	2	.	1
C50 Mama	180	44	48	47	41
C51-52,57 Otr.genit.fem.	15	7	4	1	3
C53 Cervix	20	4	5	6	5
C54-55 Cuerpo útero	41	13	14	7	7
C56 Ovario	19	6	2	9	2
C64-65 Riñón	12	3	1	2	6
C66-68 Vejiga*	20	7	3	3	7
C69 Ojo	2	1	.	.	1
C70-72 S.N.Central**	31	7	7	7	10
C73 Tiroides	13	5	5	.	3
C80,26,39,48,76 Otros	29	8	7	10	4
C81 Linfoma Hodgkin	2	.	.	.	2
C82-85,96 Otr.Linfomas	34	7	7	11	9
C90 Mieloma múltiple	12	5	2	2	3
C91-95 Leucemias	13	4	3	4	2
D46 Sindr. mielodisplásicos	2	.	.	1	1
D47 Otr.tr.hematológicos	3	2	1	.	.

TABLA A.38. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud VIII. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	1168	311	278	273	306
C00 Labio	3	.	2	.	1
C01-02 Lengua	10	2	6	2	.
C03-06 Boca	12	2	3	4	3
C07-08 Gl.salivales	2	.	.	1	1
C09-14 Faringe	33	4	9	15	5
C15 Esófago	28	4	8	9	7
C16 Estómago	66	19	19	11	17
C17 Intestino delgado	4	1	1	2	.
C18 Colon	111	31	22	18	40
C19-21 Recto	60	18	11	13	18
C22 Hígado	44	10	12	12	10
C23-24 Vesícula biliar	9	3	2	1	3
C25 Páncreas	15	4	4	3	4
C30-31 Nariz,senos	5	.	1	2	2
C32 Laringe	40	8	12	7	13
C33-34 Pulmón	190	42	44	55	49
C37-38 Otr.org.torácicos	1	.	1	.	.
C40-41 Hueso	4	2	.	2	.
C43 Melanoma	9	3	1	3	2
C45 Mesotelioma	4	1	2	1	.
C46 S. Kaposi	5	1	.	2	2
C47,49 Tejidos blandos	12	4	3	3	2
C50 Mama	6	2	.	.	4
C60,63 Otr.genit.mas.	1	1	.	.	.
C61 Próstata	150	37	38	31	44
C62 Testículo	6	3	1	.	2
C64-65 Riñón	34	8	6	9	11
C66-68 Vejiga*	115	25	29	36	25
C70-72 S.N.Central**	23	11	1	6	5
C73 Tiroides	3	2	.	.	1
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	.	.	.	1
C80,26,39,48,76 Otros	59	17	13	14	15
C81 Linfoma Hodgkin	6	2	1	1	2
C82-85,96 Otr.Linfomas	43	20	7	5	11
C90 Mieloma múltiple	7	4	3	.	.
C91-95 Leucemias	32	15	9	4	4
D46 Sindr. mielodisplásicos	7	2	3	1	1
D47 Otr.tr.hematológicos	8	3	4	.	1

TABLA A.39. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud VIII. 2001-2004. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	773	227	186	162	198
C00 Labio	2	1	1	.	.
C01-02 Lengua	6	.	2	2	2
C03-06 Boca	2	1	1	.	.
C07-08 Gl.salivales	2	.	.	.	2
C09-14 Faringe	1	.	.	.	1
C15 Esófago	3	2	.	.	1
C16 Estómago	40	12	13	7	8
C17 Intestino delgado	3	.	2	1	.
C18 Colon	77	28	15	9	25
C19-21 Recto	31	4	7	6	14
C22 Hígado	27	4	6	8	9
C23-24 Vesícula biliar	9	2	3	2	2
C25 Páncreas	18	7	5	4	2
C32 Laringe	3	.	1	1	1
C33-34 Pulmón	26	3	8	7	8
C40-41 Hueso	2	.	1	.	1
C43 Melanoma	20	2	4	8	6
C45 Mesotelioma	1	.	.	1	.
C46 S. Kaposi	2	2	.	.	.
C47,49 Tejidos blandos	8	2	3	1	2
C50 Mama	180	63	41	34	42
C51-52,57 Otr.genit.fem.	7	3	3	.	1
C53 Cervix	14	4	2	3	5
C54-55 Cuerpo útero	43	9	9	15	10
C56 Ovario	27	11	7	6	3
C64-65 Riñón	13	5	4	1	3
C66-68 Vejiga**	39	7	8	10	14
C69 Ojo	1	.	.	.	1
C70-72 S.N.Central**	25	7	7	7	4
C73 Tiroides	14	5	2	3	4
C80,26,39,48,76 Otros	42	15	9	3	15
C81 Linfoma Hodgkin	2	1	1	.	.
C82-85,96 Otr.Linfomas	41	12	5	16	8
C90 Mieloma múltiple	11	4	5	.	2
C91-95 Leucemias	28	10	9	7	2
D46 Sindr. mielodisplásicos	3	1	2	.	.

TABLA A.40. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud I. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	696.1	708.1	693.4	613.6	770.2
C00 Labio	4.8	.	3.8	3.8	11.7
C01-02 Lengua	7.6	3.7	18.9	.	7.8
C03-06 Boca	4.8	.	3.8	3.8	11.7
C09-14 Faringe	16.2	18.7	11.4	11.5	23.3
C15 Esófago	8.6	18.7	3.8	3.8	7.8
C16 Estómago	29.6	15.0	34.1	26.8	42.8
C17 Intestino delgado	1.9	3.7	3.8	.	.
C18 Colon	41.0	52.5	34.1	49.9	27.2
C19-21 Recto	41.0	41.2	22.7	26.8	73.9
C22 Hígado	15.3	3.7	30.3	19.2	7.8
C23-24 Vesícula biliar	1.9	3.7	.	.	3.9
C25 Páncreas	21.0	15.0	22.7	30.7	15.6
C30-31 Nariz,senos	3.8	3.7	3.8	.	7.8
C32 Laringe	20.0	18.7	22.7	15.3	23.3
C33-34 Pulmón	138.3	157.4	136.4	115.1	143.9
C40-41 Hueso	2.9	3.7	7.6	.	.
C43 Melanoma	8.6	15.0	15.2	.	3.9
C47,49 Tejidos blandos	5.7	3.7	3.8	3.8	11.7
C50 Mama	1.0	.	3.8	.	.
C60,63 Otr.genit.mas.	4.8	7.5	3.8	.	7.8
C61 Próstata	119.2	101.2	136.4	107.4	132.3
C62 Testículo	2.9	3.7	.	7.7	.
C64-65 Riñón	18.1	26.2	18.9	11.5	15.6
C66-68 Vejiga*	60.1	59.9	60.6	57.5	62.2
C70-72 S.N.Central**	14.3	22.5	7.6	11.5	15.6
C73 Tiroides	1.9	3.7	.	.	3.9
C80,26,39,48,76 Otros	48.6	48.7	45.5	57.5	42.8
C81 Linfoma Hodgkin	2.9	.	3.8	.	7.8
C82-85,96 Otr.Linfomas	22.9	30.0	11.4	19.2	31.1
C90 Mieloma múltiple	1.0	.	3.8	.	.
C91-95 Leucemias	12.4	7.5	15.2	7.7	19.4
D46 Sindr. mielodisplásicos	5.7	3.7	.	15.3	3.9
D47 Otr.tr.hematológicos	7.6	15.0	3.8	7.7	3.9

TABLA A.41. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud I. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	409.7	432.3	369.0	349.0	489.3
C00 Labio	1.8	.	3.6	3.6	.
C01-02 Lengua	0.9	.	3.6	.	.
C03-06 Boca	1.8	.	.	3.6	3.7
C15 Esófago	2.7	7.1	3.6	.	.
C16 Estómago	18.0	17.7	17.9	10.9	25.8
C17 Intestino delgado	1.8	.	.	.	7.4
C18 Colon	37.0	60.2	28.7	32.7	25.8
C19-21 Recto	17.1	17.7	10.7	18.2	22.1
C22 Hígado	3.6	7.1	3.6	3.6	.
C23-24 Vesícula biliar	4.5	.	3.6	10.9	3.7
C25 Páncreas	8.1	3.5	21.5	3.6	3.7
C30-31 Nariz,senos	1.8	3.5	.	.	3.7
C33-34 Pulmón	17.1	24.8	21.5	.	22.1
C40-41 Hueso	0.9	.	3.6	.	.
C43 Melanoma	8.1	7.1	10.7	10.9	3.7
C45 Mesotelioma	0.9	.	.	.	3.7
C47,49 Tejidos blandos	3.6	7.1	.	3.6	3.7
C50 Mama	91.1	92.1	96.7	94.5	80.9
C51-52,57 Otr.genit.fem.	5.4	7.1	3.6	3.6	7.4
C53 Cervix	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7
C54-55 Cuerpo útero	36.1	35.4	35.8	36.4	36.8
C56 Ovario	22.6	35.4	21.5	10.9	22.1
C64-65 Riñón	9.9	21.3	7.2	7.3	3.7
C66-68 Vejiga*	10.8	10.6	3.6	10.9	18.4
C69 Ojo	0.9	.	.	.	3.7
C70-72 S.N.Central**	16.2	7.1	3.6	14.5	40.5
C73 Tiroides	5.4	.	7.2	.	14.7
C80,26,39,48,76 Otros	30.7	24.8	10.7	21.8	66.2
C81 Linfoma Hodgkin	0.9	.	.	.	3.7
C82-85,96 Otr.Linfomas	22.6	10.6	25.1	18.2	36.8
C90 Mieloma múltiple	10.8	7.1	14.3	7.3	14.7
C91-95 Leucemias	6.3	10.6	.	10.9	3.7
D46 Sindr. mielodisplásicos	2.7	3.5	.	7.3	.
D47 Otr.tr.hematológicos	3.6	7.1	3.6	.	3.7

TABLA A.42. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud II. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	843.6	815.3	919.9	678.0	962.9
C00 Labio	8.5	.	.	11.4	23.2
C01-02 Lengua	8.5	11.0	5.6	5.7	11.6
C03-06 Boca	8.5	5.5	5.6	17.1	5.8
C07-08 Gl.salivales	4.2	.	11.2	.	5.8
C09-14 Faringe	11.3	22.0	11.2	5.7	5.8
C15 Esófago	18.4	38.6	5.6	17.1	11.6
C16 Estómago	22.6	27.5	16.8	22.8	23.2
C17 Intestino delgado	2.8	5.5	.	.	5.8
C18 Colon	38.2	44.1	39.3	22.8	46.4
C19-21 Recto	57.9	33.1	56.1	57.0	87.0
C22 Hígado	25.4	16.5	28.0	28.5	29.0
C25 Páncreas	17.0	27.5	22.4	.	17.4
C30-31 Nariz,senos	1.4	5.5	.	.	.
C32 Laringe	12.7	11.0	11.2	22.8	5.8
C33-34 Pulmón	134.2	132.2	162.7	108.3	133.4
C43 Melanoma	8.5	5.5	11.2	5.7	11.6
C45 Mesotelioma	1.4	.	5.6	.	.
C47,49 Tejidos blandos	9.9	5.5	11.2	17.1	5.8
C50 Mama	2.8	.	11.2	.	.
C60,63 Otr.genit.mas.	1.4	.	5.6	.	.
C61 Próstata	262.8	198.3	308.5	205.1	342.2
C62 Testículo	2.8	5.5	.	.	5.8
C64-65 Riñón	5.7	.	5.6	.	17.4
C66-68 Vejiga*	74.9	99.2	72.9	51.3	75.4
C70-72 S.N.Central**	7.1	16.5	5.6	5.7	.
C73 Tiroides	1.4	.	5.6	.	.
C74-75 Otr.gl.endocr.	1.4	.	.	.	5.8
C80,26,39,48,76 Otros	36.7	44.1	56.1	34.2	11.6
C81 Linfoma Hodgkin	2.8	5.5	.	.	5.8
C82-85,96 Otr.Linfomas	18.4	16.5	16.8	5.7	34.8
C88 S.Mieloproliferat.	1.4	.	.	5.7	.
C90 Mieloma múltiple	4.2	5.5	.	5.7	5.8
C91-95 Leucemias	15.5	16.5	16.8	17.1	11.6
D45 Policitemia vera	2.8	.	5.6	.	5.8
D46 Sindr. mielodisplásicos	5.7	5.5	5.6	5.7	5.8
D47 Otr.tr.hematológicos	4.2	11.0	.	.	5.8

TABLA A.43. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud II. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	425.6	397.8	427.6	441.6	436.5
C00 Labio	2.9	.	.	5.9	6.0
C01-02 Lengua	2.9	.	.	5.9	6.0
C03-06 Boca	1.5	.	.	5.9	.
C07-08 Gl.salivales	1.5	.	.	5.9	.
C15 Esófago	1.5	.	5.8	.	.
C16 Estómago	17.5	22.7	28.9	5.9	12.0
C17 Intestino delgado	4.4	11.4	.	.	6.0
C18 Colon	33.5	28.4	40.5	47.1	17.9
C19-21 Recto	20.4	11.4	28.9	11.8	29.9
C22 Hígado	5.8	5.7	.	11.8	6.0
C23-24 Vesícula biliar	2.9	.	5.8	5.9	.
C25 Páncreas	7.3	5.7	5.8	11.8	6.0
C33-34 Pulmón	21.9	28.4	34.7	5.9	17.9
C43 Melanoma	5.8	.	.	17.7	6.0
C45 Mesotelioma	1.5	5.7	.	.	.
C47,49 Tejidos blandos	7.3	17.0	5.8	5.9	.
C50 Mama	99.1	119.3	104.0	76.5	95.7
C51-52,57 Otr.genit.fem.	7.3	.	5.8	23.6	.
C53 Cervix	10.2	11.4	5.8	11.8	12.0
C54-55 Cuerpo útero	42.3	17.0	34.7	41.2	77.7
C56 Ovario	18.9	34.1	23.1	11.8	6.0
C64-65 Riñón	2.9	.	5.8	.	6.0
C66-68 Vejiga*	10.2	5.7	.	11.8	23.9
C70-72 S.N.Central**	13.1	.	17.3	17.7	17.9
C73 Tiroides	18.9	17.0	17.3	11.8	29.9
C74-75 Otr.gl.endocr.	1.5	.	.	.	6.0
C80,26,39,48,76 Otros	29.2	34.1	34.7	41.2	6.0
C81 Linfoma Hodgkin	2.9	5.7	5.8	.	.
C82-85,96 Otr.Linfomas	16.0	.	11.6	41.2	12.0
C90 Mieloma múltiple	1.5	.	.	.	6.0
C91-95 Leucemias	11.7	11.4	5.8	5.9	23.9
D47 Otr.tr.hematológicos	1.5	5.7	.	.	.

TABLA A.44. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud III. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	704.0	686.5	683.7	722.9	723.0
C00 Labio	4.6	2.7	5.3	4.0	6.6
C01-02 Lengua	6.6	9.3	6.7	9.3	1.3
C03-06 Boca	7.0	8.0	8.0	8.0	4.0
C07-08 Gl.salivales	2.3	2.7	.	4.0	2.7
C09-14 Faringe	11.0	6.6	12.0	10.6	14.6
C15 Esófago	8.6	8.0	6.7	8.0	12.0
C16 Estómago	27.2	31.8	29.3	22.6	25.3
C17 Intestino delgado	0.7	.	.	.	2.7
C18 Colon	63.1	68.9	55.9	58.5	69.1
C19-21 Recto	45.5	35.8	41.2	41.2	63.8
C22 Hígado	20.3	27.8	12.0	15.9	25.3
C23-24 Vesícula biliar	4.0	.	4.0	6.6	5.3
C25 Páncreas	13.6	11.9	13.3	15.9	13.3
C30-31 Nariz,senos	1.7	2.7	.	1.3	2.7
C32 Laringe	24.6	14.6	20.0	37.2	26.6
C33-34 Pulmón	132.5	128.5	147.6	131.6	122.3
C40-41 Hueso	2.3	2.7	1.3	1.3	4.0
C43 Melanoma	7.6	6.6	6.7	8.0	9.3
C45 Mesotelioma	2.0	2.7	2.7	1.3	1.3
C46 S. Kaposi	0.3	1.3	.	.	.
C47,49 Tejidos blandos	4.3	1.3	2.7	8.0	5.3
C50 Mama	2.3	2.7	2.7	2.7	1.3
C60,63 Otr.genit.mas.	2.3	1.3	.	2.7	5.3
C61 Próstata	117.6	102.0	114.4	126.2	127.6
C62 Testículo	3.3	.	5.3	6.6	1.3
C64-65 Riñón	19.9	19.9	22.6	19.9	17.3
C66-68 Vejiga*	81.7	90.1	71.8	82.4	82.4
C69 Ojo	0.7	1.3	1.3	.	.
C70-72 S.N.Central**	11.0	9.3	17.3	5.3	12.0
C73 Tiroides	2.7	4.0	2.7	2.7	1.3
C74-75 Otr.gl.endocr.	0.3	.	.	.	1.3
C80,26,39,48,76 Otros	28.6	23.9	35.9	26.6	27.9
C81 Linfoma Hodgkin	3.3	1.3	4.0	6.6	1.3
C82-85,96 Otr.Linfomas	20.9	22.5	14.6	27.9	18.6
C90 Mieloma múltiple	4.3	9.3	2.7	4.0	1.3
C91-95 Leucemias	11.3	19.9	8.0	10.6	6.6
D45 Policitemia vera	0.7	.	2.7	.	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	2.0	4.0	2.7	1.3	.
D47 Otr.tr.hematológicos	1.3	1.3	.	4.0	.

TABLA A.45. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud III. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	373.6	365.3	368.5	378.3	382.4
C00 Labio	0.9	.	2.5	.	1.2
C01-02 Lengua	1.9	2.5	2.5	1.2	1.2
C03-06 Boca	2.5	1.2	5.0	2.5	1.2
C07-08 Gl.salivales	0.6	.	1.2	.	1.2
C09-14 Faringe	3.1	5.0	2.5	2.5	2.5
C15 Esófago	3.7	3.7	2.5	3.7	5.0
C16 Estómago	16.7	18.6	22.3	13.6	12.4
C17 Intestino delgado	1.9	1.2	2.5	1.2	2.5
C18 Colon	34.4	35.9	27.3	44.7	29.8
C19-21 Recto	20.8	14.9	17.4	24.8	26.1
C22 Hígado	7.8	9.9	8.7	5.0	7.4
C23-24 Vesícula biliar	2.8	2.5	.	3.7	5.0
C25 Páncreas	11.2	8.7	9.9	17.4	8.7
C30-31 Nariz,senos	0.3	1.2	.	.	.
C32 Laringe	0.3	.	1.2	.	.
C33-34 Pulmón	14.3	12.4	17.4	18.6	8.7
C37-38 Otr.org.torácicos	0.3	.	.	.	1.2
C40-41 Hueso	1.9	1.2	.	2.5	3.7
C43 Melanoma	8.7	9.9	5.0	8.7	11.2
C45 Mesotelioma	0.6	.	1.2	.	1.2
C47,49 Tejidos blandos	4.0	2.5	1.2	6.2	6.2
C50 Mama	88.1	94.1	72.0	80.6	105.5
C51-52,57 Otr.genit.fem.	5.6	.	7.4	2.5	12.4
C53 Cervix	10.5	12.4	12.4	8.7	8.7
C54-55 Cuerpo útero	26.4	31.0	26.1	26.0	22.3
C56 Ovario	14.6	14.9	11.2	12.4	19.9
C64-65 Riñón	6.2	8.7	5.0	3.7	7.4
C66-68 Vejiga**	10.9	12.4	14.9	12.4	3.7
C69 Ojo	0.3	.	.	1.2	.
C70-72 S.N.Central**	11.8	8.7	17.4	8.7	12.4
C73 Tiroides	5.6	3.7	8.7	7.4	2.5
C74-75 Otr.gl.endocr.	0.6	.	.	1.2	1.2
C80,26,39,48,76 Oídos	21.7	19.8	26.1	22.3	18.6
C81 Linfoma Hodgkin	1.9	.	7.4	.	.
C82-85,96 Otr.Linfomas	14.6	7.4	11.2	19.8	19.9
C90 Mieloma múltiple	6.2	11.1	7.4	2.5	3.7
C91-95 Leucemias	8.1	7.4	9.9	11.2	3.7
D45 Policitemia vera	0.3	.	1.2	.	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	0.6	.	.	1.2	1.2
D47 Otr.tr.hematológicos	1.2	2.5	.	.	2.5

TABLA A.46. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud IV. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	705.4	685.0	650.1	688.6	796.3
C00 Labio	3.1	2.7	2.7	4.6	2.6
C01-02 Lengua	6.4	6.7	6.6	5.2	7.2
C03-06 Boca	7.1	10.0	5.3	8.5	4.6
C07-08 Gl.salivales	2.0	1.3	2.0	2.0	2.6
C09-14 Faringe	16.6	16.7	15.9	13.7	20.2
C15 Esófago	11.2	14.7	10.6	8.5	11.1
C16 Estómago	30.8	34.0	29.8	26.2	33.2
C17 Intestino delgado	2.3	2.0	1.3	2.0	3.9
C18 Colon	59.1	64.7	49.1	61.5	61.1
C19-21 Recto	37.2	34.7	32.5	41.2	40.3
C22 Hígado	19.4	20.0	20.6	19.6	17.6
C23-24 Vesícula biliar	3.3	2.0	4.0	3.3	3.9
C25 Páncreas	15.3	13.3	15.3	16.3	16.3
C30-31 Nariz,senos	2.5	2.0	2.7	2.0	3.3
C32 Laringe	22.1	26.0	21.2	17.0	24.1
C33-34 Pulmón	111.0	118.7	108.8	100.1	116.4
C37-38 Otr.org.torácicos	0.2	0.7	.	.	.
C40-41 Hueso	1.6	1.3	2.7	2.6	.
C43 Melanoma	7.7	4.7	6.6	4.6	15.0
C45 Mesotelioma	1.0	1.3	1.3	0.7	0.7
C46 S. Kaposi	1.8	0.7	.	2.6	3.9
C47,49 Tejidos blandos	4.1	2.0	3.3	4.6	6.5
C50 Mama	0.8	0.7	1.3	.	1.3
C60,63 Otr.genit.mas.	1.2	1.3	1.3	0.7	1.3
C61 Próstata	144.4	112.1	126.0	164.8	173.6
C62 Testículo	4.1	4.0	6.6	3.9	2.0
C64-65 Riñón	22.4	17.3	20.6	21.6	29.9
C66-68 Vejiga*	78.0	76.7	69.6	67.4	98.2
C69 Ojo	0.3	.	.	.	1.3
C70-72 S.N.Central**	12.5	12.7	6.6	15.7	15.0
C73 Tiroides	2.1	2.7	4.6	0.7	0.7
C74-75 Otr.gl.endocr.	0.3	0.7	.	0.7	.
C80,26,39,48,76 Oídos	21.4	26.7	20.6	24.2	14.3
C81 Linfoma Hodgkin	4.4	2.7	4.0	2.0	9.1
C82-85,96 Otr.Linfomas	17.3	18.0	11.9	20.9	18.2
C88 S.Mieloproliferat.	0.2	.	0.7	.	.
C90 Mieloma múltiple	6.9	10.0	5.3	2.0	10.4
C91-95 Leucemias	17.0	14.7	22.6	13.1	17.6
D45 Policitemia vera	0.8	.	0.7	2.0	0.7
D46 Sindr. mielodisplásicos	2.1	2.0	2.7	0.7	3.3
D47 Otr.tr.hematológicos	3.3	2.7	2.7	2.0	5.9

TABLA A.47. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud IV. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	413.0	408.5	406.9	397.4	438.8
C00 Labio	1.3	1.8	0.6	1.8	1.2
C01-02 Lengua	1.6	3.6	.	0.6	2.3
C03-06 Boca	1.5	0.6	0.6	3.0	1.8
C07-08 Gl.salivales	1.0	1.8	.	1.8	0.6
C09-14 Faringe	1.2	1.8	1.2	0.6	1.2
C15 Esófago	0.9	0.6	2.4	0.6	.
C16 Estómago	18.4	15.6	23.3	13.0	21.7
C17 Intestino delgado	1.8	1.8	1.2	2.4	1.8
C18 Colon	42.1	40.9	40.7	36.6	49.9
C19-21 Recto	19.3	15.0	22.7	17.1	22.3
C22 Hígado	6.1	3.6	6.6	8.9	5.3
C23-24 Vesicula biliar	3.6	4.2	3.6	4.1	2.3
C25 Páncreas	12.0	9.0	12.0	12.4	14.7
C30-31 Nariz,senos	1.0	0.6	1.8	1.2	0.6
C32 Laringe	1.3	1.2	0.6	3.0	0.6
C33-34 Pulmón	14.9	14.4	15.0	14.8	15.3
C40-41 Hueso	0.6	1.8	.	.	0.6
C43 Melanoma	9.2	9.6	9.6	7.7	10.0
C45 Mesotelioma	0.3	0.6	.	.	0.6
C46 S. Kaposi	0.3	.	.	0.6	0.6
C47,49 Tejidos blandos	3.6	1.2	5.4	4.1	3.5
C50 Mama	108.3	104.1	98.7	114.0	116.3
C51-52,57 Otr.genit.fem.	4.6	5.4	4.8	1.8	6.5
C53 Cervix	9.5	10.2	9.6	11.8	6.5
C54-55 Cuerpo útero	26.7	32.5	23.9	22.4	28.2
C56 Ovario	18.4	19.3	13.2	23.0	18.2
C64-65 Riñón	7.6	4.8	6.6	9.4	9.4
C66-68 Vejiga*	15.6	14.4	20.9	13.0	14.1
C69 Ojo	0.4	1.2	.	0.6	.
C70-72 S.N.Central**	12.2	12.0	15.6	12.4	8.8
C73 Tiroides	7.6	9.0	4.8	6.5	10.0
C74-75 Otr.gl.endocr.	0.3	.	.	.	1.2
C80,26,39,48,76 Oídos	20.5	26.5	21.5	13.0	21.1
C81 Linfoma Hodgkin	3.6	3.0	1.8	5.9	3.5
C82-85,96 Otr.Linfomas	15.2	10.8	16.8	11.8	21.1
C90 Mieloma múltiple	5.3	6.0	5.4	3.5	6.5
C91-95 Leucemias	10.3	13.2	10.8	10.0	7.0
D45 Policitemia vera	0.1	.	.	0.6	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	2.5	3.6	3.0	1.2	2.3
D47 Otr.tr.hematológicos	2.1	2.4	2.4	2.4	1.2

TABLA A.48. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud V. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	639.4	657.3	603.4	639.2	657.6
C00 Labio	3.6	3.6	4.3	2.8	3.6
C01-02 Lengua	6.4	6.4	7.1	6.4	5.7
C03-06 Boca	5.9	5.0	9.3	5.0	4.3
C07-08 Gl.salivales	1.1	1.4	.	2.1	0.7
C09-14 Faringe	15.8	13.6	19.2	17.8	12.8
C15 Esófago	11.6	12.1	13.5	8.5	12.1
C16 Estómago	26.0	27.8	19.2	27.7	29.1
C17 Intestino delgado	1.4	0.7	2.8	0.7	1.4
C18 Colon	59.8	62.8	50.5	65.3	60.4
C19-21 Recto	34.5	31.4	28.5	39.1	39.1
C22 Hígado	22.1	27.8	14.2	23.4	22.7
C23-24 Vesícula biliar	2.5	2.9	2.1	2.8	2.1
C25 Páncreas	9.6	10.7	5.7	12.8	9.2
C30-31 Nariz,senos	1.8	0.7	.	4.3	2.1
C32 Laringe	20.8	25.0	19.9	22.7	15.6
C33-34 Pulmón	120.9	119.2	118.8	121.5	124.3
C37-38 Otr.org.torácicos	1.1	0.7	2.8	.	0.7
C40-41 Hueso	2.0	0.7	2.1	1.4	3.6
C43 Melanoma	7.6	10.0	4.3	5.7	10.7
C45 Mesotelioma	2.0	2.1	0.7	2.8	2.1
C46 S. Kaposi	1.1	0.7	2.1	0.7	0.7
C47,49 Tejidos blandos	2.3	2.1	1.4	1.4	4.3
C50 Mama	1.2	2.9	0.7	.	1.4
C60,63 Otr.genit.mas.	1.8	2.1	.	2.1	2.8
C61 Próstata	109.7	114.2	98.9	106.5	119.3
C62 Testículo	5.3	5.7	2.1	7.8	5.7
C64-65 Riñón	22.8	20.0	26.3	19.2	25.6
C66-68 Vejiga*	53.5	59.2	60.5	42.6	51.8
C69 Ojo	1.2	2.9	1.4	.	0.7
C70-72 S.N.Central**	12.8	11.4	15.7	12.1	12.1
C73 Tiroides	2.5	2.1	0.7	3.6	3.6
C74-75 Otr.gl.endocr.	0.7	1.4	.	.	1.4
C80,26,39,48,76 Oídos	27.2	29.3	29.2	26.3	24.1
C81 Linfoma Hodgkin	3.9	3.6	4.3	4.3	3.6
C82-85,96 Otr.Linfomas	17.6	16.4	17.1	19.2	17.8
C88 S.Mieloproliferat.	0.2	.	.	.	0.7
C90 Mieloma múltiple	5.7	6.4	6.4	4.3	5.7
C91-95 Leucemias	10.5	7.9	8.5	13.5	12.1
D45 Policitemia vera	0.4	0.7	0.7	.	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	1.8	1.4	1.4	2.8	1.4
D47 Otr.tr.hematológicos	0.9	2.1	0.7	.	0.7

TABLA A.49. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud V. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	397.8	408.0	386.0	398.1	399.2
C00 Labio	0.6	0.6	0.6	.	1.3
C01-02 Lengua	1.0	1.3	.	1.3	1.3
C03-06 Boca	2.6	3.9	2.6	2.6	1.3
C07-08 Gl.salivales	0.3	.	.	1.3	.
C09-14 Faringe	0.5	0.6	.	0.6	0.6
C15 Esófago	1.0	1.3	.	1.3	1.3
C16 Estómago	16.3	16.9	18.8	17.4	12.3
C17 Intestino delgado	1.5	0.6	0.6	3.9	0.6
C18 Colon	37.5	38.3	34.3	42.0	35.5
C19-21 Recto	19.3	9.7	23.3	20.7	23.3
C22 Hígado	9.1	9.1	9.1	11.0	7.1
C23-24 Vesícula biliar	2.6	2.6	2.6	3.9	1.3
C25 Páncreas	10.0	7.8	8.4	13.6	10.3
C30-31 Nariz,senos	0.5	.	0.6	1.3	.
C32 Laringe	0.8	0.6	0.6	0.6	1.3
C33-34 Pulmón	20.4	18.8	23.3	21.3	18.1
C37-38 Otr.org.torácicos	0.2	.	.	.	0.6
C40-41 Hueso	1.1	1.9	1.3	.	1.3
C43 Melanoma	12.6	16.9	13.0	11.0	9.7
C45 Mesotelioma	0.3	.	1.3	.	.
C47,49 Tejidos blandos	2.6	3.2	1.3	2.6	3.2
C50 Mama	100.2	106.5	90.7	100.2	103.3
C51-52,57 Otr.genit.fem.	3.2	3.2	3.2	2.6	3.9
C53 Cervix	11.3	11.7	11.7	11.0	11.0
C54-55 Cuerpo útero	27.5	33.1	26.6	27.1	23.3
C56 Ovario	14.9	17.5	14.2	11.6	16.1
C64-65 Riñón	9.4	8.4	13.0	7.8	8.4
C66-68 Vejiga*	11.0	8.4	10.4	8.4	16.8
C69 Ojo	0.8	1.9	0.6	.	0.6
C70-72 S.N.Central**	15.7	12.3	16.8	14.9	18.7
C73 Tiroides	11.3	10.4	7.1	15.5	12.3
C74-75 Otr.gl.endocr.	0.3	.	1.3	.	.
C80,26,39,48,76 Oídos	18.1	19.5	13.0	18.1	22.0
C81 Linfoma Hodgkin	2.9	3.9	5.2	1.9	0.6
C82-85,96 Otr.Linfomas	14.6	18.8	13.6	11.0	14.9
C88 S.Mieloproliferat.	0.2	0.6	.	.	.
C90 Mieloma múltiple	5.5	7.1	4.5	3.2	7.1
C91-95 Leucemias	7.1	7.1	6.5	7.1	7.8
D45 Policitemia vera	0.2	.	.	.	0.6
D46 Sindr. mielodisplásicos	1.3	0.6	2.6	0.6	1.3
D47 Otr.tr.hematológicos	1.5	1.9	3.2	0.6	.

TABLA A.50. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud VI. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	750.7	619.8	792.9	767.7	824.3
C00 Labio	1.9	3.8	.	.	3.8
C01-02 Lengua	1.9	3.8	.	.	3.8
C03-06 Boca	7.6	11.3	11.4	7.7	.
C09-14 Faringe	20.0	7.6	19.1	3.8	49.8
C15 Esófago	16.2	7.6	11.4	23.0	23.0
C16 Estómago	37.2	22.7	19.1	46.1	61.3
C17 Intestino delgado	2.9	.	3.8	.	7.7
C18 Colon	41.0	15.1	38.1	57.6	53.7
C19-21 Recto	29.6	34.0	34.3	26.9	23.0
C22 Hígado	26.7	18.9	45.7	26.9	15.3
C23-24 Vesícula biliar	2.9	7.6	.	3.8	.
C25 Páncreas	20.0	11.3	15.2	23.0	30.7
C30-31 Nariz,senos	1.0	.	.	3.8	.
C32 Laringe	24.8	22.7	26.7	30.7	19.2
C33-34 Pulmón	151.7	173.9	148.7	138.2	145.7
C43 Melanoma	3.8	.	.	7.7	7.7
C45 Mesotelioma	1.0	.	.	.	3.8
C46 S. Kaposi	1.0	.	.	3.8	.
C47,49 Tejidos blandos	2.9	3.8	.	.	7.7
C60,63 Otr.genit.mas.	1.9	.	3.8	3.8	.
C61 Próstata	140.2	120.9	133.4	157.4	149.5
C62 Testículo	5.7	3.8	11.4	.	7.7
C64-65 Riñón	21.0	11.3	19.1	30.7	23.0
C66-68 Vejiga*	81.1	49.1	122.0	84.4	69.0
C69 Ojo	1.0	.	3.8	.	.
C70-72 S.N.Central**	20.0	18.9	19.1	15.4	26.8
C73 Tiroides	3.8	.	3.8	7.7	3.8
C80,26,39,48,76 Otros	34.3	18.9	53.4	30.7	34.5
C81 Linfoma Hodgkin	1.9	.	.	3.8	3.8
C82-85,96 Otr.Linfomas	22.9	18.9	22.9	15.4	34.5
C88 S.Mieloproliferat.	1.0	.	.	3.8	.
C90 Mieloma múltiple	4.8	11.3	.	.	7.7
C91-95 Leucemias	11.4	15.1	22.9	3.8	3.8
D45 Policitemia vera	1.0	.	.	.	3.8
D46 Sindr. mielodisplásicos	2.9	3.8	.	7.7	.
D47 Otr.tr.hematológicos	1.9	3.8	3.8	.	.

TABLA A.51. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud VI. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	456.6	380.0	496.1	519.3	431.9
C00 Labio	0.9	.	.	.	3.7
C01-02 Lengua	2.7	.	3.6	3.7	3.7
C03-06 Boca	0.9	.	3.6	.	.
C07-08 Gl.salivales	2.7	.	7.3	.	3.7
C09-14 Faringe	0.9	.	3.6	.	.
C15 Esófago	4.6	.	10.9	3.7	3.7
C16 Estómago	20.1	7.2	14.6	36.8	22.2
C17 Intestino delgado	1.8	3.6	3.6	.	.
C18 Colon	40.3	18.1	32.8	84.7	25.8
C19-21 Recto	22.0	10.9	29.2	22.1	25.8
C22 Hígado	9.2	7.2	3.6	18.4	7.4
C23-24 Vesícula biliar	3.7	.	7.3	7.4	.
C25 Páncreas	12.8	10.9	7.3	11.0	22.2
C30-31 Nariz,senos	1.8	.	.	.	7.4
C32 Laringe	1.8	3.6	.	.	3.7
C33-34 Pulmón	17.4	18.1	10.9	18.4	22.2
C37-38 Otr.org.torácicos	0.9	.	.	3.7	.
C40-41 Hueso	1.8	7.2	.	.	.
C43 Melanoma	16.5	7.2	3.6	25.8	29.5
C45 Mesotelioma	0.9	.	3.6	.	.
C47,49 Tejidos blandos	1.8	.	.	3.7	3.7
C50 Mama	103.4	94.1	127.7	88.4	103.4
C51-52,57 Otr.genit.fem.	7.3	7.2	10.9	.	11.1
C53 Cervix	8.2	3.6	21.9	3.7	3.7
C54-55 Cuerpo útero	31.1	32.6	25.5	47.9	18.5
C56 Ovario	18.3	10.9	25.5	14.7	22.2
C64-65 Riñón	5.5	7.2	.	11.0	3.7
C66-68 Vejiga*	31.1	18.1	54.7	33.1	18.5
C70-72 S.N.Central**	10.1	10.9	7.3	7.4	14.8
C73 Tiroides	8.2	7.2	10.9	14.7	.
C80,26,39,48,76 Otros	23.8	36.2	14.6	25.8	18.5
C81 Linfoma Hodgkin	3.7	.	7.3	3.7	3.7
C82-85,96 Otr.Linfomas	15.6	7.2	21.9	14.7	18.5
C88 S.Mieloproliferat.	2.7	7.2	.	.	3.7
C90 Mieloma múltiple	7.3	10.9	10.9	7.4	.
C91-95 Leucemias	9.2	25.3	.	7.4	3.7
D45 Policitemia vera	0.9	.	3.6	.	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	0.9	3.6	.	.	.
D47 Otr.tr.hematológicos	3.7	3.6	7.3	.	3.7

TABLA A.52. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud VII. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	699.6	708.5	617.7	680.4	795.0
C00 Labio	2.0	.	5.4	.	2.8
C01-02 Lengua	8.2	18.6	5.4	5.5	2.8
C03-06 Boca	6.1	2.7	2.7	11.0	8.4
C07-08 Gl.salivales	1.4	2.7	2.7	.	.
C09-14 Faringe	21.1	16.0	13.5	30.2	25.3
C15 Esófago	8.9	5.3	2.7	16.5	11.2
C16 Estómago	43.6	34.6	43.2	46.6	50.6
C17 Intestino delgado	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8
C18 Colon	81.1	66.6	56.6	98.8	103.9
C19-21 Recto	40.2	50.6	27.0	35.7	47.8
C22 Hígado	23.9	29.3	21.6	24.7	19.7
C23-24 Vesícula biliar	4.1	5.3	2.7	.	8.4
C25 Páncreas	16.4	16.0	21.6	8.2	19.7
C30-31 Nariz,senos	0.7	.	.	2.7	.
C32 Laringe	30.7	21.3	32.4	38.4	30.9
C33-34 Pulmón	120.7	141.2	99.8	96.0	146.1
C40-41 Hueso	2.7	.	2.7	5.5	2.8
C43 Melanoma	8.2	2.7	5.4	11.0	14.0
C45 Mesotelioma	1.4	.	2.7	.	2.8
C47,49 Tejidos blandos	2.0	5.3	2.7	.	.
C60,63 Otr.genit.mas.	1.4	5.3	.	.	.
C61 Próstata	102.3	95.9	97.1	96.0	120.8
C62 Testículo	4.8	2.7	.	8.2	8.4
C64-65 Riñón	21.8	29.3	21.6	19.2	16.9
C66-68 Vejiga*	63.4	63.9	64.7	60.4	64.6
C69 Ojo	0.7	.	.	.	2.8
C70-72 S.N.Central**	10.9	16.0	8.1	5.5	14.0
C73 Tiroides	0.7	.	2.7	.	.
C80,26,39,48,76 Otros	25.2	18.6	24.3	19.2	39.3
C81 Linfoma Hodgkin	2.7	8.0	2.7	.	.
C82-85,96 Otr.Linfomas	21.8	18.6	27.0	27.4	14.0
C90 Mieloma múltiple	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8
C91-95 Leucemias	12.3	24.0	10.8	5.5	8.4
D46 Sindr. mielodisplásicos	0.7	2.7	.	.	.
D47 Otr.tr.hematológicos	2.0	.	2.7	2.7	2.8

TABLA A.53. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud VII. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	433.7	439.4	431.6	429.2	434.6
C00 Labio	0.6	.	.	2.6	.
C01-02 Lengua	1.3	.	5.0	.	.
C03-06 Boca	3.2	.	5.0	2.6	5.2
C07-08 Gl.salivales	0.6	.	2.5	.	.
C15 Esófago	1.3	.	2.5	2.6	.
C16 Estómago	24.7	19.9	32.6	23.0	23.4
C17 Intestino delgado	1.9	2.5	.	.	5.2
C18 Colon	49.5	42.2	40.2	63.9	52.0
C19-21 Recto	15.2	24.8	15.1	5.1	15.6
C22 Hígado	3.2	2.5	2.5	5.1	2.6
C23-24 Vesícula biliar	6.3	5.0	10.0	2.6	7.8
C25 Páncreas	12.7	9.9	15.1	12.8	13.0
C33-34 Pulmón	16.5	17.4	15.1	20.4	13.0
C40-41 Hueso	0.6	.	.	.	2.6
C43 Melanoma	8.9	5.0	7.5	7.7	15.6
C47,49 Tejidos blandos	3.2	5.0	5.0	.	2.6
C50 Mama	114.1	109.2	120.5	120.1	106.7
C51-52,57 Otr.genit.fem.	9.5	17.4	10.0	2.6	7.8
C53 Cervix	12.7	9.9	12.5	15.3	13.0
C54-55 Cuerpo útero	26.0	32.3	35.1	17.9	18.2
C56 Ovario	12.0	14.9	5.0	23.0	5.2
C64-65 Riñón	7.6	7.4	2.5	5.1	15.6
C66-68 Vejiga*	12.7	17.4	7.5	7.7	18.2
C69 Ojo	1.3	2.5	.	.	2.6
C70-72 S.N.Central**	19.7	17.4	17.6	17.9	26.0
C73 Tiroides	8.2	12.4	12.5	.	7.8
C80,26,39,48,76 Otros	18.4	19.9	17.6	25.5	10.4
C81 Linfoma Hodgkin	1.3	.	.	.	5.2
C82-85,96 Otr.Linfomas	21.6	17.4	17.6	28.1	23.4
C90 Mieloma múltiple	7.6	12.4	5.0	5.1	7.8
C91-95 Leucemias	8.2	9.9	7.5	10.2	5.2
D46 Sindr. mielodisplásicos	1.3	.	.	2.6	2.6
D47 Otr.tr.hematológicos	1.9	5.0	2.5	.	.

TABLA A.54. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones.
Área de Salud VIII. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	711.5	747.6	675.2	668.3	755.0
C00 Labio	1.8	.	4.9	.	2.5
C01-02 Lengua	6.1	4.8	14.6	4.9	.
C03-06 Boca	7.3	4.8	7.3	9.8	7.4
C07-08 Gl.salivales	1.2	.	.	2.4	2.5
C09-14 Faringe	20.1	9.6	21.9	36.7	12.3
C15 Esófago	17.1	9.6	19.4	22.0	17.3
C16 Estómago	40.2	45.7	46.1	26.9	41.9
C17 Intestino delgado	2.4	2.4	2.4	4.9	.
C18 Colon	67.6	74.5	53.4	44.1	98.7
C19-21 Recto	36.6	43.3	26.7	31.8	44.4
C22 Hígado	26.8	24.0	29.1	29.4	24.7
C23-24 Vesícula biliar	5.5	7.2	4.9	2.4	7.4
C25 Páncreas	9.1	9.6	9.7	7.3	9.9
C30-31 Nariz,senos	3.0	.	2.4	4.9	4.9
C32 Laringe	24.4	19.2	29.1	17.1	32.1
C33-34 Pulmón	115.7	101.0	106.9	134.6	120.9
C37-38 Otr.org.torácicos	0.6	.	2.4	.	.
C40-41 Hueso	2.4	4.8	.	4.9	.
C43 Melanoma	5.5	7.2	2.4	7.3	4.9
C45 Mesotelioma	2.4	2.4	4.9	2.4	.
C46 S. Kaposi	3.0	2.4	.	4.9	4.9
C47,49 Tejidos blandos	7.3	9.6	7.3	7.3	4.9
C50 Mama	3.7	4.8	.	.	9.9
C60,63 Otr.genit.mas.	0.6	2.4	.	.	.
C61 Próstata	91.4	88.9	92.3	75.9	108.6
C62 Testículo	3.7	7.2	2.4	.	4.9
C64-65 Riñón	20.7	19.2	14.6	22.0	27.1
C66-68 Vejiga*	70.1	60.1	70.4	88.1	61.7
C70-72 S.N.Central**	14.0	26.4	2.4	14.7	12.3
C73 Tiroídes	1.8	4.8	.	.	2.5
C74-75 Otr.gl.endocr.	0.6	.	.	.	2.5
C80,26,39,48,76 Otros	35.9	40.9	31.6	34.3	37.0
C81 Linfoma Hodgkin	3.7	4.8	2.4	2.4	4.9
C82-85,96 Otr.Linfomas	26.2	48.1	17.0	12.2	27.1
C90 Mieloma múltiple	4.3	9.6	7.3	.	.
C91-95 Leucemias	19.5	36.1	21.9	9.8	9.9
D46 Sindr. mielodisplásicos	4.3	4.8	7.3	2.4	2.5
D47 Otr.tr.hematológicos	4.9	7.2	9.7	.	2.5

TABLA A.55. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres.
Área de Salud VIII. 2001-2004. Tasas específicas por 100.000.

CIE10 Localización	Año de incidencia				
	0104	2001	2002	2003	2004
C00-D47 Todas local.	437.6	507.3	420.3	368.7	453.1
C00 Labio	1.1	2.2	2.3	.	.
C01-02 Lengua	3.4	.	4.5	4.6	4.6
C03-06 Boca	1.1	2.2	2.3	.	.
C07-08 Gl.salivales	1.1	.	.	.	4.6
C09-14 Faringe	0.6	.	.	.	2.3
C15 Esófago	1.7	4.5	.	.	2.3
C16 Estómago	22.6	26.8	29.4	15.9	18.3
C17 Intestino delgado	1.7	.	4.5	2.3	.
C18 Colon	43.6	62.6	33.9	20.5	57.2
C19-21 Recto	17.6	8.9	15.8	13.7	32.0
C22 Hígado	15.3	8.9	13.6	18.2	20.6
C23-24 Vesícula biliar	5.1	4.5	6.8	4.6	4.6
C25 Páncreas	10.2	15.6	11.3	9.1	4.6
C32 Laringe	1.7	.	2.3	2.3	2.3
C33-34 Pulmón	14.7	6.7	18.1	15.9	18.3
C40-41 Hueso	1.1	.	2.3	.	2.3
C43 Melanoma	11.3	4.5	9.0	18.2	13.7
C45 Mesotelioma	0.6	.	.	2.3	.
C46 S. Kaposi	1.1	4.5	.	.	.
C47,49 Tejidos blandos	4.5	4.5	6.8	2.3	4.6
C50 Mama	101.9	140.8	92.7	77.4	96.1
C51-52,57 Otr.genit.fem.	4.0	6.7	6.8	.	2.3
C53 Cervix	7.9	8.9	4.5	6.8	11.4
C54-55 Cuerpo útero	24.3	20.1	20.3	34.1	22.9
C56 Ovario	15.3	24.6	15.8	13.7	6.9
C64-65 Riñón	7.4	11.2	9.0	2.3	6.9
C66-68 Vejiga*	22.1	15.6	18.1	22.8	32.0
C69 Ojo	0.6	.	.	.	2.3
C70-72 S.N.Central**	14.2	15.6	15.8	15.9	9.2
C73 Tiroides	7.9	11.2	4.5	6.8	9.2
C80,26,39,48,76 Otros	23.8	33.5	20.3	6.8	34.3
C81 Linfoma Hodgkin	1.1	2.2	2.3	.	.
C82-85,96 Otr.Linfomas	23.2	26.8	11.3	36.4	18.3
C90 Mieloma múltiple	6.2	8.9	11.3	.	4.6
C91-95 Leucemias	15.9	22.3	20.3	15.9	4.6
D46 Sindr. mielodisplásicos	1.7	2.2	4.5	.	.

TABLA A.56. Porcentajes de casos con verificación microscópica (%VM), procedentes del Boletín Estadístico de Defunción (%DCO) y con otros diagnósticos (%OTR) según localización y grupos de edad en varones. Asturias 2001-2004.

CIE10 Localización	Grupo de edad											
	00-34				35-64				65-74			
	Casos	% VM	% DCO	% OTR	Casos	% VM	% DCO	% OTR	Casos	% VM	% DCO	% OTR
C00-D47 Todas loc.	289	97.23	1.04	1.73	4445	96.00	0.79	3.22	4873	93.25	1.62	5.13
C00 Labio	8	100.00	.	.	24	100.00	.	.
C01-02 Lengua	1	100.00	.	.	72	100.00	.	.	43	100.00	.	.
C03-06 Boca	2	100.00	.	.	77	93.51	1.30	5.19	26	96.15	3.85	.
C07-08 Gl.salivales	8	100.00	.	.	12	100.00	.	.
C09-14 Faringe	3	100.00	.	.	206	99.03	0.49	0.49	77	98.70	.	1.30
C15 Esófago	105	96.19	1.90	1.90	88	97.73	.	2.27
C16 Estómago	3	66.67	33.33	.	177	97.74	1.13	1.13	208	97.60	.	2.40
C17 Intestino delgado	8	87.50	.	12.50	14	92.86	7.14	.
C18 Colon	3	100.00	.	.	272	97.43	1.10	1.47	453	96.47	1.99	1.55
C19-21 Recto	4	100.00	.	.	224	100.00	.	.	310	100.00	.	.
C22 Hígado	3	100.00	.	.	144	78.47	.	21.53	168	57.74	4.17	38.10
C23-24 Vesícula biliar	10	80.00	.	20.00	26	80.77	3.85	15.38
C25 Páncreas	1	100.00	.	.	98	76.53	1.02	22.45	91	52.75	10.99	36.26
C30-31 Nariz,senos	1	100.00	.	.	14	100.00	.	.	18	100.00	.	.
C32 Laringe	3	100.00	.	.	249	97.99	.	2.01	136	98.53	.	1.47
C33-34 Pulmón	6	100.00	.	.	865	95.95	1.50	2.54	852	90.96	3.40	5.63
C37-38 Otr.org.torácicos	5	100.00	.	.	1	100.00	.	.
C40-41 Hueso	14	92.86	.	7.14	16	100.00	.	.	5	100.00	.	.
C43 Melanoma	14	92.86	7.14	.	73	100.00	.	.	31	100.00	.	.
C45 Mesotelioma	13	100.00	.	.	5	100.00	.	.
C46 S. Kaposi	17	100.00	.	.	3	100.00	.	.
C47,49 Tejidos blandos	7	100.00	.	.	34	100.00	.	.	24	95.83	.	4.17
C50 Mama	12	100.00	.	.	8	100.00	.	.
C60,63 Otr.genit.mas.	2	100.00	.	.	8	100.00	.	.	11	100.00	.	.
C61 Próstata	521	99.04	.	0.96	1158	98.70	0.26	1.04
C62 Testículo	57	100.00	.	.	31	100.00
C64-65 Riñón	7	100.00	.	.	175	91.43	1.14	7.43	141	86.52	2.84	10.64
C66-68 Vejiga*	18	100.00	.	.	380	100.00	.	.	433	99.08	.	0.92
C69 Ojo	5	100.00	.	.	4	100.00	.	.
C70-72 S.N.Central**	32	90.63	.	9.38	94	89.36	3.19	7.45	85	70.59	1.18	28.24
C73 Tiroides	6	100.00	.	.	21	100.00	.	.	10	90.00	.	10.00
C74-75 Otr.gl.endocr.	4	75.00	.	25.00	4	100.00
C80,26,39,48,76 Otros	4	100.00	.	.	163	85.28	3.07	11.66	162	78.40	5.56	16.05
C81 Linfoma Hodgkin	34	100.00	.	.	31	100.00	.	.	6	83.33	16.67	.
C82-85,96 Otr.Linfomas	25	100.00	.	.	158	98.73	0.63	0.63	107	100.00	.	.
C88 S.Mieloproliferat.	2	100.00	.	.	1	100.00	.	.
C90 Mieloma múltiple	2	100.00	.	.	24	100.00	.	.	32	100.00	.	.
C91-95 Leucemias	32	96.88	3.13	.	90	97.78	.	2.22	63	95.24	3.17	1.59
D45 Policitemia vera	5	80.00	20.00	.	5	100.00	.	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	1	100.00	.	.	10	100.00	.	.	13	92.31	7.69	.
D47 Otr.tr.hematológicos	16	100.00	.	.	19	100.00	.	.

TABLA A.56 (cont). Porcentajes de casos con verificación microscópica (%VM), procedentes del Boletín Estadístico de Defunción (%DCO) y con otros diagnósticos (%OTR) según localización y grupos de edad en varones. Asturias 2001-2004.

CIE10 Localización	Grupo de edad											
	75-84				85+				TOTAL			
	Casos	% VM	% DCO	% OTR	Casos	% VM	% DCO	% OTR	Casos	% VM	% DCO	% OTR
C00-D47 Todas loc.	3838	86.37	4.04	9.59	852	64.91	13.26	21.83	14309	90.66	2.69	6.65
C00 Labio	32	96.88	3.13	.	8	100.00	.	.	72	98.61	1.39	.
C01-02 Lengua	17	100.00	133	100.00	.	.
C03-06 Boca	24	91.67	4.17	4.17	8	100.00	.	.	137	94.16	2.19	3.65
C07-08 Gl.salivales	9	100.00	.	.	3	100.00	.	.	32	100.00	.	.
C09-14 Faringe	38	94.74	.	5.26	9	100.00	.	.	333	98.50	0.30	1.20
C15 Esófago	37	94.59	.	5.41	9	77.78	11.11	11.11	239	95.82	1.26	2.93
C16 Estómago	192	94.79	2.08	3.13	51	80.39	9.80	9.80	631	95.25	1.90	2.85
C17 Intestino delgado	12	91.67	8.33	.	5	80.00	.	20.00	39	89.74	5.13	5.13
C18 Colon	404	94.31	1.98	3.71	96	78.13	10.42	11.46	1228	94.54	2.44	3.01
C19-21 Recto	215	98.14	0.47	1.40	36	83.33	8.33	8.33	791	98.74	0.51	0.76
C22 Hígado	113	46.90	12.39	40.71	16	25.00	18.75	56.25	444	60.81	5.41	33.78
C23-24 Vesícula biliar	23	65.22	4.35	30.43	7	42.86	14.29	42.86	66	71.21	4.55	24.24
C25 Páncreas	71	39.44	2.82	57.75	21	.	9.52	90.48	282	53.90	5.32	40.78
C30-31 Nariz,senos	8	100.00	.	.	1	100.00	.	.	42	100.00	.	.
C32 Laringe	67	95.52	1.49	2.99	10	90.00	10.00	.	466	97.64	0.43	1.93
C33-34 Pulmón	663	79.34	9.35	11.31	130	45.38	23.85	30.77	2519	87.30	5.36	7.34
C37-38 Otr.org.torácicos	2	100.00	8	100.00	.	.
C40-41 Hueso	3	100.00	.	.	1	.	.	100.00	39	94.87	.	5.13
C43 Melanoma	24	95.83	.	4.17	10	80.00	10.00	10.00	153	97.39	1.31	1.31
C45 Mesotelioma	11	100.00	.	.	2	50.00	50.00	.	31	96.77	3.23	.
C46 S. Kaposi	4	100.00	24	100.00	.	.
C47,49 Tejidos blandos	14	100.00	.	.	3	100.00	.	.	82	98.78	.	1.22
C50 Mama	7	100.00	.	.	1	100.00	.	.	28	100.00	.	.
C60,63 Otr.genit.mas.	10	90.00	10.00	.	4	100.00	.	.	35	97.14	2.86	.
C61 Próstata	785	92.10	2.42	5.48	142	56.34	20.42	23.24	2606	94.47	1.96	3.57
C62 Testículo	1	100.00	89	100.00	.	.
C64-65 Riñón	104	72.12	1.92	25.96	8	25.00	.	75.00	435	84.14	1.84	14.02
C66-68 Vejiga*	470	95.32	2.13	2.55	128	88.28	2.34	9.38	1430	97.13	0.91	1.96
C69 Ojo	3	100.00	.	.	1	100.00	.	.	13	100.00	.	.
C70-72 S.N.Central**	41	31.71	7.32	60.98	8	12.50	12.50	75.00	261	72.03	3.07	24.90
C73 Tiroides	6	100.00	.	.	3	66.67	33.33	.	46	95.65	2.17	2.17
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	.	100.00	9	77.78	11.11	11.11
C80,26,39,48,76 Otros	182	61.54	7.69	30.77	67	31.34	23.88	44.78	578	69.72	7.61	22.66
C81 Linfoma Hodgkin	4	100.00	76	98.68	1.32	.
C82-85,96 Otr.Linfomas	87	97.70	1.15	1.15	26	88.46	3.85	7.69	404	98.27	0.74	0.99
C88 S.Mieloproliferat.	1	100.00	4	100.00	.	.
C90 Mieloma múltiple	42	97.62	.	2.38	7	71.43	14.29	14.29	107	97.20	0.93	1.87
C91-95 Leucemias	78	92.31	5.13	2.56	18	88.89	5.56	5.56	282	95.04	2.84	2.13
D45 Policitemia vera	2	100.00	12	91.67	8.33	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	18	88.89	11.11	.	8	87.50	12.50	.	50	92.00	8.00	.
D47 Otr.tr.hematológicos	13	84.62	15.38	.	5	80.00	.	20.00	53	94.34	3.77	1.89

TABLA A.57. Porcentajes de casos con verificación microscópica (%VM), procedentes del Boletín Estadístico de Defunción (%DCO) y con otros diagnósticos (%OTR) según localización y grupos de edad en mujeres. Asturias 2001-2004.

CIE10 Localización	Grupo de edad											
	00-34				35-64				65-74			
	Casos	% VM	% DCO	% OTR	Casos	% VM	% DCO	% OTR	Casos	% VM	% DCO	% OTR
C00-D47 Todas loc.	303	98.35	0.33	1.32	3264	97.89	0.52	1.59	2191	93.75	1.23	5.02
C00 Labio	1	100.00	.	.	3	100.00	.	.	7	100.00	.	.
C01-02 Lengua	16	87.50	6.25	6.25	5	100.00	.	.
C03-06 Boca	18	100.00	.	.	11	100.00	.	.
C07-08 Gl.salivales	3	100.00	.	.	5	100.00	.	.	3	100.00	.	.
C09-14 Faringe	1	100.00	.	.	15	100.00	.	.	4	100.00	.	.
C15 Esófago	13	100.00	.	.	5	100.00	.	.
C16 Estómago	1	100.00	.	.	63	100.00	.	.	93	97.85	2.15	.
C17 Intestino delgado	8	100.00	.	.	15	100.00	.	.
C18 Colon	6	100.00	.	.	207	98.55	1.45	.	221	97.74	0.90	1.36
C19-21 Recto	4	100.00	.	.	121	100.00	.	.	132	100.00	.	.
C22 Hígado	5	100.00	.	.	24	66.67	4.17	29.17	51	49.02	3.92	47.06
C23-24 Vesícula biliar	3	66.67	.	33.33	22	86.36	.	13.64
C25 Páncreas	1	100.00	.	.	47	80.85	.	19.15	50	54.00	6.00	40.00
C30-31 Nariz,senos	1	100.00	.	.	5	100.00	.	.	5	100.00	.	.
C32 Laringe	1	100.00	.	.	12	100.00	.	.	2	100.00	.	.
C33-34 Pulmón	2	50.00	.	50.00	153	96.73	1.31	1.96	95	94.74	3.16	2.11
C37-38 Otr.org.torácicos	2	100.00	.	.	1	100.00	.	.
C40-41 Hueso	9	100.00	.	.	6	100.00	.	.	3	100.00	.	.
C43 Melanoma	19	94.74	5.26	.	82	100.00	.	.	46	100.00	.	.
C45 Mesotelioma	2	100.00	.	.	3	100.00	.	.
C46 S. Kaposi	2	100.00
C47,49 Tejidos blandos	6	100.00	.	.	25	100.00	.	.	12	83.33	16.67	.
C50 Mama	61	100.00	.	.	1219	99.34	0.33	0.33	467	98.50	0.43	1.07
C51-52,57 Otr.genit.fem.	2	100.00	.	.	24	100.00	.	.	24	95.83	.	4.17
C53 Cervix	16	100.00	.	.	114	100.00	.	.	45	97.78	.	2.22
C54-55 Cuerpo útero	7	85.71	.	14.29	257	99.61	0.39	.	196	98.47	1.02	0.51
C56 Ovario	13	100.00	.	.	167	99.40	.	0.60	91	90.11	1.10	8.79
C64-65 Riñón	6	100.00	.	.	57	92.98	.	7.02	51	82.35	.	17.65
C66-68 Vejiga*	3	100.00	.	.	73	100.00	.	.	90	98.89	.	1.11
C69 Ojo	6	83.33	.	16.67	5	80.00	.	20.00
C70-72 S.N.Central**	24	95.83	.	4.17	120	85.83	0.83	13.33	93	80.65	3.23	16.13
C73 Tiroides	38	100.00	.	.	93	100.00	.	.	29	100.00	.	.
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	100.00	.	.	4	100.00	.	.	1	100.00	.	.
C80,26,39,48,76 Otros	3	66.67	.	33.33	84	92.86	2.38	4.76	105	83.81	2.86	13.33
C81 Linfoma Hodgkin	29	100.00	.	.	16	100.00	.	.	8	100.00	.	.
C82-85,96 Otr.Linfomas	13	100.00	.	.	106	99.06	0.94	.	106	97.17	0.94	1.89
C88 S.Mieloproliferat.	3	100.00	.	.
C90 Mieloma múltiple	30	96.67	.	3.33	33	100.00	.	.
C91-95 Leucemias	23	100.00	.	.	46	100.00	.	.	49	97.96	2.04	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	1	100.00	.	.	7	85.71	14.29	.	2	100.00	.	.
D47 Otr.tr.hematológicos	3	100.00	.	.	9	100.00	.	.	7	100.00	.	.

TABLA A.57 (cont). Porcentajes de casos con verificación microscópica (%VM), procedentes del Boletín Estadístico de Defunción (%DCO) y con otros diagnósticos (%OTR) según localización y grupos de edad en mujeres. Asturias 2001-2004.

CIE10 Localización	Grupo de edad											
	75-84				85+				TOTAL			
	Casos	% VM	% DCO	% OTR	Casos	% VM	% DCO	% OTR	Casos	% VM	% DCO	% OTR
C00-D47 Todas loc.	2381	83.79	4.33	11.89	995	61.41	14.27	24.32	9144	89.26	3.17	7.57
C00 Labio	8	100.00	.	.	5	100.00	.	.	24	100.00	.	.
C01-02 Lengua	12	100.00	.	.	4	100.00	.	.	37	94.59	2.70	2.70
C03-06 Boca	11	100.00	.	.	5	100.00	.	.	45	100.00	.	.
C07-08 Gl.salivales	6	100.00	.	.	1	100.00	.	.	18	100.00	.	.
C09-14 Faringe	2	100.00	.	.	1	100.00	.	.	23	100.00	.	.
C15 Esófago	15	93.33	6.67	.	5	80.00	20.00	.	38	94.74	5.26	.
C16 Estómago	157	91.72	1.91	6.37	98	69.39	15.31	15.31	412	89.08	4.85	6.07
C17 Intestino delgado	11	90.91	.	9.09	6	66.67	.	33.33	40	92.50	.	7.50
C18 Colon	311	91.64	3.86	4.50	142	71.83	12.68	15.49	889	91.68	3.94	4.39
C19-21 Recto	136	94.12	2.21	3.68	35	77.14	11.43	11.43	428	96.26	1.64	2.10
C22 Hígado	63	49.21	11.11	39.68	28	28.57	21.43	50.00	172	49.42	9.30	41.28
C23-24 Vesícula biliar	38	73.68	2.63	23.68	16	31.25	12.50	56.25	79	68.35	3.80	27.85
C25 Páncreas	100	27.00	13.00	60.00	47	10.64	14.89	74.47	245	40.00	9.39	50.61
C30-31 Nariz,senos	4	75.00	.	25.00	15	93.33	.	6.67
C32 Laringe	3	66.67	.	33.33	2	100.00	.	.	20	95.00	.	5.00
C33-34 Pulmón	81	69.14	9.88	20.99	45	40.00	17.78	42.22	377	83.29	5.57	11.14
C37-38 Otr.org.torácicos	3	100.00	.	.
C40-41 Hueso	3	100.00	.	.	2	50.00	.	50.00	23	95.65	.	4.35
C43 Melanoma	57	100.00	.	.	29	86.21	10.34	3.45	233	97.85	1.72	0.43
C45 Mesotelioma	3	100.00	.	.	1	100.00	.	.	10	100.00	.	.
C46 S. Kaposi	1	100.00	.	.	1	100.00	.	.	4	100.00	.	.
C47,49 Tejidos blandos	24	79.17	8.33	12.50	9	100.00	.	.	77	90.91	5.19	3.90
C50 Mama	385	94.29	1.56	4.16	141	73.05	14.89	12.06	2274	96.70	1.45	1.85
C51-52,57 Otr.genit.fem.	40	87.50	10.00	2.50	20	75.00	10.00	15.00	110	90.00	5.45	4.55
C53 Cervix	38	94.74	2.63	2.63	9	88.89	.	11.11	222	98.20	0.45	1.35
C54-55 Cuerpo útero	128	96.09	0.78	3.13	34	70.59	14.71	14.71	622	96.78	1.45	1.77
C56 Ovario	72	87.50	1.39	11.11	24	41.67	8.33	50.00	367	91.01	1.09	7.90
C64-65 Riñón	49	55.10	6.12	38.78	10	20.00	30.00	50.00	173	75.14	3.47	21.39
C66-68 Vejiga*	105	93.33	1.90	4.76	48	79.17	8.33	12.50	320	94.38	1.88	3.75
C69 Ojo	1	100.00	.	.	1	100.00	.	.	13	76.92	7.69	15.38
C70-72 S.N.Central**	57	47.37	5.26	47.37	17	5.88	35.29	58.82	311	73.63	4.18	22.19
C73 Tiroides	24	100.00	.	.	10	100.00	.	.	194	100.00	.	.
C74-75 Otr.gl.endocr.	1	.	.	100.00	7	85.71	.	14.29
C80,26,39,48,76 Otros	170	57.65	11.18	31.18	109	33.03	18.35	48.62	471	64.12	9.34	26.54
C81 Linfoma Hodgkin	4	100.00	.	.	1	100.00	.	.	59	100.00	.	.
C82-85,96 Otr.Linfomas	110	97.27	1.82	0.91	31	90.32	3.23	6.45	367	97.28	1.36	1.36
C88 S.Mieloproliferat.	1	100.00	4	100.00	.	.
C90 Mieloma múltiple	54	94.44	3.70	1.85	17	70.59	17.65	11.76	134	93.28	3.73	2.99
C91-95 Leucemias	64	92.19	7.81	.	23	82.61	8.70	8.70	205	95.12	3.90	0.98
D45 Policitemia vera	4	75.00	25.00	4	75.00	25.00	.
D46 Sindr. mielodisplásicos	12	83.33	16.67	.	14	50.00	50.00	.	36	72.22	27.78	.
D47 Otr.tr.hematológicos	17	88.24	5.88	5.88	3	33.33	33.33	33.33	39	89.74	5.13	5.13

TABLA A.58. Razones de mortalidad/incidencia, número de casos incidentes y número de defunciones por cáncer en el Registro de Mortalidad según localización en varones. Asturias 2001-2004.

CIE10 Localización	ORDEN	Ratio M/I	Casos	Defunciones
C88 S.Mieloproliferat.	1	2.00000	4	8
C37-38 Otr.org.torácicos	2	1.50000	8	12
C25 Páncreas	3	1.19149	282	336
C15 Esófago	4	1.09623	239	262
D45 Policitemia vera	5	1.00000	12	12
C90 Mieloma múltiple	6	0.93458	107	100
C33-34 Pulmón	7	0.91187	2519	2297
C45 Mesotelioma	8	0.90323	31	28
C22 Hígado	9	0.86486	444	384
C91-95 Leucemias	10	0.82270	282	232
C80,26,39,48,76 Otros	11	0.81315	578	470
D46 Sindr. mielodisplásicos	12	0.80000	50	40
C70-72 S.N.Central**	13	0.78161	261	204
C16 Estómago	14	0.76228	631	481
C23-24 Vesícula biliar	15	0.74242	66	49
C18 Colon	16	0.62459	1228	767
C09-14 Faringe	17	0.59159	333	197
C74-75 Otr.gl.endocr.	18	0.55556	9	5
C40-41 Hueso	19	0.53846	39	21
C30-31 Nariz,senos	20	0.52381	42	22
C32 Laringe	21	0.48283	466	225
C64-65 Riñón	22	0.43908	435	191
C82-85,96 Otr.Linfomas	23	0.43317	404	175
C17 Intestino delgado	24	0.41026	39	16
C01-02 Lengua	25	0.39850	133	53
D47 Otr.tr.hematológicos	26	0.39623	53	21
C73 Tiroides	27	0.39130	46	18
C60,63 Otr.genit.mas.	28	0.37143	35	13
C47,49 Tejidos blandos	29	0.36585	82	30
C03-06 Boca	30	0.34307	137	47
C19-21 Recto	31	0.31732	791	251
C66-68 Vejiga*	32	0.31259	1430	447
C07-08 Gl.salivales	33	0.31250	32	10
C43 Melanoma	34	0.29412	153	45
C61 Próstata	35	0.29240	2606	762
C69 Ojo	36	0.23077	13	3
C81 Linfoma Hodgkin	37	0.14474	76	11
C50 Mama	38	0.14286	28	4
C00 Labio	39	0.08333	72	6
C46 S. Kaposi	40	0.04167	24	1
C62 Testículo	41	0.02247	89	2

TABLA A.59. Razones de mortalidad/incidencia, número de casos incidentes y número de defunciones por cáncer en el Registro de Mortalidad según localización en mujeres. Asturias 2001-2004.

CIE10 Localización	ORDEN	Ratio M/I	Casos	Defunciones
C37-38 Otr.org.torácicos	1	3.00000	3	9
D45 Policitemia vera	2	1.50000	4	6
D46 Sindr. mielodisplásicos	3	1.25000	36	45
C25 Páncreas	4	1.16327	245	285
C74-75 Otr.gl.endocr.	5	1.14286	7	8
C15 Esófago	6	1.05263	38	40
C90 Mieloma múltiple	7	0.92537	134	124
C22 Hígado	8	0.87209	172	150
C91-95 Leucemias	9	0.86829	205	178
C80,26,39,48,76 Otros	10	0.83652	471	394
C33-34 Pulmón	11	0.83289	377	314
C40-41 Hueso	12	0.82609	23	19
C23-24 Vesícula biliar	13	0.79747	79	63
C16 Estómago	14	0.77913	412	321
C45 Mesotelioma	15	0.70000	10	7
C70-72 S.N.Central**	16	0.64630	311	201
C51-52,57 Otr.genit.fem.	17	0.61818	110	68
C18 Colon	18	0.61642	889	548
C56 Ovario	19	0.61580	367	226
C64-65 Riñón	20	0.56069	173	97
C88 S.Mieloproliferat.	21	0.50000	4	2
C82-85,96 Otr.Linfomas	22	0.46322	367	170
C17 Intestino delgado	23	0.45000	40	18
D47 Otr.tr.hematológicos	24	0.43590	39	17
C09-14 Faringe	25	0.43478	23	10
C03-06 Boca	26	0.42222	45	19
C66-68 Vejiga*	27	0.38125	320	122
C50 Mama	28	0.34345	2274	781
C47,49 Tejidos blandos	29	0.33766	77	26
C54-55 Cuerpo útero	30	0.33601	622	209
C19-21 Recto	31	0.32009	428	137
C32 Laringe	32	0.30000	20	6
C53 Cervix	33	0.28378	222	63
C01-02 Lengua	34	0.27027	37	10
C46 S. Kaposi	35	0.25000	4	1
C43 Melanoma	36	0.23176	233	54
C73 Tiroides	37	0.21134	194	41
C30-31 Nariz,senos	38	0.20000	15	3
C81 Linfoma Hodgkin	39	0.16949	59	10
C07-08 Gl.salivales	40	0.16667	18	3
C69 Ojo	41	0.15385	13	2
C00 Labio	42	-	24	.



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE SALUD
Y SERVICIOS SANITARIOS