COMIRNATY (Pfizer-BioNTech): comparativa de presentaciones disponibles

Descripción	***Comirnaty 30 µg/dosis*** ***Diluir antes de su uso***	***Comirnaty 30 µg/dosis*** ***No diluir***	***Comirnaty 10 µg/dosis*** ***Diluir antes de su uso***
Grupo de edad	A partir de 12 años de edad	A partir de 12 años de edad	De 5 a 11 años de edad
Color de la tapa del vial	**MORADO**	**GRIS**	**NARANJA**
Dosis	30 µg	30 µg	10 µg
Volumen por dosis	0,3 ml	0,3 ml	0,2 ml
Cantidad de diluyente por vial (1)	1,8 ml	**NO PRECISA DILUCIÓN**	1,3 ml
Dosis por vial	Al menos 6 dosis (tras dilución)	Al menos 6 dosis	Al menos 10 dosis (tras dilución)
Condiciones de almacenaje			
Ultracongelación (-60ºC a -90ºC)	9 meses (2)	9 meses (2)	9 meses (2)
Congelación (-15ºC a -25ºC)	2 semanas	**NO ALMACENAR**	**NO ALMACENAR**
Refrigeración (2ºC a 8ºC)	1 mes	10 semanas	10 semanas
Temperatura ambiente (8ºC a 25ºC)	2 horas antes de diluir (incluye el tiempo de descongelación)	12 horas antes del primer pinchazo del vial	12 horas antes de diluir
Tras el primer pinchazo del vial (2ºC a 25ºC)	Desechar a las 6 horas	Desechar a las 12 horas	Desechar a las 12 horas

(1) Diluyente: suero salino estéril al 0,9% (solución de 9 mg/ml de cloruro sódico). No usar ningún otro tipo de diluyente.
(2) Independientemente de las condiciones de almacenaje, no usar tras 9 meses desde la fecha de fabricación (6 meses indicados en el vial y 3 meses adicionales).