

¿Y después de la vacunación?

Basado en folleto imprimible para las personas vacunadas. Centers for Disease Control and Prevention. 15 de Enero 2021.



¿Cuáles son efectos secundarios frecuentes?

- En el **BRAZO** donde le aplicaron la inyección puede tener dolor e hinchazón.
- **OTRAS REACCIONES** posibles son: fiebre, cansancio, escalofríos y dolor de cabeza

¿Cómo manejar los efectos secundarios?



1 Si siente **DOLOR O MOLESTIAS**,

PUEDE TOMAR PARACETAMOL




2 **DOLOR LOCAL (Inyección)**

PONGA FRÍO LOCAL EN ZONA PINCHAZO



3 **EN CASO DE FIEBRE**

TOME LÍQUIDOS Y NO SE ABRIGUE



Puede que los efectos secundarios sean similares a los de la gripe e incluso afecten su capacidad de realizar actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos pocos días.



¿Cuándo debo consultar al centro de salud?


- Si **ENROJECIMIENTO O DOLOR EN LA ZONA AUMENTAN** después de 24 horas.
- Si los **EFFECTOS SECUNDARIOS SON ATÍPICOS O NO DESAPARECEN** a los 2 o 3 días.

Y ante todo debe RECORDAR que....



1 **NECESITA 2 DOSIS**

Salvo indicación de su médico/enfermera



SON 2 DOSIS DE VACUNA (SALVO JANSSEN)

2 **INMUNIDAD**

Tras la 2ª dosis (o 1ª si sólo necesita una)



INMUNIZACIÓN EN 1 O 2 SEMANAS TRAS 2ª DOSIS

3 **MEDIDAS HABITUALES**

Tras completar la vacunación COVID19



MANTENER LAVADO MANOS, DISTANCIA, MASCARILLA

Para cualquier duda o pregunta relacionada con su cita, datos o información relacionada:

llamar al 984016114
incidenciacionautomatica@spsa.es

