



Preguntas y respuestas frecuentes sobre la vacunación COVID en niñ@s

Vacunación COVID-19
Servicio de Salud del Principado de Asturias

> ¿Cuales son los requisitos previos para la vacunación COVID-19 en niñ@s?



- Cuando acuda al punto de vacunación es **necesario presentar** algún documento identificativo como:

- DNI/NIE,
- Tarjeta Sanitaria,
- Tarjeta de desplazado



- L@s niñ@s entre 5 y 11 años deben acudir **siempre acompañados** de, al menos, **uno de los padres o tutores legales**.


- En todos los casos el **consentimiento se otorga verbalmente**, no es necesario un formulario escrito de consentimiento.

> ¿Cómo será la pauta de vacunación en niñ@s y con qué vacuna serán vacunado?



- La vacuna aprobada para la vacunación de niñ@s en los 5 y 11 años es **Comirnaty 10 µg/dosis** de Pfizer-Biontech.

- Se administra por vía intramuscular
- Pauta de 2 dosis (de 0,2 ml)
- Separadas de 8 semanas (56 días).



- En caso de antecedente de infección por SARS-CoV-2 (COVID-19):

- **Antes de vacunar:** sólo recibirá 1 dosis tras la recuperación, al menos 4 semanas después de diagnóstico.
- **Tras la primera dosis:** segunda dosis tras la recuperación, al menos 4 semanas desde la infección y al menos 8 semanas desde la 1ª dosis.

> Consideraciones a tener en cuenta antes y después de la vacunación COVID-19 en niñ@s



- ¿Qué hacer **si el día de la vacunación el/la niñ@ no se encuentra bien?**

- Si los síntomas que presenta son de **enfermedad leve:** sin fiebre o sin malestar general no es una razón válida para posponer la vacunación.
- Si presenta una **enfermedad aguda grave** la vacunación debe posponerse temporalmente y consultar con el centro de salud para valorar si hay que hacer una prueba diagnóstica de COVID-19



- ¿Qué **síntomas se pueden notar después** de la vacunación?

- Las vacunas pueden provocar **efectos secundarios**, la mayoría de estos son leves y de corta duración (1 o 2 días).
- Los **síntomas más comunes** son:
 - **Dolor y/o pesadez local (brazo),**
 - **Cansancio, malestar y escalofríos**
 - **Dolor de cabeza y fiebre.**
- Si los síntomas son **intensos** se puede tomar **paracetamol** (según peso del niño), cada **6-8 horas**.