



## **DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (CURMP) SOBRE EL POSICIONAMIENTO EN LA TERAPIA DE LA DERMATITIS ATÓPICA**

### **ABORDAJE TERAPÉUTICO EN EL TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS ATÓPICA CON AGENTES BIOLÓGICOS E INHIBIDORES ORALES DE LA VÍA JAK (2023)**

**CELEBRACIÓN DE LA CURMP:** Oviedo, 26 de MAYO de 2023.

El estándar de tratamiento de la dermatitis atópica se centra en el uso de la terapia tópica con inhibidores de la calcineurina o glucocorticoides. Los tratamientos tópicos tienen una eficacia limitada.

Es necesario usar tratamiento sistémico en todos los pacientes con dermatitis atópica moderada-grave en los que las lesiones no se controlan con tratamiento tópico (inhibidores de la calcineurina o glucocorticoides).

El tratamiento de la dermatitis atópica moderada-grave (EASI  $>$  o igual 21, PGA  $>$  o igual 3, afectación mínima del área de superficie corporal (BSA)  $>$  o igual 10% y refractarios a medicación tópica) se prioriza de la siguiente manera:

**1. Tratamiento sistémico:**

**1ª OPCIÓN CICLOSPORINA**

**2. Tratamiento de la dermatitis atópica grave en pacientes adultos, adolescentes y niños desde los 6 años con EASI  $>$  o igual 21, PGA  $>$  o igual 3, afectación mínima del área de superficie corporal (BSA)  $>$  o igual 10% y refractarios a medicación tópica en los que la respuesta a ciclosporina haya sido insatisfactoria o su uso esté contraindicado.**

**1ª OPCIÓN DUPILUMAB:** Adultos, adolescentes y niños desde los 6 años.

**2ª OPCIÓN INHIBIDOR VÍA JAK (UPADACITINIB):** ante falta de respuesta a dupilumab en adultos y adolescentes a partir de 12 años.

En pacientes adultos con comorbilidades graves que contraindiquen la utilización de inhibidores de la vía JAK, se utilizará **TRALOKINUMAB**.

**3ª OPCIÓN INHIBIDOR VÍA JAK (ABROCITINIB):** cuando fracasen los anteriores.